Messung der Gluondichte im Proton in der tief-inelastischen Elektron-Proton Streuung mit Multijet-Ereignissen bei *HERA*

DISSERTATION

zur Erlangung des Doktorgrades
des Fachbereichs Physik
der Universität Hamburg

vorgelegt von

Joachim Stier
aus Schenefeld bei Hamburg

Hamburg
1996

Gutachter der Dissertation:	Prof. Dr. V. Blobel Dr. J. Gayler Prof. Dr. E. Lohrmann
Gutachter der Disputation:	Prof. Dr. V. Blobel Prof. Dr. A. Wagner
Leiter der Disputation:	Dr. G. Poelz
Datum der Disputation:	26. März 1996
Sprecher des Fachbereichs Physik und Vorsitzender des Promotionsausschusses:	Prof. Dr. B. Kramer

Kurzfassung

In dieser Arbeit wird eine direkte Messung der Gluondichte des Protons für ein mittleres Q^2 von $30\,\mathrm{GeV}^2$ in dem Bereich $0.0019 < x_g < 0.18$ beschrieben, die auf Multijet-Wirkungsquerschnitten basiert. Diese Messung beruht auf Ereignissen der tief-inelastischen Elektron-Proton Streuung, die in dem Jahr 1993 mit dem H1-Detektor am Speicherring *HERA* aufgezeichnet wurden. Das Ergebnis dieser Messung zeigt einen deutlichen Anstieg der Gluondichte mit abnehmendem Impulsanteil x_g der Gluonen.

Abstract

This thesis describes a direct measurement of the gluon density in the proton for an average Q^2 of $30\,\mathrm{GeV}^2$ in the region $0.0019 < x_g < 0.18$ using multi-jet cross sections. This measurement is based on deep-inelastic electron-proton scattering events recorded with the H1 detector at the storage ring *HERA* in the year 1993. The result of this measurement shows a considerable increase of the gluon density with decreasing fractional momenta of the gluons.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Einleitung

Am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY wurde nach einer Bauzeit von etwa 6 Jahren der weltweit erste Elektron-Proton Speicherring, die Hadron Elektron Ring Anlage *HERA*, gegen Ende des Jahres 1990 für Strahlstudien in Betrieb genommen. Im Frühjahr 1992 konnten die *HERA* Experimente H1 und ZEUS die ersten Elektron-Proton Kollisionen beobachten. Bei *HERA* ist das maximale Quadrat des Impulsübertrags $Q^2 \simeq 10^4\,\mathrm{GeV}^2$, und die maximal erreichbare Schwerpunktsenergie ist $\sqrt{s} \simeq 300\,\mathrm{GeV}$.

Am 31. Mai 1992 wurde von der H1 Kollaboration das erste tief-inelastische Ereignis der Elektron-Proton Streuung aufgezeichnet. Das Quadrat des Impulübertrags dieses Ereignisses beträgt $Q^2 = 18\,\mathrm{GeV}^2$ und ist vergleichbar mit dem Q^2 früherer Experimente mit stationärem Target. Aber der Impulsbruchteil x des an der Wechselwirkung beteiligten Quarks beträgt nur $x = 0.0004$; dies ist ein hundert mal kleinerer Wert als jemals zuvor bei demselben Q^2 erreicht wurde.

Die Kenntnis der Partondichten im Proton liefert mit kleiner werdendem x ein zunehmend tieferes Verständnis der Substruktur des Protons. Außerdem ist das Verhalten von Partondichten (Strukturfunktionen) bei kleinem x eine phänomenologische Grundlage für Voraussagen und Interpretationen der Physik zukünftiger Beschleuniger, z.B. dem LHC (Large Hadron Collider).

Gerade durch die in den Jahren 1992 bis 1994 veröffentlichten Strukturfunktions-Messungen der *HERA*-Experimente H1 und ZEUS konnte die Unsicherheit in der Kenntnis der Quarkdichteverteilungen im Proton bis zu $x \simeq 10^{-4}$ stark verkleinert werden. Jedoch ist die Unsicherheit in der Kenntnis der Gluondichte um fast einen Faktor 5 größer als die der Quarkdichteverteilung im Proton bei $x \simeq 10^{-3}$. Die Gluondichte ist damit, abgesehen von den Quarkdichteverteilungen schwerer Quarks (Charm und Bottom), die am wenigsten bekannte Partondichte im Proton.

Die vorliegende Arbeit beschreibt eine direkte, auf dem gluon-initiierten Photon-Gluon Fusions-Prozeß basierende Messung der Gluondichte in der tief-inelastischen Streuung bei *HERA*. Das Ergebnis dieser Arbeit wurde in [1] veröffentlicht; insofern kann die vorliegende Analyse als eine detaillierte Beschreibung aller durchgeführten Schritte angesehen werden, die zu dem in [1] dargestellten Ergebnis geführt haben.

Die vorliegende Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert. In dem ersten Kapitel werden die dieser Messung zugrundeliegenden QCD-Prozesse der tief-inelastische ep-Streuung, sowie die Einführung von Wirkungsquerschnitten und Partondichten beschrieben. Das zweite Kapitel zeigt den Speicherring *HERA* und den H1 Detektor, wobei die charakteristischen Größen für die in dieser Analyse verwendeten Detektorkomponenten genannt werden. Die benutzten Selektionskriterien und deren Motivationen werden in dem dritten Kapitel besprochen; es folgt eine Diskussion der Untergrundbeiträge. In dem vierten Kapitel wird die Entfaltung der Gluondichte beschrieben und das Resultat mit anderen Messungen verglichen.

Kapitel 1

Theorie

1.1 Tief-inelastische Lepton-Nukleon Streuung

Die Streuung eines Leptons an einem Nukleon wird in der vorliegenden Analyse im Rahmen des *Parton-Modells* interpretiert. In diesem Modell besteht das Nukleon aus punktförmigen Konstituenten, die mit Quarks und Gluonen identifiziert werden. Inelastische Streuung an dem Nukleon wird als elastische Streuung an den Konstituenten (den Partonen) dieses Objekts gedeutet. Die Wechselwirkung zwischen einem Parton des Nukleons und dem ausgetauschten Boson wird als harter Subprozeß bezeichnet. Ein tief-inelastischer Streuprozeß (DIS, deep inelastic scattering) zwischen einem Lepton l und einem Nukleon N kann symbolisch in der Form

$$l(k) + N(P) \to l'(k') + X \tag{1.1}$$

geschrieben werden (siehe Abbildung 1.1). Hierbei repräsentiert l ($l = e, \mu, \nu, \dots$) das einlaufende Lepton mit einem Viererimpuls k und l' das gestreute Lepton mit einem Viererimpuls k'. Das Nukleon N ($N = p, n, \dots$) besitzt den Viererimpuls P und der hadronische Endzustand X ist durch den Protonrest (*Remnant*) R und den Endzustand S des harten Subprozesses gegeben. Der Impulsanteil des in den harten Subprozeß einlaufenden Partons am Gesamtimpuls des Nukleons wird mit x bezeichnet; im Fall eines gluon-initiierten Prozesses wird dieser Impulsanteil im folgenden auch x_g genannt. Der Vierervektor des ausgetauschten Bosons (Photons) ist durch q gegeben.

Ist das zwischen Lepton und Proton ausgetauschte Boson ein W^+ (bzw. W^-), spricht man von einem Ereignis des geladenen Stroms (CC, charged current) und das gestreute Lepton ist bei *HERA* ein Neutrino. Ist das ausgetauschte Boson ein virtuelles Photon γ^* oder ein Z^0, spricht von einem Ereignis des neutralen Stroms (NC, neutral current). Die vorliegende Analyse beschränkt sich auf Ereignisse mit $|q^2| < 80\,\mathrm{GeV}^2$, damit gilt $|q^2| \ll m_{Z^0}^2$ und $|q^2| \ll m_{W^\pm}^2$, und die Beiträge massiver Vektorbosonen zur ep-Streuung sind vernachlässigbar klein. Prozesse, in denen die partonische Struktur des Photons berücksichtigt werden muß (sogenannte „*resolved photon processes*“), können in der tief-inelastischen Streuung aufgrund der großen Virtualität des ausgetauschten Photons (in



Abbildung 1.1: Interpretation einer tief-inelastischen Lepton-Nukleon Streuung im Parton-Modell unter der Annahme des Austauschs eines Photons. In der kollinearen Näherung besitzt das in den harten Subprozeß ($\hat{\sigma}$) einlaufende Parton den Impulsanteil x und der Proton Restjet den Impulsanteil $(1-x)$ am Gesamtimpuls P des Nukleons N. Die Vierervektor des Photons ist durch q gegeben.

der vorliegenden Analyse wird $|q^2| > 12.5\,\mathrm{GeV}^2$ verlangt) vernachlässigt werden. Diese Prozesse sind in der Photoproduktion ($|q^2| \simeq 0$) wichtig.

Für den in Abbildung 1.1 dargestellten DIS Prozeß können folgende kinematische Variablen in Lorentz-invarianter Notation definiert werden:

- s, das Quadrat der Lepton-Nukleon Schwerpunktsenergie:

$$s = (P+k)^2. \tag{1.2}$$

- Q^2, der Impulsübertrag zwischen Lepton und Nukleon, d.h. die Virtualität des ausgetauschten Photons:

$$Q^2 = -\left(k - k'\right)^2 = -q^2 \qquad (Q^2 > 0). \tag{1.3}$$

- x_B, die Bjørken Skalenvariable:

$$x_B = \frac{Q^2}{2Pq} \qquad (0 < x_B < 1). \tag{1.4}$$

- y, eine Variable, die sich im Ruhesystem des Nukleons als relativer Energieübertrag des Elektrons interpretieren läßt:

$$y = \frac{Pq}{Pk} \qquad (0 < y < 1). \tag{1.5}$$

- W^2, das Quadrat der invarianten Masse des hadronischen Endzustands, oder äquivalent die Photon-Proton Schwerpunktsenergie:

$$W^2 = (P+q)^2. \tag{1.6}$$

In allen weiteren Betrachtungen werden die Massen des Leptons und des Nukleons vernachlässigt. Durch die Relationen

$$Q^2 = s x_B y \qquad \text{und} \qquad W^2 = Q^2 \frac{1-x_B}{x_B} \tag{1.7}$$

erkennt man, daß es bei gegebenem s ausreicht, zwei der oben genannten kinematischen Variablen zu messen, um alle anderen bestimmen zu können. Das invariante Massenquadrat $\hat{s}$ der auslaufenden Partonen des harten Subsystems S, oder äquivalent das Quadrat der Photon-Parton Schwerpunktsenergie, ist definiert durch

$$\hat{s} = (xP+q)^2 = 2xPq - Q^2. \tag{1.8}$$

Man erhält damit folgende Beziehung zwischen dem Impulsanteil x des einlaufenden Partons, Bjørken-x und Q^2:

$$x = x_B \left(1 + \frac{\hat{s}}{Q^2}\right). \tag{1.9}$$

Tief-inelastische Lepton-Nukleon Streuung (DIS) ist charakterisiert durch große Massen des hadronischen Endzustands im Vergleich zur Protonmasse m_p:

$$W^2 \gg m_p^2. \tag{1.10}$$

und durch große Virtualitäten $|q^2|$ des Photons (in DIS ist das γ^* raumartig):

$$Q^2 = -q^2 \gg m_p^2. \tag{1.11}$$

Der Wirkungsquerschnitt $d\sigma^{eN}$ für die Elektron-Nukleon Streuung kann als eine Faltung des harten Elektron-Parton-Wirkungsquerschnitts $d\hat{\sigma}$ und der Partondichten ϕ_N des Nukleons N geschrieben werden (*Faktorisierungs-Theorem* [2]):

$$d\sigma^{eN} = \sum_{\phi=q,\bar{q},g} \int_0^1 \phi_N(x,\mu_f^2) \cdot d\hat{\sigma}(x,\mu_f^2,\mu_r^2)dx. \tag{1.12}$$

In der pertubativen Quantenchromodynamik (pQCD) sind die Ausdrücke ϕ_N und $d\hat{\sigma}$ abhängig von einer Renormierungsskala μ_r und einer Faktorisierungsskala μ_f (siehe Abschnitt 1.1.2). Die Partondichte $\phi_N(x,\mu_f^2)$ des Nukleons N ist definiert als eine Teilchendichte, wobei die Anzahl Z der Partonen ϕ_N ($\phi = g, u, \bar{u}, \dots$) in dem Impulsintervall $[x, x+\Delta x]$ durch

$$Z(\phi_N)\Big|_{[x,x+\Delta x]} = \int_x^{x+\Delta x} \phi_N(x,\mu_f^2)\, dx \tag{1.13}$$

gegeben ist. Für kleines Δx wird das Produkt $\phi_N(x)\Delta x$ häufig als Wahrscheinlichkeit interpretiert, das Parton ϕ in dem Impulsintervall $[x, x+\Delta x]$ zu finden. Im Gegensatz zu Wirkungsquerschnitten sind Partondichten „universell“ und damit unabhängig von dem physikalischen Prozeß. Aus der Kenntnis der Partondichten im Proton können Voraussagen über ep, pp und $p\bar{p}$ Streuprozesse gewonnen werden. In der vorliegenden Analyse beziehen sich Partondichten ausschließlich auf das Proton, so daß der Nukleonindex N überflüssig wird; Partondichten werden in den weiteren Betrachtungen mit $g, q, \bar{q}$ $(q = u, d, s, \dots)$ bezeichnet.

Der Wirkungsquerschnitt $\hat{\sigma}$ kann in der pertubativen QCD als Störungsreihe mit dem Entwicklungsparameter α_s (sofern α_s hinreichend klein ist) als

$$\hat{\sigma} = \hat{\sigma}_0 + \alpha_s(\mu_r^2)\hat{\sigma}_1 + \alpha_s^2(\mu_r^2)\hat{\sigma}_2 + \cdots \tag{1.14}$$

dargestellt werden, wobei es von der Ordnung des betrachteten Prozesses abhängt, mit welchem Term die Störungsreihe beginnt. Die ersten beiden Summanden bilden die Grundlage der vorliegenden Analyse und werden in den folgenden zwei Abschnitten diskutiert.

1.1.1 Quark-Parton-Modell

Im Quark-Parton-Modell (QPM) werden die Konstituenten eines Nukleons mit den Quarks und Antiquarks identifiziert. Die Wechselwirkung zwischen den Partonen wird in diesem Modell vernachlässigt. Bei großen Impulsüberträgen ($Q^2 \gtrsim 5\,\mathrm{GeV}^2$) können die Konstituenten des Nukleons als quasi-freie Teilchen betrachtet werden *(asymptotische Freiheit)*. Formal kann damit das Quark-Parton-Modell als pertubative QCD zur nullten Ordnung in α_s aufgefaßt werden. Abbildung 1.2 zeigt den Feynmangraphen des harten Subprozesses einer ep-Streuung im QPM unter der Annahme des Austauschs eines Photons. Der hadronische Endzustand setzt sich aus dem auslaufenden Quark q' und dem Protonrest R zusammen. Mit $m_{q'}^2 = \hat{s} = 0$ folgt aus Gleichung (1.9) $x = x_B$; der Impulsanteil x des Partons q am Gesamtimpuls des Protons ist damit identisch mit der kinematischen Variablen Bjørken-x. Für Ereignisse mit zwei Partonen im Endzustand (Prozeß zur Ordnung α_s) ist diese Beziehung nicht mehr erfüllt, dann gilt $\hat{s} > 0$ und damit $x > x_B$. Unter Annahme des Austauschs eines Photons berechnet sich der Wirkungsquerschnitt des Elektron-Quark Streuprozesses zu

$$\frac{d\hat{\sigma}^{eq}}{dx_B dQ^2} = \frac{2\pi\alpha^2 e_q^2}{Q^4}\left(1 + (1-y)^2\right)\delta(x_B - x), \tag{1.15}$$



Abbildung 1.2: Feynmangraph des harten Subprozesses einer ep-Streuung im Quark-Parton-Modell unter der Annahme des Austauschs eines Photons, der die mit $\hat{\sigma}$ gekennzeichnete Blase der Abb. 1.1 ersetzt. Einlaufende Teilchen sind das Photon γ^* (Elektronseite) und das Quark q (Protonseite).

wobei e_q die Quarkladungszahl des Quarks q und α die Feinstrukturkonstante darstellt. Die Dichteverteilungen der Konstituenten-Quarks sind im QPM ausschließlich Funktionen der Variablen x_B. Man beachte, daß die Konstituenten-Quark-Verteilungen im QPM nicht mit den Valenz-Quarkverteilungen des nächsten Abschnitts identisch sind.

1.1.2 Pertubative QCD $\mathcal{O}(\alpha_s)$

Die Quantenchromodynamik (QCD) ist die Eichtheorie der starken Wechselwirkung mit der Eichgruppe $SU(3)_C$. Die starke Wechselwirkung zwischen Farbladungsträgern wird in der QCD durch den Austausch von Gluonen (den Eichbosonen der QCD) beschrieben. Im Standard-Modell bilden Gluonen ein Oktett und es wird postuliert, daß sie zu einer Oktett-Darstellung der Eichgruppe $SU(3)_C$ gehören. Die Stärke, mit der Gluonen an Farbladungsträger koppeln, ist durch die Kopplungskonstante α_s gegeben. Um in der störungstheoretischen Beschreibung der QCD (Gleichung (1.14)) quantitative Berechnungen durchführen zu können, muß die QCD renormiert werden [2]. Dadurch werden die Kopplungskonstante α_s und damit auch die Entwicklung von Partondichten und die Vorhersage von Jet-Wirkungsquerschnitten abhängig von einer Renormierungsskala μ_r.

Kopplungskonstante α_s

Die Abhängigkeit der Kopplungskonstante α_s von der Renormierungsskala μ_r ist durch die Renormierungsgruppengleichung

$$\mu_r \frac{\partial \alpha_s}{\partial \mu_r} = -\frac{\beta_0}{2\pi}\alpha_s^2 - \frac{\beta_1}{8\pi^2}\alpha_s^3 - \cdots , \tag{1.16}$$
$$\text{mit} \qquad \beta_0 = 11 - \frac{2}{3}n_f \qquad \text{und} \qquad \beta_1 = 102 - \frac{38}{3}n_f,$$

für α_s gegeben. Kennt man den Wert für α_s an der Skala μ_r', dann ist α_s an einer beliebigen Stelle μ_r durch die Renormierungsgruppengleichung definiert. Es ist üblich, anstelle von α_s bei einer Referenzskala μ_r' einen Parameter Λ einzuführen, so daß die Lösungen der Gleichung (1.16) als Störungsreihe mit dem Entwicklungsparameter $\ln^{-1}(\mu_r^2/\Lambda^2)$ geschrieben werden können. Dadurch wird Λ zu einem fundamentalen Parameter der QCD, der aus dem Experiment bestimmt werden muß. Die Anzahl der Quarks, deren Masse kleiner als μ_r ist, ist durch n_f gegeben. Man nennt n_f auch die Anzahl der aktiven Flavours des jeweiligen Experiments. In führender Ordnung (LO, leading order) ist α_s durch

$$\alpha_s^{\mathrm{LO}}(\mu_r^2) = \frac{4\pi}{\beta_0 \ln \frac{\mu_r^2}{\Lambda^2}}. \tag{1.17}$$

gegeben. Für $\mu_r \to \infty$ verschwindet die Kopplung der starken Wechselwirkung zwischen Teilchen *(asymptotische Freiheit)*, und für $\mu_r \to 0$ wird die Kopplung beliebig groß *(confinement)*. Damit α_s eine stetige Funktion der Renormierungsskala μ_r wird, muß sich Λ

an den Flavour Massenschwellen diskret ändern. Für jeden Bereich von μ_r zwischen zwei Flavour Schwellen gibt es eine effektive Anzahl von masselosen Quarks (n_f), dadurch wird Λ eine Funktion von n_f: $\Lambda \to \Lambda^{(n_f)}$. Eine kleine Änderung der Renormierungsskala von μ_r nach μ'_r kann durch eine Taylorentwicklung von (1.17) dargestellt werden als

$$\alpha_s^{\mathrm{LO}}(\mu_r'^2) = \alpha_s^{\mathrm{LO}}(\mu_r^2) \cdot \left(1 + \frac{\beta_0}{4\pi} \cdot \ln \frac{\mu_r^2}{\mu_r'^2} \cdot \alpha_s^{\mathrm{LO}}(\mu_r^2) + \mathcal{O}\left(\alpha_s^{\mathrm{LO}^2}\right)\right). \tag{1.18}$$

Man erkennt, daß die Änderung von α_s^{LO} durch den Term der nächst-höheren Ordnung in $\ln^{-1}(\mu_r^2/\Lambda^2)$ verursacht wird. Aus diesem Grund läßt sich in führender Ordnung (LO) das „Laufen" der Kopplungskonstante α_s (bzw. die Einführung des Parameters Λ) nicht konsistent formulieren, und α_s-Messungen sollten zumindest die nächst-höhere Ordnung in $\ln^{-1}(\mu_r^2/\Lambda^2)$ berücksichtigen (siehe z.B. Übersicht in [3]).

Wirkungsquerschnitte und Partondichten

Zur Ordnung α_s müssen virtuelle und reelle QCD-Korrekturen in der Berechnung der Wirkungsquerschnitte und der Darstellung von Partondichten berücksichtigt werden. Die Feynmangraphen der in Abbildung 1.3 gezeigten virtuellen Prozesse führen zu demselben Endzustand wie der QPM-Graph der Abb. 1.2. In den Graphen des Boson-Gluon-Fusions- (BGF) und des QCD-Compton- (QCD-C) Prozesses (Abbildung 1.4) besitzt der hadronische Endzustand neben dem Proton-Remnant zwei auslaufende Partonen. Bis zur Ordnung $\mathcal{O}(\alpha_s)$ liefert die Boson-Gluon-Fusion den einzigen gluon-initiierten Prozeß.

Sind p_1 und p_2 die Viererimpulse der auslaufenden Teilchen des BGF- bzw. QCD-Compton-Graphen, dann läßt sich mit der Einführung der Mandelstam-Variablen

$$\hat{s} = (q + xP)^2, \quad \hat{t} = (q - p_1)^2 \quad \text{und} \quad \hat{u} = (q - p_2)^2 \tag{1.19}$$

das Matrixelement des BGF-Prozesses ausdrücken durch [4]:

$$|\mathcal{M}|^2_{\gamma^* g \to q\bar{q}} = 32\pi^2 \left(e_q^2 \alpha_s \alpha\right) \frac{1}{2} \left(\frac{\hat{u}}{\hat{t}} + \frac{\hat{t}}{\hat{u}} - \frac{2\hat{s}Q^2}{\hat{t}\hat{u}}\right). \tag{1.20}$$



Abbildung 1.3: Virtuelle QCD-Korrekturen der Ordnung α_s zu dem QPM-Prozeß der Abb. 1.2. Korrektur am einlaufenden Quark (links), Vertexkorrektur (Mitte) und Korrektur am auslaufenden Quark (rechts).



Abbildung 1.4: Feynmangraphen der Ordnung α_s für den Boson-Gluon-Fusions-Prozeß (obere Reihe) und den QCD-Compton-Prozeß (untere Reihe).

Das Matrixelement für den QCD-Compton Prozeß ist durch

$$|\mathcal{M}|^2_{\gamma^* q \to qg} = 32\pi^2 \left(e_q^2 \alpha_s \alpha\right) \frac{4}{3} \left(-\frac{\hat{t}}{\hat{s}} - \frac{\hat{s}}{\hat{t}} + \frac{2\hat{u}Q^2}{\hat{s}\hat{t}}\right) \tag{1.21}$$

gegeben. Werden Gluonen (oder Quarks) kollinear oder niederenergetisch zum korrespondierenden Parton abgestrahlt, werden die Matrixelemente singulär. Kollineare Divergenzen treten nur in einer Theorie mit masselosen Partonen auf, für massive Teilchen ist die Abstrahlung kollinearer Gluonen kinematisch nicht erlaubt.

Die Form der Singularitäten des BGF- und QCD-Compton-Prozesses im Anfangszustand erhält man z.B. durch Betrachten des t-Kanals des QCD-Compton Graphen [5]:

$$\hat{\sigma}(\gamma^* q \to qg) \propto \int_{\mu^2}^{k^2_{T max} \simeq Q^2} \frac{dk_T^2}{k_T^2} \simeq \ln \frac{Q^2}{\mu^2}, \tag{1.22}$$

k_T ist in diesem Fall der Transversalimpuls des Gluons g bezogen auf die Richtung des einlaufenden Quarks q. Der Parameter μ regularisiert die Divergenz für $k_T \to 0$. Das Auftreten dieser Terme wird in der pertubativen QCD durch eine Redefinition der Partondichten vermieden. Dazu führt man eine Faktorisierungsskala μ_f ein, zerlegt die rechte Seite der Gleichung (1.22) in $\ln(Q^2/\mu_f^2) + \ln(\mu_f^2/\mu^2))$ und absorbiert den zweiten Summanden in die Partondichten. Der verbleibende erste Summand liefert eine Unsicherheit bezüglich der Faktorisierungs-Skala und verschwindet für die übliche Wahl $\mu_f^2 = \mu_r^2 = Q^2$; dann werden Partondichten eine Funktion von x und Q^2.

Nach einem Theorem von Kinoshita, Lee und Nauenberg [6, 7] werden in inklusiven Messungen die Divergenzen des BGF- und QCD-Compton-Prozesses im Endzustand durch die Divergenz in dem Graphen der Vertexkorrektur kompensiert. Damit ist der inklusive Wirkungsquerschnitt σ_{tot} zur Ordnung α_s in der pertubativen QCD endlich.

Für den Endzustand mit zwei auslaufenden Partonen kann jedoch kein endlicher Wirkungsquerschnitt σ_{2+1} (der Remnant R wird separat (+1) gezählt) angegeben werden. Indem man die Integration der $\mathcal{O}(\alpha_s)$-Matrixelemente (1.20) und (1.21) über den Zwei-Partonen-Phasenraum auf einen Bereich außerhalb der Singularitäten beschränkt, kann ein sogenanner (2+1) Jet-Phasenraum definiert werden, in dem der Wirkungsquerschnitt σ_{2+1} endlich ist. Entsprechend der Absorption der Divergenzen reeller Prozesse im Anfangszustand in die Partondichten bei der Faktorisierungsskala μ_f, werden hier kollineare und infrarote Singularitäten der auslaufenden Partonen der reellen Diagramme bei einer (willkürlichen) Jet-Auflösungsskala in Jets absorbiert (siehe auch Abschnitt 3.3.1). Der Wirkungsquerschnitt in dem verbleibenden Phasenraumbereich definiert den (1+1) Jet-Wirkungsquerschnitt: $\sigma_{1+1} = \sigma_{tot} - \sigma_{2+1}$.

Zur führenden Ordnung in α_s ist die Beziehung zwischen den Quarkdichten $q(x, Q^2)$, der Gluondichte $g(x, Q^2)$ und dem (2+1) Jet-Wirkungsquerschnitt durch

$$\frac{d\sigma_{2+1}}{dxdQ^2} = C_g(x, Q^2)\, g(x, Q^2) + \sum_q C_q(x, Q^2)\, q(x, Q^2) \tag{1.23}$$

gegeben. Die Funktionen C_g und C_q können für einen gegebenen Jet-Algorithmus und einer gegebenen Jet-Auflösungsskala in der pertubativen QCD berechnet werden. Für den Jade-Algorithus [8] stehen analytische Ausdrücke für C_g und C_q zur Verfügung [9], während für den in der vorliegenden Analyse verwendeten Cone-Algorithmus numerische Verfahren verwendet werden müssen.

DGLAP-Gleichungen

Die Wahrscheinlichkeiten, daß ein Parton j durch Abstrahlung eines Partons k (mit dem Impulsanteil $1 - z$ von j) in ein Parton i (mit dem Impulsanteil z von j) übergeht (siehe Abbildung 1.5), sind durch die *Splitting-Funktionen* P_{ij} gegeben. Diese Funktionen sind in der pertubativen QCD berechenbar [10]; sie lauten zur führenden Ordnung in α_s:

$$P_{qq}^{\text{LO}} = \frac{4}{3}\left[\frac{1+z^2}{1-z}\right]_+ + 2\delta(1-z), \tag{1.24}$$

$$P_{gq}^{\text{LO}} = \frac{4}{3}\frac{1+(1-z)^2}{z}, \tag{1.25}$$

$$P_{qg}^{\text{LO}} = \frac{1}{2}\left(z^2 + (1-z)^2\right), \tag{1.26}$$

$$P_{gg}^{\text{LO}} = 6\left(\frac{1-z}{z} + z(1-z) + \left[\frac{z}{1-z}\right]_+ + \frac{11}{12}\delta(1-z)\right) - \frac{n_f}{3}\delta(1-z), \tag{1.27}$$



Abbildung 1.5: Feynmangraphen reeller Prozesse zur Ordnung α_s (von links nach rechts) für den Quark-Gluon-Vertex ($P_{qq}^{\text{LO}}, P_{gq}^{\text{LO}}$), den Annihilations-Vertex des Gluons (P_{qg}^{LO}) und den Drei-Gluonen-Vertex (P_{gg}^{LO}). Nicht gezeigte Graphen virtueller Prozesse führen zu den δ-Funktionen in den Ausdrücken für P_{qq}^{LO} und P_{gg}^{LO}.

wobei die Distribution $[f(x)/(1-x)]_+$ wie folgt definiert ist:

$$[f(x)/(1-x)]_+ \equiv \int_0^1 dx \frac{f(x)}{(1-x)_+} = \int_0^1 dx \frac{f(x)-f(1)}{1-x}. \tag{1.28}$$

Quark-Antiquark-Paare, die durch den Prozeß $g \to q\bar{q}$ entstehen, nennt man See-Quarks. Es ist üblich, eine Quarkdichte q in einen See- und einen Valenz-Anteil aufzuspalten: $q = q_{val} + q_{see}$.

Für die u-Quarkverteilung im Proton ist z.B. $u_{val} = u - \bar{u}$ und $u_{see} = \bar{u}$. Die Q^2-Entwicklung von Partondichten ist in der pertubativen QCD durch die DGLAP-Gleichungen gegeben [11, 12, 10]. Es gibt insgesamt $(n_f + 1)$ Entwicklungsgleichungen für die n_f Quarkdichten und die Gluondichte, wobei für die Q^2-Entwicklung der Gluondichte n_f Quarkdichte-Parametrisierungen bekannt sein müssen. Um dieses Differentialgleichungssystem möglichst weit zu entkoppeln, ist es üblich, durch

$$q_{NS} = q - q' \qquad \text{und} \qquad q_S = \sum_{q\in\{u,d,\ldots\}} (q + \bar{q}), \tag{1.29}$$

Singulett (q_S) und Non-Singulett (q_{NS}) Verteilungen einzuführen. Damit lassen sich die DGLAP-Gleichungen zur führenden Ordnung in α_s schreiben als:

$$Q^2 \frac{\partial q_{NS}}{\partial Q^2} = \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi} P_{qq}^{\text{LO}} \otimes q_{NS}, \tag{1.30}$$

$$Q^2 \frac{\partial}{\partial Q^2} \begin{pmatrix} q_S \\ g \end{pmatrix} = \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi} \begin{pmatrix} P_{qq}^{\text{LO}} & 2n_f P_{qg}^{\text{LO}} \\ P_{gq}^{\text{LO}} & P_{gg}^{\text{LO}} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} q_S \\ g \end{pmatrix}, \tag{1.31}$$

wobei „$\otimes$“ als Abkürzung für das Faltungsintegral

$$P_{ij}^{\text{LO}} \otimes h = \int_x^1 \frac{d\xi}{\xi} h(\xi) P_{ij}^{\text{LO}} \left(\frac{x}{\xi}\right), \quad \text{mit} \quad h \in \{q_S, q_{NS}, g\} \tag{1.32}$$

benutzt wurde. Man erkennt, daß nach der Einführung von q_S und q_{NS} für die Entwicklung der Gluondichte nur noch eine Parametrisierung, die Singulett-Verteilung, bekannt sein muß. Die Singulett-Verteilung wird für kleiner werdendes x immer stärker durch den Seequark-Anteil dominiert. Weiterhin erkennt man, daß die Entwicklung der Valenzquark-Verteilungen durch die separate Entwicklungsgleichung (1.30) für Non-Singulett-Verteilungen von der Gluondichte entkoppelt sind (z.B. ist $u_{val} = u - \bar{u}$ eine Non-Singulett-Verteilung).

Die LO DGLAP-Gleichungen beschreiben eine störungstheoretische Entwicklung der Partondichten nach Potenzen von $\alpha_s \ln(Q^2/\mu^2)$; durch sie wird die Q^2-Entwicklung von LO Partondichten definiert. Die untere Grenze in dem Integral der Gleichung (1.32) ist x, so daß die Parametrisierungen der Partondichten in der Q^2-Entwicklung nur für $\xi > x$ bekannt sein müssen. Ausgehend von einem gegebenen Satz von Parametrisierungen an der Stelle Q_0^2, lassen sich Partondichten an einer beliebigen Stelle Q^2 durch Lösen dieser Integro-Differentialgleichungen berechnen.

In den LO DGLAP-Gleichungen gilt ein strenges Ordnungsschema für den Transversalimpuls p_T suksessiver Partonemissionen ($Q_0^2 \ll p_{T1}^2 \ll p_{T2}^2 \ll \cdots \ll Q_n^2$).

Der Bereich, in dem die Approximation der DGLAP-Gleichungen gültig ist, wird durch

$$\alpha_s(Q^2)\ln(Q^2/Q_0^2) \simeq 1 \tag{1.33}$$
$$\alpha_s(Q^2)\ln(1/x) \ll 1 \tag{1.34}$$
$$\alpha_s(Q^2) \ll 1 \tag{1.35}$$

begrenzt.

Korrekturterme der nächst höheren Ordnung in α_s

In den Korrekturtermen der nächst höheren Ordnung in α_s (NLO, next-to-leading order) treten neben zusätzlichen Feynmangraphen (siehe Abbildung 4.8 auf Seite 82) und singulären Termen der Form (1.22) auch endliche Beiträge aus dem Subprozeß der Ordnung α_s auf. Die Separation dieser endlichen Terme in Partondichten und Splitting-Funktionen ist nicht eindeutig und wird durch das *Faktorisierungsschema* festgelegt; häufig verwendet werden das $\overline{\mathrm{MS}}$- [13] und das DIS [14] Schema. Zu jedem dieser Faktorisierungsschemata gibt es einen korrespondierenden Satz Partondichten und Splitting-Funktionen.

Die Beziehung der Gluondichte zwischen dem $\overline{\mathrm{MS}}$ und DIS Schema ist durch eine Gleichung der Form

$$g^{\mathrm{DIS}} = g^{\overline{\mathrm{MS}}} - \frac{\alpha_s}{2\pi}\left(\sum_q \left[C_q^{\overline{\mathrm{MS}}} \otimes (q+\bar{q})^{\overline{\mathrm{MS}}}\right] + C_g^{\overline{\mathrm{MS}}} \otimes g^{\overline{\mathrm{MS}}}\right) + \mathcal{O}(\alpha_s^2) \tag{1.36}$$

gegeben.

Die NLO DGLAP-Gleichungen erhält man aus den Gleichungen (1.30) und (1.31), indem die LO Splitting-Funktionen durch die entsprechenden NLO Ausdrücke des jeweiligen Faktorisierungsschemas ersetzt werden. Diese Gleichungen beschreiben eine störungstheoretische Entwicklung der Partondichten nach führenden Logarithmen der Form $\alpha_s^n \ln^n(Q^2/\mu^2)$

und $\alpha_s^n \ln^{n-1}(Q^2/\mu^2)$ und definieren die Q^2-Entwicklung von NLO Partondichten. Im Gegensatz zu den LO DGLAP-Gleichungen ist das strenge Ordnungsschema für den Transversalimpuls p_T suksessiver Partonemissionen aufgehoben.

Die NLO-Ausdruck für α_s ergibt sich aus Gleichung (1.16) zu:

$$\alpha_s^{\text{NLO}}\left(\mu_r^2, \Lambda_{\overline{\text{MS}}}\right) = \frac{4\pi}{\beta_0 \cdot L}\left(1 - \frac{\beta_1}{\beta_0^2} \cdot \frac{\ln L}{L}\right) \quad \text{mit} \quad L = \ln \frac{\mu_r^2}{\Lambda_{\overline{\text{MS}}}^2}. \tag{1.37}$$

wobei die Definition des Parameters Λ vom Renormierungsschema abhängt. In den NLO Rechnungen dieser Analyse wird das $\overline{\text{MS}}$-Schema verwendet (das $\overline{\text{MS}}$ und das DIS-Schema sind sowohl Renormierungsschema als auch Faktorisierungsschema).

1.2 Qualitative Vorhersagen der Gluondichte für kleines x_g

1.2.1 Die doppelt logarithmische Approximation

Die doppelt logarithmische Approximation (DLLA, double leading log approximation) [5] beschreibt die Entwicklung von Partondichten nach führenden Logarithmen der Form $[\alpha_s \ln(1/x_g)\ln(Q^2)]^n$. Der Gültigkeitsbereich dieser Näherung ist durch

$$\alpha_s(Q^2)\ln(1/x_g)\ln\left(Q^2/Q_0^2\right) \simeq 1 \tag{1.38}$$

$$\alpha_s(Q^2)\ln(1/x_g) \ll 1 \tag{1.39}$$

$$\alpha_s(Q^2)\ln\left(Q^2/Q_0^2\right) \ll 1 \tag{1.40}$$

gegeben. Es wird angenommen, daß das Verhalten der Gluondichte für kleine Impulsbruchteile x_g durch Gluonen allein dominiert wird, und man vernachlässigt die qg-Mischung in den DGLAP-Gleichungen. Weiterhin wird die Splitting-Funktion P_{gg}^{LO} durch $6/z$ approximiert; damit kann Gleichung (1.31) als

$$\frac{\partial x_g g(x_g, Q^2)}{\partial \ln Q^2} = \frac{3\alpha_s}{\pi} \int_{x_g}^{1} \frac{d\xi}{\xi}\left[\xi g(\xi, Q^2)\right] \tag{1.41}$$

geschrieben werden, und man findet folgendes dominierende Verhalten der Gluonverteilung für kleines x_g:

$$x_g g(x_g) \simeq \exp\left(2\left[\frac{12}{\beta_0}\ln\left(\frac{1}{x_g}\right)\ln\frac{\ln\left(Q^2/\Lambda^2\right)}{\ln\left(Q_0^2/\Lambda^2\right)}\right]^{\frac{1}{2}}\right). \tag{1.42}$$

In der DLL-Approximation steigt die Gluonverteilung für $x_g \to 0$ steiler als jede Potenz von $\ln(1/x_g)$, und zu jedem λ gibt es ein x_g', so daß die DLL-Approximation für $x_g < x_g'$ schwächer steigt als $x_g^{-\lambda}$.

Mit den DGLAP-Gleichungen und der DLL-Approximation kann das Verhalten der Gluondichte für $x_g \to 0$ nicht bestimmt werden, da mit kleiner werdendem x_g der Term $\ln(1/x_g)$ beliebig groß wird und damit den Gültigkeitsbereich dieser Approximationen verletzt. Unter der Annahme, daß die DGLAP-Gleichungen bis $x \simeq 10^{-3}$ gültig sind, zeigt der Vergleich von LO und NLO Partondichten, daß schon die Berücksichtigung der nächst höheren Ordnung in α_s den Anstieg der Gluondichte im Vergleich zur führenden Ordnung verringert (siehe Abbildung 1.7).

1.2.2 BFKL-Gleichung

Die Gleichung von Balitsky, Fadin, Kurajev und Lipatov [15, 16] beschreibt eine störungstheoretische Entwicklung der Partondichten nach Potenzen der Form $(\alpha_s \ln 1/x_g)^n$. Durch sie wird das qualitative, asymptotische LO Verhalten von Partondichten bei sehr kleinem x vermittelt. Im Gegensatz zu den DGLAP-Gleichungen, die (wie die Ausdrücke für α_s) aus einer Renormierungsgruppen-Gleichung abgeleitet werden können, ist es aus der Theorie nicht ersichtlich, welche Diagramme die führenden Beiträge zur BFKL-Gleichung liefern. Der Gültigkeitsbereich der BFKL-Gleichung liegt in der xQ^2-Ebene orthogonal zu dem der DGLAP-Gleichungen:

$$\alpha_s(Q_0^2)\ln(Q^2/Q_0^2) \ll 1 \tag{1.43}$$

$$\alpha_s(Q_0^2)\ln(1/x_g) \simeq 1 \tag{1.44}$$

$$\alpha_s(Q_0^2) \ll 1 \tag{1.45}$$

Die BFKL-Gleichung kann nur unter der Annahme einer konstanten Kopplungskonstanten α_s abgeleitet werden. Mit der Definition

$$\Phi(x_g, k_T^2) = \left.\frac{\partial x_g g(x_g, Q^2)}{\partial \ln Q^2}\right|_{Q^2=k_T^2} \tag{1.46}$$

kann die BFKL-Gleichung geschrieben werden als [17]

$$\frac{\partial \Phi(x_g)}{\partial \ln(1/x_g)} = \mathcal{K} \otimes \Phi(x_g) = \lambda \Phi(x_g), \tag{1.47}$$

hierbei ist $\mathcal{K}$ der Lipatov-Kern. Für kleines x_g wird das Verhalten von Φ durch den größten Eigenwert λ^{max} dieser Eigenwertgleichung bestimmt. Aus $\Phi(x_g) \propto \exp(\lambda \ln(1/x_g)) = x_g^{-\lambda}$ folgt mit (1.47)

$$x_g g(x_g) \propto x_g^{-\lambda^{max}}. \tag{1.48}$$

Eine Abschätzung für den Eigenwert λ^{max} ergibt sich für das fixierte $\alpha_s(k_T^2)$ zu [5]

$$3.6\frac{\alpha_s(k_T^2)}{\pi} \leq \lambda_{max} \leq 12\ln 2\frac{\alpha_s(k_T^2)}{\pi}. \tag{1.49}$$

Damit erhält man

$$0.5 \lesssim \lambda_{max} \lesssim 1.2 \quad \text{für} \quad (k_T^2 = 1\,\mathrm{GeV}^2) \tag{1.50}$$

$$0.3 \lesssim \lambda_{max} \lesssim 0.7 \quad \text{für} \quad (k_T^2 = 10\,\mathrm{GeV}^2). \tag{1.51}$$

Für $x_g \to 0$ wird durch die BFKL-Gleichung ein steiles Ansteigen der Gluonverteilung $x_g g(x_g)$ der Form $x_g^{-\lambda^{max}}$ mit einem „typischen“ Exponenten $\lambda^{max} \simeq 0.5$ vorhergesagt. Die BFKL-Gleichung läßt viele Fragen, wie die Berücksichtigung der Q^2-Abhängigkeit der Kopplungskonstanten α_s sowie die Formulierung dieser Gleichung in NLO unbeantwortet.

1.2.3 GLR-Gleichung

In den diskutierten Approximationen für $x_g g(x_g)$ steigt die Wahrscheinlichkeit, ein Gluon mit dem Impulsanteil x_g im Proton zu finden, mit kleiner werdendem x_g stark an. Mit zunehmender Dichte der Gluonen muß aber auch die Wahrscheinlichkeit für die Rekombination von Gluonen ansteigen, dieser Effekt darf bei der Vorhersage von Partondichten für $x_g \to 0$ nicht vernachlässigt werden. Die Gleichung von Gribov, Lipatov und Ryskin [18, 19] basiert auf der Idee, daß ab einer kritischen Dichte der Gluonen im Proton ein Sättigungpunkt erreicht wird, bei dem Gluonemissionen und Gluonrekombinationen einen Gleichgewichtszustand bilden, und damit ein weiteres Ansteigen der Gluondichte verhindert wird. Die DGLAP-Form der GLR-Gleichung lautet:

$$\frac{\partial(x_g g(x_g, Q^2))}{\partial \ln Q^2} = [P_{gg} \otimes g + P_{gq} \otimes q] - \frac{81\alpha_s^2}{16 R_s^2 Q^2} \int_{x_g}^{1} \frac{d\xi}{\xi} \left(\xi g(\xi, Q^2)\right)^2 . \tag{1.52}$$

Der DGLAP-Kern (eckige Klammern) erzeugt den schon diskutierten Anstieg der Gluondichte für kleiner werdendes x_g, während der Integralausdruck die dämpfend wirkenden Gluonrekombinationen berücksichtigt. In dieser Vorstellung spielt der Radius R_s eine entscheidende Rolle, er bestimmt den Gleichgewichtszustand der GLR-Gleichung. Durch seine Messung kann eine Aussage über die Konzentration der Gluonen im Proton gewonnen werden. Ist $R_s \simeq 5\,\mathrm{GeV}^{-1}$ kann angenommen werden, daß die Gluonen gleichförmig im Proton verteilt sind, während sich für $R_s \simeq 2\,\mathrm{GeV}^{-1}$ Gluonen in sogenannten „hot-spots“ konzentrieren [20] und Sättigungseffekte damit schon bei Radien $R_s \ll R_p$ (R_p ist der Protonradius) einsetzen. Wann sich die Vorhersage der GLR-Gleichung für die Verletzung des Skalenverhaltens von F_2 in dem für *HERA* relevanten kinematischen Bereich von den Vorhersagen der DGLAP- und BFKL-Gleichungen unterscheidet, ist in [21, 22] untersucht worden. Neuere Untersuchungen [23] zeigen, daß Rekombinationseffekte in diesem Bereich als sehr klein angenommen werden können.

1.3 Partondichte-Parametrisierungen

Bis heute gibt es kein theoretisch konsistentes Verfahren, wie Partondichten in x zu entwickeln sind. Aus diesem Grund wird konventionell ein *(ad hoc)* Ansatz $\phi(x, Q_0^2)$ der Partondichte ϕ unter Verwendung der DGLAP-Gleichungen bei der Skala Q^2 an experimentelle Daten für $x > x^{exp}$ angepaßt. Hierbei bezeichnet x^{exp} den minimalen Impulsanteil x, den das jeweilige Experiment noch zu messen vermag. Extrapolationen in den

Bereich $x < x^{exp}$ sind von der speziell gewählten Form des Ansatzes abhängig und damit willkürlich.

In dem Zeitraum von 1977 bis 1993 wurden sehr viele verschiedene Sätze von Partondichte-Parametrisierungen entwickelt, die zum Teil in den Programm-Bibliotheken PDFLIB [24] und PAKPDF [25] zur Verfügung stehen. Partonverteilungen konnten durch Fixed-Target Experimente wie NMC nur bis zu $x \simeq 10^{-1}$ gemessen werden. Erst in den Jahren 1992 und 1993, als bei *HERA* die ersten Ergebnisse der Strukturfunktion F_2 veröffentlicht wurden, konnte dieser Bereich auf $x \simeq 10^{-4}$ erweitert werden. Ein großer Teil der Parametrisierungen, wie der Satz MRS D_0 [26], in dem ein „flacher“ Anstieg der Gluonverteilung $x_g g(x_g)$ angenomen wurde, waren damit veraltet.

In der Form des Ansatzes für die Parametrisierungen der Quarkdichten und der Gluondichte, sowie der Referenzskala Q_0^2 unterscheiden sich verschiedene Sätze (bzw. Modelle) von Partondichte-Parametrisierungen. In den QCD-Fits der MRS- [27] und CTEQ-Gruppe [28] wird der Parameter Q_0^2 in einem Bereich gewählt, in dem die pertubative QCD anwendbar ist, CTEQ: $Q_0^2 = 2.56\,\mathrm{GeV}^2$ und MRS: $Q_0^2 = 4\,\mathrm{GeV}^2$. Im Gegensatz hierzu wird in dem GRV-Modell [29] angenommen, daß die DGLAP-Gleichungen bis zu der kleinen Skala $Q_0^2 = 0.23\,\mathrm{GeV}^2$ gültig sind, und daß die Gluon- und die Seequark-Verteilungen bei diesem Q_0^2 eine den Valenzquark-Verteilungen ähnliche funktionale Gestalt besitzen. Abgesehen von Korrekturtermen ist das dominierende Verhalten der Gluondichte in den genannten Parametrisierungen durch den Ausdruck

$$x_g g(x_g, Q_0^2) = A_g x_g^{B_g} (1 - x_g)^{C_g} \tag{1.53}$$

gegeben. Ein direkter Vergleich der Parameter des GRV-Modells mit denen der MRS- und CTEQ-Parametrisierungen verbietet sich aufgrund der unterschiedlichen Referenzskala Q_0^2.

Der Term $(1 - x_g)^{C_g}$ dominiert das Verhalten der Gluondichte für große x_g. Die Kenntnis des Exponenten C_g beruht fast ausschließlich auf Ergebnissen der direkten Photon Erzeugung (siehe Abbildung 1.6) in Proton-Proton Streuexperimenten mit stationärem Target (z.B. WA70 [30]). Für die bei Experimenten mit stationärem Target typisch hohen



Abbildung 1.6: Generische Feynmangraphen für die Erzeugung direkter Photon. Antiquark-Verteilungen kommen im Proton ausschließlich als Seequark-Verteilungen vor, so daß der rechte Graph in der pp-Streuung im Gegensatz zur $p\bar{p}$-Streuung unterdrückt ist. Der dominierende Graph für die Erzeugung direkter Photonen in der pp-Streuung ist damit gluon-initiiert.

x-Werte ($x \gtrsim 0.3$) sind die Quarkdichte-Verteilungen im Proton durch Strukturfunktionsmessungen sehr genau bekannt, und es kann durch die hauptsächlich gluon-initiierte Erzeugung prompter Photonen in der pp-Streuung direkt auf die Gluondichte geschlossen werden. Aus der Impuls-Summenregel

$$\int_0^1 x \left\{ \sum_{q=u,d,\ldots} \left[q(x,Q^2) + \bar{q}(x,Q^2) \right] + g(x,Q^2) \right\} dx = 1. \tag{1.54}$$

kann die absolute Normierung der Gluondichte bestimmt werden.

Abbildung 1.7 zeigt die Gluon- und Quarkverteilungen der genannten Parametrisierungen für den in dieser Analyse relevanten x-Bereich ($2 \cdot 10^{-3} \lesssim x \lesssim 2 \cdot 10^{-1}$). Durch die in den Jahren 1993 und 1994 von den Experimenten H1 und ZEUS veröffentlichten Strukturfunktions-Messungen sind die Unsicherheiten in der Kenntnis der Quarkdichte-Verteilungen stark verkleinert worden, die Differenz zwischen den gezeigten Parametrisierungen ist kleiner als 20% für $x = 10^{-3}$, während die maximale Abweichung der Gluondichte-Parametrisierungen bei demselben x fast einen Faktor zwei beträgt. Dies zeigt, daß die Gluondichte in dem dieser Analyse zugrundeliegenden Bereich nicht wesentlich durch die Impuls-Summenregel (1.54) beschränkt wird.

Die Zusammensetzung des (2+1) Jet-Wirkungsquerschnitts aus quark- und gluon-initiierten Prozessen ist als Funktion der kinematischen Variablen Q^2 in Abbildung 1.8 gezeigt. Diese Analyse beschränkt sich auf Q^2-Werte zwischen $12.5\,\mathrm{GeV}^2$ und $80\,\mathrm{GeV}^2$. Man erkennt, daß der (2+1) Jet-Wirkungsquerschnitt in diesem Bereich durch den BGF-Prozeß dominiert wird. Erst für $Q^2 \simeq 300\,\mathrm{GeV}^2$ erreicht der quark-initiierte Anteil etwa 50%.



Abbildung 1.7: Vergleich der LO GRV'94 (——), NLO GRV'94 ($- \cdot - \cdot$), LO CTEQ3L ($- - -$) und NLO MRSH ($\cdots\cdots$) Partondichte-Parametrisierungen als Funktion von x für $\mu_f^2 = Q^2 = 30\,\mathrm{GeV}^2$. **a)** Für die u-Quarkdichte-Verteilung im Proton und **b)** die Gluonverteilung.



Abbildung 1.8: Anteil von quark- (– – –) und gluon-initiierten (——) Prozessen am (2+1) Jet-Wirkungsquerschnitt σ_{2+1} als Funktion von Q^2 in dem kinematischen Bereich der vorliegenden Analyse für die LO GRV'94 Parametrisierung.

1.4 Monte Carlo Programme

1.4.1 Überblick

Monte Carlo Programme lassen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Ziele in *Wirkungsquerschnitt-Integratoren* (Projet [31] und Disjet [32]) und *Ereignis-Generatoren* (ARIADNE [33, 34], HERWIG [35, 36], LEPTO [37]) unterteilen.

Wirkungsquerschnitt-Integratoren ermöglichen die Berechnung von Jet-Wirkungsquerschnitten in fester Ordnung α_s auf der Partonebene für einen gegebenen Jet-Algorithmus in Abhängigkeit einer kleinen Anzahl freier Parameter, die im wesentlichen durch Λ und einem Satz von Partondichten gegeben sind. In typischen Anwendungen wird aus dem Vergleich zwischen gemessenen Jet-Wirkungsquerschnitten und den Vorhersagen dieser Programme in einem gegebenen kinematischen Bereich auf fundamentale Parameter der QCD (vergl. z.B. [38]) und Partondichten geschlossen.

In Ereignis-Generatoren werden Partonen, basierend auf den QCD-Matrixelementen oder (und) Approximationen der Störungsreihe der pertubativen QCD (Partonschauer- [39, 40], Farbdipol-Modell [41, 42]), typisch in einem sehr viel größeren kinematischen Bereich als dem der experimentellen Messung erzeugt. Nach dem QCD-Prozeß werden aus den generierten Partonen durch ein phänomenologisches Fragmentationsmodell (String- [43, 44], Cluster-Fragmentation [45]) Hadronen erzeugt. Mit Hilfe eines Simulationsprogramms werden die Wechselwirkungen der Teilchen mit dem Detektormaterial und die daraus resultierende Detektorantwort simuliert, so daß simulierte Ereignisse direkt mit denen der gemessenen Daten verglichen werden können. Zu jedem dieser Monte Carlo Modelle gibt es einen (im Vergleich zu den Wirkungsquerschnitt-Integratoren sehr viel größeren) Satz Parameter, der es erlaubt, Verteilungen simulierter Ereignisse an die der experimentellen Daten anzupassen.

Zur Vorhersage von Jet-Wirkungsquerschnitten und zur Entfaltung der Gluondichte wird in der vorliegenden Arbeit ein mit dem LEPTO-Generator generierter Datensatz benutzt; dieser Generator beschreibt im Vergleich zu den anderen genannten Modellen die Eigenschaften von Multijet-Ereignissen am besten. Im folgenden werden der LEPTO-Generator und die verwendeten Optionen kurz erläutert.

1.4.2 LEPTO

Behandlung des QCD-Subprozesses

In dem LEPTO-Generator wurden die $\mathcal{O}(\alpha_s)$-Matrixelemente für den QCD-Compton- und den BGF-Prozeß verwendet (siehe Gleichungen (1.20) und (1.21) und Abbildung 1.4). Für die Abstrahlung kollinearer oder niederenergetischer Partonen werden die Matrixelemente singulär. In LEPTO wird das Auftreten dieser Singularitäten durch die Bedingung vermieden, daß die Quadrate der invarianten Massenkombinationen m_{ij}^2 zwischen allen Paaren des hadronischen Endzustands einschließlich des Proton-Remnants einen bestimmten Wert m_{min}^2 nicht unterschreiten dürfen. Durch Integration der Matrixelemente über den durch $m_{ij}^2 > m_{min}^2$ definierten Zwei-Partonen-Phasenraum werden in einem gegebenem kinematischen Bereich Wahrscheinlichkeiten (P_{QCD-C} und P_{BGF}) berechnet, QCD-Compton- und BGF-Ereignisse zu generieren. Die verbleibende Wahrscheinlichkeit, ein QPM-Ereignis zu generieren, ist durch $1 - P_{BGF} - P_{QCD-C}$ gegeben.

QCD-Korrekturen höherer Ordnung in α_s werden in LEPTO approximativ durch das *Partonschauermodell* berücksichtigt, indem durch iterative Partonemissionen, basierend auf den durch die Splitting-Funktionen (1.24–1.27) gegebenen Wahrscheinlichkeiten, eine Partonkaskade generiert wird. Die maximale Virtualität für die Abstrahlung von Partonen in dem Partonschauer ist auf Werte $m_{ij}^2 < m_{min}^2$ beschränkt, da die erste Abstrahlung eines Partons durch die $\mathcal{O}(\alpha_s)$ Matrixelemente berücksichtigt wird. In $\mathcal{O}(\alpha_s)$-Prozessen ist damit die härteste Partonemission durch die Matrixelemente gegeben, und Partonschauer können nur noch weichere Abstahlungen erzeugen. Man unterscheidet den Bereich vor *(Anfangszustand)* und nach *(Endzustand)* der Photon-Parton-Wechselwirkung, wobei in dem Partonschauer des Anfangszustands, beginnend bei der harten Wechselwirkung, eine Rückwärtsentwicklung der Partonkaskade durchgeführt werden muß. Diese Unterscheidung bedeutet, daß Interferenzterme zwischen diesen Zuständen nicht berücksichtigt werden; aus diesem Grund ist das Partonschauermodell nicht eichinvariant.

Der kinematische Bereich dieser Analyse

Die vorliegende Analyse basiert auf dem Vergleich zwischen gemessenen und theoretisch vorhergesagten (2+1) Jet-Wirkungsquerschnitten. Hieraus ergibt sich die Forderung, daß der generierte kinematische Bereich möglichst vollständig durch die QCD-Matrixelemente (exakte pertubative QCD zur Ordnung α_s) und nur geringfügig durch die Partonschauer-Approximation abgedeckt werden sollte. Abbildung 1.9 zeigt die Verteilung generierter $\mathcal{O}(\alpha_s)$-Ereignisse des LEPTO-Generators in der $\sqrt{\hat{s}}$-W-Ebene. Man erkennt, daß die invariante Masse $\sqrt{\hat{s}}$ des harten Subsystems und die Masse W des gesamten hadronischen Systems nicht korreliert sind.

In der Standard-Implementation des LEPTO-Generators wird der Parameter m^2_{min} auf Werte oberhalb $y_c W^2$ beschränkt, wobei der Parameter y_c einen (willkürlichen) Jet-Auflösungsparameter darstellt. Aus Abbildung 1.9 ist ersichtlich, daß hierdurch der kinematische Bereich in der $\sqrt{\hat{s}}$-W-Ebene in zwei Bereiche aufgeteilt wird, wobei in dem Bereich mit $\hat{s} < y_c \cdot W^2$ die Abstrahlung von Partonen nicht durch die QCD-Matrixelemente, sondern durch die Partonschauer-Approximation bestimmt wird. Aus $x_g = x_B + (1 - x_B)\hat{s}/W^2$ und $\hat{s} > y_c W^2$ folgt $x_g > y_c$, so daß der Wert für y_c niedrig gewählt werden muß, damit



Abbildung 1.9: Verteilung generierter $\mathcal{O}(\alpha_s)$ Ereignisse des LEPTO Monte Carlo Datensatzes dieser Analyse in der $\sqrt{\hat{s}}$-W-Ebene. Die durchgezogene Gerade entpricht der Funktion $\hat{s} = y_c W^2$ mit $y_c = 0.015$. Eingezeichnet wurden Linien für konstantes x_g für das mittlere Q^2 der selektierten Ereignisse dieser Analyse von $<Q^2>= 30\,\mathrm{GeV}^2$ entprechend der Beziehung $x_g = (\hat{s} + Q^2)/(W^2 + Q^2)$. Der schraffierte Bereich repräsentiert den Bereich, in dem die pertubative QCD nicht mehr angewendet werden kann, und der (2+1) Jet-Wirkungsquerschnitt größer als der totale Wirkungsquerschnitt σ_{tot} ist.

Ereignisse mit kleinem x_g durch die $\mathcal{O}(\alpha_s)$-Matrixelemente generiert werden (diese Option wurde in den Analysen [46, 47] verwendet). In bestimmten kinematischen Bereichen (kleine W^2) kann die Berechnung von Wirkungsquerschnitten in der pertubativen QCD $\mathcal{O}(\alpha_s)$ für kleine y_c ($y_c \simeq 10^{-3}$) zu unphysikalischen Ergebnissen führen ($\sigma_{2+1} > \sigma_{tot}$). Dies wird in LEPTO verhindert, indem der Jet-Auflösungsparameter y_c auf einen unkritischen Wert erhöht wird. Wegen $x_g > y_c$ ist hierdurch die untere Grenze für das generierte x_g nicht wohl definiert.

Um dieses Problem und die nicht notwendige Beschränkung des kinematischen Bereichs für $\mathcal{O}(\alpha_s)$-Ereignisse durch die Skala W^2 zu vermeiden, wurde der minimale Wert m_{min} für die invarianten Massenkombinationen m_{ij} als Funktion von W^2 derart parametrisiert, so daß m_{min} stets 2 GeV oberhalb des Wertes gesetzt wird, bei dem der (2+1) Jet-Wirkungsquerschnitt den totalen Wirkungsquerschnitt überschreitet. Hierdurch wird sichergestellt, daß in LEPTO Ereignisse in einem Bereich generiert werden, in dem die pertubative QCD angewendet werden kann, und ein möglichst großer x_g-Bereich durch die QCD-Matrixelemente abgedeckt wird (siehe Abbildung 1.9). Generiert wurden auch QPM-Ereignisse mit QCD-Korrekturen höherer Ordnung (Partonschauer), die den Bereich kleiner $\sqrt{\hat{s}}$ ($\sqrt{\hat{s}} \lesssim 5\,\text{GeV}$) abdecken (diese sind in Abbildung 1.9 nicht eingezeichnet), so daß auch Migrationen dieses Ereignistyps in dem (2+1) Jet-Wirkungsquerschnitt berücksichtigt werden. In der Ereignisselektion wird verlangt, daß das rekonstruierte $\sqrt{\hat{s}}$ größer als 10 GeV ist (siehe Abschnitt 3.4.2).

Schwere Quarks

In der Quantenelektrodynamik (QED) ist die Kopplung der Quarks an das Photon proportional zum Quadrat der Quarkladungen. Man erhält damit folgende Verhältnisse für die Erzeugung verschiedener Flavour in dem BGF-Prozeß:

$$u : d : s : c : b = 4 : 1 : 1 : 4 : 1. \tag{1.55}$$

Der aus der QED erwartete Anteil schwerer Quarks am BGF-Wirkungsquerschnitt für fünf Flavours beträgt damit $4/11 = 36.4\%$ für *Charm* und $1/11 = 9.1\%$ für *Bottom*.

In den QCD-Matrixelementen der genannten Monte Carlo Generatoren werden die Massen der Quarks vernachlässigt. Es können jedoch nur diejenigen $q\bar{q}$-Paare erzeugt werden, deren Masse $2m_q$ kleiner als das gewürfelte $\sqrt{\hat{s}}$ des Ereignisses ist. In der vorliegenden Analyse ist die Masse $2m_b$ in derselben Größenordnung wie der Analyseschnitt $\sqrt{\hat{s}} > 10\,\text{GeV}$ der steil abfallenden $\sqrt{\hat{s}}$-Verteilung, so daß ein großer Teil der zur Verfügung stehenden Energie zur Bildung eines $b\bar{b}$-Paares für die Erzeugung der Quarkmassen aufgebraucht wird. Durch die Massen der Quarks wird der Phasenraum für die Erzeugung eines $q\bar{q}$-Paares verkleinert, so daß man einen kleineren Anteil für $\sigma_{b\bar{b}}$ (und auch für $\sigma_{c\bar{c}}$) am gesamten BGF-Wirkungsquerschnitt als die genannten 9.1% (bzw. 36.4%) erwartet.

In LEPTO wird dieser Effekt durch eine Schwellenfunktion approximiert (siehe Abbildung 1.10), deren funktionale Form auf der Berechnung des Prozesses $\gamma^* \rightarrow q\bar{q}$ mit und



Abbildung 1.10: Schematische Darstellung der Schwellenfunktion des LEPTO-Generators (⋯⋯) und des Projet Programms (——) für die Berücksichtigung der Masse des Bottom-Quarks.

ohne Berücksichtigung der Quarkmassen basiert. In Tabelle 1.1 ist der Anteil der BGF-Wirkungsquerschnitte $\sigma_{2+1}^{c\bar{c}}$ und $\sigma_{2+1}^{b\bar{b}}$ des LEPTO-Generators relativ zu den aus der QED erwarteten Wirkungsquerschnitten für die Erzeugung von Charm und Bottom in den fünf x_g-Bins dieser Analyse (siehe Tabelle 4.3) gezeigt. Mit zunehmendem x_g steigt das mittlere $\hat{s}$ in den x_g-Bins, und der Einfluß der Masse schwerer Quarks auf σ_{2+1}^{BGF} nimmt ab. Man erkennt, daß in den beiden untersten x_g-Bins der vorliegenden Analyse die $b\bar{b}$-Produktion weniger als 3% zum BGF-Wirkungsquerschnitt beiträgt.

Bin	1	2	3	4	5
$\sigma_{c\bar{c}}^{LEPTO}/\sigma_{c\bar{c}}^{QED}$ [%]	70.0	84.4	98.2	100	100
$\sigma_{b\bar{b}}^{LEPTO}/\sigma_{b\bar{b}}^{QED}$ [%]	17.4	26.3	36.7	53.7	73.4

Tabelle 1.1: Anteile der Wirkungsquerschnitte $\sigma_{c\bar{c}}$ und $\sigma_{b\bar{b}}$ des LEPTO-Generators relativ zu den aus der QED erwarteten Wirkungsquerschnitten in den fünf x_g-Bins dieser Analyse unter Verwendung des LEPTO-Generators.

Fragmentation

Erreicht die Virtualität eines abgestrahlten Partons in dem Partonschauer den Wert $1\,\mathrm{GeV}^2$, wird in LEPTO die Partonschauerentwicklung abgebrochen und die Fragmentation der generierten Partonen in Hadronen durch das *String-Fragmentationsmodell* [43, 44] durchgeführt. In diesem Modell wird das Feld zwischen Farbladungsträgern, den Partonen, als Farbflußröhre (String) ohne transversalen Freiheitsgrad aufgefaßt, deren Energie proportional zur Länge des Strings ist. Der Zerfall eines $q\bar{q}$-Paares im String-Modell kann folgendermaßen dargestellt werden: Während Quark und Antiquark in entgegengesetzte Richtung auseinanderlaufen, nimmt die Energie der Farbflußröhre mit größer werdendem Abstand bis zu einem kritischen Wert zu, an dem genügend Energie zur Verfügung steht, ein weiteres $q\bar{q}$-Paar zu bilden, und der String wird in zwei Farbsingulett-Systeme aufgespalten. Gluonen werden in diesem Modell als Anregung für den Zerfall in weitere $q\bar{q}$-Paare aufgefaßt und als ein, die Energie und den Impuls des Gluons symbolisierender Knick in einem String dargestellt. Ist die Energie des Gluons hinreichend groß, bricht der String an der Knickstelle auf, und die entstehenden Stringbruchstücke, die sich relativ zum ursprünglichen $q\bar{q}g$-System bewegen, fragmentieren unabhängig in ihren eigenen Schwerpunktsystemen. Dies führt zu einer asymmetrischen Teichendichte zwischen $q\bar{q}$- und qg-Jets *(String-Effekt)*. An jeder Verzweigung des Fragmentationsprozesses ist die

Energie- und Impulserhaltung erfüllt, so daß die Fragmentation im String-Modell Lorentzinvariant ist.

1.4.3 Andere Monte Carlo Modelle

Die Monte Carlo Modelle ARIADNE 4.03 und HERWIG 5.7 werden in Abschnitt 3.4.3 für Vergleiche mit gemessenen Verteilungen und Studien auf der Hadronebene verwendet.

Der Ereignis-Generator ARIADNE basiert auf dem Farbdipolmodell [41, 42]. In diesem Modell wird eine Gluonemission als Abstrahlung von einem Farbdipol zwischen zwei Farbladungsträgern (Partonen, Proton-Remnant) beschrieben. Dieser Ansatz unterscheidet sich von dem in LEPTO implementierten Partonschauermodell individueller Partonemissionen. Im Farbdipolmodell läßt sich der BGF-Prozeß nur unzureichend formulieren, so daß in der verwendeten ARIADNE-Version der Generator LEPTO benutzt wird, um diesen Prozeß zu generieren. In ARIADNE gibt es keine Möglichkeit, in quark-initiierten Ereignissen den zugrundeliegenden QCD-Prozeß (QPM oder QCD-Compton) zu identifizieren. Für die Hadronisierung wird wie bei LEPTO das String-Fragmentationsmodell verwendet.

Im Gegensatz zu LEPTO und ARIADNE werden in HERWIG die in den BGF- und QCD-Compton-Prozessen bei kollinearer oder niederenergetischer Partonabstrahlung auftretenden Divergenzen durch einen Schnitt auf die Transversalimpulse der auslaufenden Partonen vermieden. Für die Hadronisierung wird in HERWIG das Cluster-Fragmentationsmodell [45] verwendet. In der verwendeten Version konnten entweder QPM-Ereignisse oder $\mathcal{O}(\alpha_s)$ Matrixelement-Ereignisse jeweils in Verbindung mit Partonschauern generiert werden.

Kapitel 2

Die Hadron Elektron Ring Anlage *HERA*

2.1 *HERA* und das H1-Experiment

Die Hadron Elektron Ring Anlage *HERA* ist der weltweit erste Speicherring, in dem Elektronen und Protonen zur Kollision gebracht werden. Nach einer Bauzeit von ca. 6 Jahren wurde *HERA* im Jahr 1990 fertiggestellt. Im Herbst 1991 konnten die ersten *ep*-Kollisionen beobachtet werden, und im Frühling 1992 begannen die *HERA*-Experimente H1 und ZEUS mit ihrem Experimentierprogramm. Einige *HERA*-Parameter werden in der Tabelle 2.1 für die Datennahmeperiode der vorliegenden Analyse mit den Designparametern verglichen.

In dem Speicherring *HERA* werden in zwei getrennten Strahlführungssystemen auf einem Umfang von ca. 6.3 km Elektronen auf eine Endenergie von 30 GeV (26.7 GeV) und Protonen auf eine Endenergie von 820 GeV beschleunigt. Der Teilchenstrom besteht aus Teilchenpaketen, die alle 96ns an vier Orten zur Kollision gebracht werden können. An

	Design		1993		Einheit
	p-Ring	e-Ring	p-Ring	e-Ring	
Strahlenergie	820	30	820	26.7	GeV
Injektionsenegie	40	14	40	12	GeV
Typische Füllzeit	20	15	60	30	min
Teilchenpakete	210	210	90	90	
Teilchenstrom	160	60	20	25	mA
Maximale Luminosität	$1.5 \cdot 10^{31}$		$1.3 \cdot 10^{30}$		$\mathrm{cm}^{-2}\mathrm{s}^{-1}$
Integrierte Luminosität	10^5		600		nb^{-1}
Schwerpunktsenergie	314		296		GeV

Tabelle 2.1: Einige Parameter von *HERA*.

zwei dieser Wechselwirkungspunkte wurden Detektoren gebaut, die zu den Experimenten H1 in der Nordhalle und ZEUS in der Südhalle gehören. Abbildung 2.1 skizziert den Speicherring *HERA* mit seinen Vorbeschleunigern.

Die Verfahren zur Beschleunigung der Elektronen und Protonen auf ihre Endenergie ist kompliziert und benötigt mehrere Vorbeschleuniger. Elektronen werden von dem Linearbeschleuniger LINAC II mit einer Energie von 450 MeV in DESY II eingespeist und dort auf 7 GeV beschleunigt. Mit dieser Energie werden sie in den Ring PETRA II injiziert, dort auf 12 GeV weiterbeschleunigt und dann in den Speicherring *HERA* eingespeist, wo sie auf die Endenergie von 30 GeV (26.7 GeV) beschleunigt werden.

Die Erzeugung und Beschleunigung von Protonen wird folgendermaßen durchgeführt. Negativ geladene Wasserstoffionen werden in dem Linearbeschleuniger LINAC III auf 50 MeV beschleunigt und in DESY III injiziert, wobei die Elektronhülle abgestreift wird. Die Protonen werden auf eine Energie von 7 GeV weiterbeschleunigt und in PETRA II eingespeist. Nach einer Beschleunigung der Protonen auf 40 GeV werden sie in *HERA* eingespeist und auf die Endenergie von 820 GeV gebracht. Die Beschleunigung der Elektronen und Protonen in den Speicherringen erfolgt mittels Hochfrequenz-Beschleunigungsstrecken, so daß die Teilchen nicht als ein kontinuierlicher Strom, sondern in der Form von Teichenpaketen *(bunches)* umlaufen. Um die Protonen auf einer nahzu kreisförmigen Umlaufbahn zu halten, werden supraleitende Dipolmagnete mit einer Feldstärke von 4.7 T benutzt, die mit flüssigem Helium auf eine Temperatur von 4.5° *K* gekühlt werden. Die fokussierenden Quadrupolmagnete sind ebenfalls supraleitend.



Abbildung 2.1: Der Speicherring *HERA* und die Vorbeschleuniger am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg.

2.2 Der H1-Detektor

2.2.1 Übersicht

Abbildung 2.2 zeigt eine schematische Darstellung des H1-Detektors. Die sich stark unterscheidenden Strahlenergien der Elektronen und Protonen in *HERA* bewirken, daß *ep*-Wechselwirkungsprodukte bevorzugt in Richtung des Protonstahls erzeugt werden. Dieser Aspekt wird durch eine feinere Auflösung und Granularität und einer Häufung der Komponenten des H1-Detektors im Vorwärtsbereich berücksichtigt.

Im Inneren des Detektors befinden sich die zentralen $\boxed{2}$ und vorderen $\boxed{3}$ Spurenkammern, die das Strahlrohr $\boxed{1}$ umschließen. Die Spurenkammern werden von dem Kryostaten $\boxed{15}$ des Flüssig-Argon-Kalorimeters umgeben. Dieses Kalorimeter ist in einen elektromagnetischen $\boxed{4}$ und hadronischen Teil $\boxed{5}$ unerteilt. Die Spurenkammern und das Flüssig-Argon-Kalorimeter werden von einer supraleitenden Spule ummantelt, die ein parallel zu Strahlachse ausgerichtetets Magnetfeld mit einer Stärke von $\sim 1.15\,\mathrm{T}$ (im Bereich der Spurenkammern) erzeugt. Das mit Streamerrohrkammern instrumentierte Eisenjoch $\boxed{10}$ dient der Rückführung des von der Spule erzeugten magnetischen Flusses und kann in Verbindung mit den Myonkammern $\boxed{9}$ zur Identifikation und Spurmessung von Myonen verwendet werden. Außerdem dient das Eisenjoch zur Energiemessung von hadronischen Schauerausläufern hinter dem Flüssig-Argon-Kalorimeter. Der Detektor wird im Rückwärtsbereich durch durch ein elektromagnetisches Blei-Szintillator-Kalorimeter (BEMC) $\boxed{12}$ und im Vorwärtsbereich durch ein Silizium-Kupfer-Kalorimeter $\boxed{13}$ abgeschlossen. Hinter dem BEMC befindet sich ein aus zwei Szintillatorebenen bestehendes Flugzeitzählersystem (ToF). Eine ausführliche Beschreibung der Komponenten des H1-Detektors ist in [48] zu finden.

2.2.2 Das Flüssig-Argon-Kalorimeter

Abbildung 2.3 zeigt einen Schnitt entlang der Strahlachse durch die acht Räder des Flüssig-Argon-Kalorimeters. Während IF und der äußere Ring von OF eine Halbschalenform besitzen, bestehen die anderen Räder aus jeweils acht Oktanden. Das Flüssig-Argon-Kalorimeter ist ein nicht kompensierendes Sampling-Kalorimeter mit abwechselnden Schichten aus flüssigem Argon und Absorbermaterial und deckt den Polarwinkelbereich $4^\circ < \theta < 153^\circ$ ab. Bis auf den elektromagnetischen Kalorimeterring BBE und den hadronischen Kalorimeterring OF sind alle anderen Räder in einen hadronischen und einen elektromagnetischen Teil untergliedert (die elektromagnetischen Module erkennt man an der feineren Segmentierung in Abbildung 2.3). Diese Module bestehen wiederum aus Auslesezellen, deren Oberfläche in Segmente *(Pads)* aufgeteilt wurde. An diese Pads wird eine Hochspannung von 1500 V angelegt, die ein elektrisches Feld von ca. 625 V/mm in dem mit flüssigem Argon gefüllten Spalt erzeugt. Die Auslesezellen der elektromagnetischen Module bestehen aus 2.4 mm dicken Bleiplatten als Absorbermaterial und 2.35 mm sensitiven Schichten flüssigem Argon. Die Größe der Pads variiert von $3 \times 3\,\mathrm{cm}^2$ im vorderen