# Messung der Kopplungskonstanten der starken Wechselwirkung $\alpha_s$ aus differentiellen Jetraten in tiefunelastischer Elektron–Protonstreuung

Dissertation

Zur Erlangung des Doktorgrades
des Fachbereichs Physik
der Universität Hamburg

vorgelegt von

**Konrad Flamm**

aus Hamburg

Hamburg 1996

| | |
|---|---|
| Gutachterin / Gutachter der Dissertation: | Prof. Dr. Beate Naroska<br>Dr. Eckhard Elsen |
| Gutachterin / Gutachter der Disputation: | Prof. Dr. Beate Naroska<br>Prof. Dr. Albrecht Wagner |
| Leiter der Disputation: | Dr. Günter Poelz |
| Datum der Disputation: | 5. August 1996 |
| Sprecher des Fachbereichs Physik und<br>Vorsitzender des Promotionsausschusses: | Prof. Dr. Bernhard Kramer |

# Kurzfassung

In dieser Arbeit wird eine Messung der Kopplungskonstanten der starken Wechselwirkung $\alpha_s$ über die differentielle $2+1$–Jetrate in tiefunelastischer Elektron–Protonstreuung dargestellt. Die Messung basiert auf einer Selektion von Ereignissen tiefunelastischer Streuung, die 1994 mit dem H1–Detektor bei HERA aufgezeichnet wurden. Die differentielle $2+1$–Jetrate wird mit dem JADE–Jetalgorithmus in Abhängigkeit vom Auflösungsparameter bestimmt. Hadronisations– und Detektoreffekte, die anhand der Simulation auf Basis des Monte–Carlo–Generators LEPTO ermittelt wurden, werden unter Berücksichtigung der Auflösung korrigiert. Der Phasenraum wird durch geeignete Schnitte eingeschränkt, um Unsicherheiten bei der Jetrekonstruktion zu minimieren. Dabei wird insbesondere der Einfluß von Vielfachabstrahlungen, die anhand des Partonschauermodells in LEPTO untersucht werden, berücksichtigt. Die korrigierte differentielle Jetrate wird mit der NLO–Rechnung von PROJET zur $\alpha_s$–Bestimmung verglichen.



# Abstract

In this thesis is described a measurement of the strong coupling constant $\alpha_s$ from the differential $2+1$ jet rate in deep inelastic electron proton scattering. The measurement is based on a sample of deep inelastic scattering events recorded in 1994 with the H1 detector at HERA. Using the JADE jet algorithm the differential $2+1$ jet rate as a function of the jet resolution parameter is measured. The measurement is corrected for hadronisation and detector effects, which are estimated using a simulation based on the Monte Carlo generator LEPTO. The phase space is restricted by applying suitable cuts to minimise uncertainties in the jet reconstruction. In particular the influence of multiple parton radiation in higher orders is taken into account, which is studied using the parton shower model in LEPTO. The corrected jet rate is compared to the next to leading order prediction of PROJET to extract $\alpha_s$.

# Inhaltsverzeichnis

# Einleitung

Die elementaren Bausteine der Natur sind im Standardmodell für den Aufbau der Materie [1, 2] sechs *Quarks* und sechs *Leptonen*. Man unterscheidet drei verschiedene Kräfte, die zwischen diesen elementaren Bausteinen wirken, wobei die Gravitation bisher nicht berücksichtigt ist: Zwischen allen Quarks und Leptonen wirkt die *schwache Wechselwirkung*. Zwischen elektrisch geladenen Teilchen wirkt die *elektromagnetische Wechselwirkung*, wobei die Quarks und einige Leptonen Ladungen tragen. Nur zwischen den Quarks wirkt die *starke Wechselwirkung*. Es ist gelungen, die quantenfeldtheoretische Beschreibung der elektromagnetischen und der schwachen Wechselwirkung zu einer geschlossenen Theorie zu verbinden [3, 4, 5, 6]. Die Wechselwirkung wird dabei durch den Austausch von Photonen, $W^{\pm}$ und $Z^0$ vermittelt. Die Vorhersagen dieser *elektroschwachen* Theorie konnten mit sehr hoher Präzision in vielen Experimenten bestätigt werden.

Kurz nach der erfolgreichen Einführung des Quarkmodells für den Aufbau der Hadronen in den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts wurde die quantenfeldtheoretische Beschreibung der starken Wechselwirkung formuliert: die *Quantenchromodynamik (QCD)* [7, 8, 9, 10]. Dabei sind die *Gluonen* die Feldquanten der starken Wechselwirkung, die zwischen *Farbladungen* wirkt, wobei sowohl die Quarks als auch die Gluonen Farbladungen tragen.

Das Problem bei Experimenten zur Überprüfung von QCD–Vorhersagen ist, daß man sowohl Quarks als auch Gluonen nicht als freie Teilchen beobachten kann. Die Kopplung zwischen Quarks und Gluonen ist so stark, daß immer nur farbneutrale Hadronen, die aus zwei oder drei Quarks zusammengesetzt sind, als freie Teilchen auftreten. Bei Reaktionen zwischen Teilchen mit sehr hohen Energien verhalten sich Quarks und Gluonen zunächst wie freie Teilchen und bilden dann einen *Jet* von Hadronen in ihre ursprüngliche Flugrichtung. Erst die *asymptotische Freiheit* der Quarks und Gluonen bei hohen Energien erlaubt die direkte experimentelle Prüfung der QCD–Vorhersagen, die dabei mit störungstheoretischen Methoden berechnet werden können.

In den siebziger Jahren wurden am Beschleuniger SPEAR bei der Vernichtung von Elektronen und Positronen erstmals Ereignisse mit zwei Jets beobachtet, die man bei der Erzeugung eines hochenergetischen Quark–Antiquarkpaares erwartet[11]. Der erste Nachweis der Jets von Gluonen, die vom Quark–Antiquarkpaar abgestrahlt werden, gelang Ende der siebziger Jahre den Experimenten am Speicherring PETRA durch die Beobachtung von Ereignissen mit drei Jets [12, 13]. An allen Beschleunigern, die genügend Energie erreichen, werden Jets untersucht und mit QCD–Vorhersagen verglichen. Andererseits lassen sich für viele andere Prozesse, bei denen keine Jets gebildet werden, Korrekturen zu den Wirkungsquerschnitten mit der QCD berechnen. So konnten die Vorhersagen der QCD an einer Vielzahl von Experimenten bestätigt werden. Der Vergleich von Messung und QCD–Vorhersage kann in vielen Fällen zur Bestimmung der Kopplungskonstanten der starken Wechselwirkung $\alpha_s$ verwandt werden, die ein offener Parameter der Theorie ist.

Mit der Schwerpunktsenergie von 300 GeV, die der Beschleuniger HERA zur Verfügung stellt, werden bei der Streuung von Elektronen und Protonen die *Partonen* des Protons, die mit Quarks und Gluonen identifiziert werden, aufgelöst. Im Rahmen des Standardmodells können bei dieser Streuung hochenergetische Quarks und Gluonen auftreten, die nach Abstrahlung weiterer Quarks und Gluonen schließlich zur Bildung mehrerer Jets von Hadronen führen. Mit dem H1–Detektor bei HERA läßt sich der hadronische Endzustand der Elektron–Protonstreuung und damit die Erzeugung von Jets beobachten.

Die vorliegende Arbeit beschreibt eine Analyse der Jets bei Ereignissen aus tiefunelastischer Elektron–Protonstreuung, die mit dem H1–Detektor im Jahre 1994 aufgezeichnet wurden, mit dem Ziel, die Kopplungskonstante $\alpha_s$ zu bestimmen. Es werden Ereignisse untersucht, bei denen neben dem Rest des Protons zwei weitere Jets mit dem *JADE–Jetalgorithmus* [68] rekonstruiert werden. Dabei muß die Auflösung für Jets, das heißt ein Kriterium zur Trennung von Jets, festgelegt werden. Die relative Häufigkeit dieser Ereignisse, die *Jetrate*, hängt von der Wahl der Auflösung ab.

Die Analyse basiert auf der Messung der differentiellen Jetrate in Abhängigkeit von der Auflösung. Anhand der Simulation von Modellen der Streuung und des Detektors werden die Korrelation der rekonstruierten Jets mit den Partonen der Streuung und die dabei auftretenden Unsicherheiten untersucht. Insbesondere die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Abstrahlung vieler Quarks und Gluonen von den Partonen der Streuung wird anhand des *Partonschauer*–Modells dargestellt. Unter Berücksichtigung der Korrelation zwischen Jets und Partonen und den damit verbundenen Unsicherheiten wird die gemessene differentielle Jetrate geeignet korrigiert und mit einer QCD–Rechnung auf der Basis von Quarks und Gluonen verglichen und schließlich $\alpha_s$ bestimmt.

Zu Beginn dieser Arbeit werden die theoretischen Voraussetzungen und der experimentelle Aufbau dieser Analyse beschrieben. Das Entfaltungsverfahren, das zur Korrektur der Meßdaten verwandt wurde, wird erläutert. Die Darstellung der Analyse beginnt mit der Beschreibung der Datenselektion und der Untersuchung der Jetstruktur der selektierten Ereignisse. Es wird eine Studie des Einflusses von Partonschauern vorgestellt. Schließlich wird die Messung von $\alpha_s$ erläutert und das Ergebnis der Messung dargestellt.

# Kapitel 1

# Theoretische Voraussetzungen

In dieser Arbeit wird die Streuung von Elektronen[1] an Protonen untersucht. Betrachtet werden nur Streuereignisse, bei denen das gestreute Elektron im Detektor nachgewiesen werden kann. Bei unelastischer Streuung wird das Proton zerstört und eine Vielzahl von Hadronen gebildet. Ist der Impulsübertrag sehr groß, spricht man von tiefunelastischer Streuung. Der Streuprozeß ist in Abbildung 1.1 schematisch dargestellt. Dabei ist das Elektron mit e, das Proton mit p und der hadronische Endzustand mit X bezeichnet.




Abbildung 1.1: Schematische Darstellung der ep–Streuung

In diesem Kapitel werden die kinematischen Größen der Streuung definiert. Der Aufbau des Protons und die theoretische Beschreibung der physikalischen Vorgänge bei der Streuung werden vorgestellt. Dabei wird eine kurze Einführung in die Methoden der störungstheoretischen QCD in Zusammenhang mit der Definition der Kopplungskonstanten $\alpha_s$ gegeben. Die Beschreibung der tiefunelastischen Streuung im Rahmen der QCD und die daraus folgende Möglichkeit von $\alpha_s$–Messungen wird erläutert. Schließlich werden Monte–Carlo–Generatoren vorgestellt, mit denen die Streuung simuliert wird.

[1] Tatsächlich wurden bei dieser Analyse Positronen anstelle von Elektronen verwandt. Vernachlässigt man Effekte der schwachen Wechselwirkung und betrachtet nur den Austausch eines Photons, ist die theoretische Beschreibung der Streuung für Elektronen und Positronen identisch.

## 1.1 Kinematik tiefunelastischer ep–Streuung

Bei der Streuung eines Elektrons mit dem Viererimpuls $k$ an einem Proton mit dem Viererimpuls $p$ wird der Viererimpuls $q = k - k'$ übertragen, wobei $k'$ der Viererimpuls des gestreuten Elektrons ist. Bei elastischer Streuung besteht der Endzustand wieder aus einem Elektron und einem Proton. Das bedeutet, daß das Quadrat der invarianten Masse

$$W^2 = (p + q)^2 \tag{1.1}$$

gleich dem Quadrat der Ruhemasse des Protons $m_p^2 = p^2$ ist. Bei unelastischer Streuung gilt jedoch $(p + q)^2 > p^2$. Diese Ungleichung läßt sich zu

$$\frac{Q^2}{2pq} < 1 \tag{1.2}$$

umformen, wobei

$$Q^2 = -q^2 \tag{1.3}$$

ist. Bei elastischer Streuung wird die Ungleichung 1.2 zu einer Gleichung. Man kann die unelastische Streuung am Proton als elastische Streuung des Elektrons an einem *Parton* des Protons mit dem Impuls $x_{Bj}p$ auffassen, wenn man

$$x_{Bj} = \frac{Q^2}{2pq} \tag{1.4}$$

definiert. Die Größe $x_{Bj}$ gibt also den Bruchteil des Impulses des Protons an, an dem das Elektron elastisch gestreut wird. In bezug auf das gestreute Elektron ist die Kinematik eines Streuereignisses durch die Angabe der lorentzinvarianten Größen $x_{Bj}$ und $Q^2$ vollständig beschrieben. In dieser Analyse wird auch die Größe

$$y = \frac{pq}{pk} = \frac{Q^2}{x_{Bj}\, s} \tag{1.5}$$

verwandt, wobei $s = (p + k)^2$ das Quadrat der Schwerpunktsenergie der Streuung ist. Die Ruhemassen des Protons und des Elektrons sind in Gleichung 1.5 vernachlässigt. Im Ruhesystem des Protons ist $y$ der relative Energieübertrag des Elektrons auf das Proton.

## 1.2 Aufbau des Protons

Im Rahmen des *Standardmodells* der Elementarteilchenphysik [1, 2] sind Hadronen, zu denen auch das Proton gehört, aus *Quarks* aufgebaut. Quarks sind elektrisch geladene Fermionen und können vom *Flavor* $u$, $d$, $c$, $s$, $b$ oder $t$ sein. Sie tragen *Farbladungen* und unterliegen damit der starken Wechselwirkung. Die Eichtheorie der starken Wechselwirkung QCD [10] beschreibt die Kopplung der Quarks an *Gluonen*. Die Gluonen sind die Eichbosonen der starken Wechselwirkung. Aufgrund ihrer *nichtabelschen* Struktur erlaubt die QCD Wechselwirkungen des Gluonenfeldes mit sich selbst. Das bedeutet, daß die Gluonen ebenfalls Farbladungen tragen. Damit verbunden ist die Eigenschaft, daß die Kraft, die zwischen zwei Farbladungen herrscht, mit wachsendem Abstand ansteigt. Bei genügend großem Abstand der Farbladungen enthält das Kraftfeld genügend Energie zur Erzeugung von Quark–Antiquarkpaaren. Diese Eigenschaft führt dazu, daß Quarks nicht als freie Teilchen, sondern nur in farbneutralen Hadronen gebunden auftreten.

Auch die Gluonen des starken Kraftfeldes innerhalb der Hadronen können über sehr kurze Zeiten in Quark–Antiquarkpaare fluktuieren. Man unterscheidet daher beim Aufbau der Hadronen zwischen den reellen *Valenzquarks* und den *Seequarks*, die aus den Fluktuationen hervorgehen. Obwohl man einzelne Quarks nicht aus einem Hadron herauslösen kann, verhalten sich die Quarks innerhalb der Hadronen bei sehr kleinen Abständen bzw. bei sehr großen Impulsüberträgen wie freie Teilchen. Diese Eigenschaft der starken Wechselwirkung wird *asymptotische Freiheit* genannt.

Das Proton besteht aus drei Valenzquarks $u$, $u$ und $d$. In dieser Analyse wird davon ausgegangen, daß das Elektron den Impuls $q$ bei der Streuung am Proton nur mit einem Quark bzw. Antiquark austauscht, das sich wie ein freies Teilchen verhält, sofern der Impulsübertrag groß ist. Dieses Quark kann eines der drei Valenzquarks oder ein Seequark sein. Der Streuprozeß wird also als elastische Elektron–Quarkstreuung aufgefaßt. Alle übrigen Bestandteile des Protons sind unbeteiligte Beobachter der Streuung und bewegen sich zunächst in ihre ursprüngliche Bewegungsrichtung weiter. Diese Interpretation des Streuprozesses wird *Quark–Parton–Modell* genannt und ist in Abbildung 1.2 graphisch dargestellt. Das gestreute Quark ist dabei mit q bezeichnet. Der Winkel des gestreuten Quarks $\Theta_{Quark}$ gegen die ursprüngliche Flugrichtung des Protons läßt sich anhand des Viererimpulses des gestreuten Elektrons berechnen[2].




Abbildung 1.2: Quark–Parton–Modell der ep–Streuung

Der Impuls $q$ wird durch die ungeladenen Eichbosonen der elektroschwachen Wechselwirkung $\gamma$ und $Z^0$ auf das Quark übertragen. Aufgrund der großen Masse des $Z^0$–Bosons ist jedoch der $Z^0$–Austausch unterdrückt. Er wird daher in dieser Analyse vernachlässigt.

[2]Siehe dazu Anhang A

Die Wirkungsquerschnitte für die elastische Streuung von punktförmigen, geladenen Fermionen über elektromagnetische Wechselwirkung lassen sich im Rahmen der *Quantenelektrodynamik QED* [14] präzise berechnen. Neben dem Impulsübertrag zwischen den geladenen Fermionen beschreibt die QED bei dieser Streuung auch die Abstrahlung reeller Photonen. Strahlt das Elektron bei der Streuung ein reelles Photon ab, lassen sich die kinematischen Größen der Streuung nicht mehr allein über das gestreute Elektron berechnen. In dieser Analyse wird durch geeignete Schnitte der Einfluß dieser Abstrahlungen unterdrückt. Er wird daher im Folgenden vernachlässigt.

Unter der Voraussetzung, daß das Elektron mit einem punktförmigen geladenen Fermion ein Photon austauscht, kann man den Wirkungsquerschnitt für tiefunelastische Elektron–Protonstreuung durch

$$\frac{d^2\sigma_{ep}}{dx_{Bj}\,dQ^2} = \frac{4\pi\alpha_{em}^2}{x_{Bj}Q^4}[y^2 x_{Bj} F_1(x_{Bj},Q^2) + (1-y)F_2(x_{Bj},Q^2)] \tag{1.6}$$

beschreiben, wobei $\alpha_{em}$ die Kopplungskonstante der elektromagnetischen Wechselwirkung ist. Die Impulsverteilung der Quarks im Proton ist in den phänomenologischen Strukturfunktionen $F_1$ und $F_2$ enthalten. Bei einer statischen Verteilung der Quarks im Proton wären diese Strukturfunktionen unabhängig von $Q^2$. Da die Valenzquarks jedoch durch die starke Wechselwirkung im Proton gebunden sind und virtuelle Fluktuationen des starken Kraftfeldes in Quarks und Antiquarks auftreten, ist die Quarkverteilung ein dynamischer Prozeß. Im Rahmen der QCD erwartet man also in Übereinstimmung mit den Messungen, daß die Strukturfunktionen von $Q^2$ abhängen.

## 1.3 Störungstheoretische QCD

Bei genügend hohen Impulsüberträgen erlaubt die QCD, Wirkungsquerschnitte für die Kopplung von Gluonen und Quarks störungstheoretisch zu berechnen [10]. Für die Abstrahlung eines Gluons von einem Quark ist in Abbildung 1.3 ein Feynmandiagramm zur 1. Ordnung in der Kopplungskonstanten der starken Wechselwirkung $\alpha_s$ dargestellt. Da-




Abbildung 1.3: QCD–Prozeß zur 1. Ordnung $\alpha_s$

bei ist die Quarklinie mit q und die Gluonlinie mit g bezeichnet. In höheren Ordnungen kommen Diagramme mit weiteren reellen Gluonabstrahlungen und mit virtuellen Quarks und Gluonen hinzu. Beispiele dazu sind in Abbildung 1.4 gezeigt. Ein reelles Quark kann



Abbildung 1.4: Feynmandiagramme mit virtuellen Korrekturen

für kurze Zeit in ein virtuelles Quark und ein virtuelles Gluon fluktuieren und ein reelles Gluon in ein virtuelles Quark–Antiquarkpaar oder ein Gluonpaar.

Die Feynmandiagramme stellen symbolisch die Beiträge zur quantenmechanischen Amplitude für einen Prozeß dar. Jeder Quark–Gluon– oder Drei–Gluonvertex trägt mit einem Faktor $\sqrt{\alpha_s}$ bei. Für die Berechnung des Wirkungsquerschnittes wird das Betragsquadrat der Summe der Amplituden gebildet und das Resultat mit einem Phasenraumfaktor multipliziert. Das Ergebnis ist die *Störungsreihe* in Potenzen von $\alpha_s$. Zu jeder Ordnung können also nicht nur die Quadrate der Amplituden einzelner Feynmandiagramme beitragen, sondern auch die *Interferenzterme*, die jeweils aus dem Produkt zweier verschiedener Feynmandiagramme zum selben Endzustand entstehen. So bilden die Interferenzterme aus dem Produkt des Feynmandiagramms in Abbildung 1.3 mit jeweils einem aus Abbildung 1.4 die Beiträge zur Ordnung $\alpha_s^2$.

Zur Berechnung des Wirkungsquerschnittes wird über den ganzen Phasenraum der virtuellen Quarks und Gluonen integriert. Diese Integrale sind jedoch divergent. Um trotzdem Vorhersagen machen zu können, wird nach einem festzulegenden Schema der divergente Teil der Integration weggelassen. Dieses Verfahren wird *Regularisierung* der Divergenzen genannt. Der berechnete Wirkungsquerschnitt wird abhängig von der Regularisierung und von einer willkürlichen Energieskala $\mu_R$, die man zur Regularisierung einführen muß. Diese unphysikalische Eigenschaft des Ergebnisses wird durch *Renormierung* der Kopplungskonstanten $\alpha_s$ und der Massen kompensiert. Dazu werden alle Beiträge von Feynmandiagrammen mit virtuellen Quarks und Gluonen durch die Definition einer effektiven Kopplungskonstanten absorbiert. Das Schema zur Regularisierung der Divergenzen wird mit *Renormierungsschema* und die Energieskala $\mu_R$ mit *Renormierungsskala* bezeichnet. Bei den Rechnungen, die in dieser Analyse verwandt werden, wird das $\overline{\mathrm{MS}}$–Schema [15] angewandt, bei dem die Dimensionen des Phasenraumes um einen kleinen Wert $\epsilon$ verringert werden.

Die renormierte Kopplungskonstante ist über das Renormierungsschema definiert und von der Renormierungsskala abhängig. Die Forderung, daß die Wirkungsquerschnitte nicht von dieser willkürlichen Skala $\mu_R$ abhängen, führt zu einer Differentialgleichung für $\alpha_s$, der *Renormierungsgruppengleichung*. Diese beschreibt die Abhängigkeit der renormierten Kopplungskonstanten $\alpha_s$ von der Skala $\mu_R$. Die Lösung hängt von der Ordnung in $\alpha_s$ ab, bis zu der die Störungsreihe berechnet wurde. Rechnet man zur Ordnung $\alpha_s^2$, erhält man:

$$\frac{\alpha_s(\mu_R)}{4\pi} = \frac{1}{\beta_0 \ln(\mu_R^2/\Lambda^2)} - \frac{\beta_1 \ln(\ln(\mu_R^2/\Lambda^2))}{\beta_0^3 \ln^2(\mu_R^2/\Lambda^2)} \tag{1.7}$$

wobei $\beta_0 = 11 - 2n_f/3$, $\beta_1 = 102 - 38n_f/3$ und $n_f$ die Anzahl der beteiligten *Flavors* ist. Der Parameter $\Lambda$ ist abhängig vom Renormierungsschema. Er läßt sich nicht aus der QCD selbst bestimmen und stellt die Stärke der Kopplung dar, die es per Experiment zu bestimmen gilt. Wenn alle Korrekturen höherer Ordnung vernachlässigt werden können, ist $\Lambda$ universell für alle Wirkungsquerschnitte, die man zur gleichen Ordnung und mit demselben Renormierungsschema berechnet. Damit $\alpha_s(\mu)$ eine stetige Funktion ist, definiert man $\Lambda$ in Abhängigkeit von $n_f$. Im Folgenden wird $\Lambda$ immer für vier Flavor angegeben und mit $\Lambda^4$ bezeichnet.

## 1.4 QCD und tiefunelastische Streuung

Im Rahmen der störungstheoretischen QCD kann ein Quark aus dem Proton bei der Streuung mit dem Elektron reelle oder virtuelle Gluonen abstrahlen. Prozesse, bei denen reelle Gluonen abgestrahlt werden, bezeichnet man als *QCD–Comptonstreuung*. Außerdem können Gluonen im Proton an ein Quark–Antiquarkpaar koppeln. Das Elektron streut dann elastisch an einem dieser Quarks. Dieser Prozeß wird mit *Boson–Gluon–Fusion* bezeichnet.




Abbildung 1.5: Feynmandiagramme, die mit $\sqrt{\alpha_{em}\alpha_s}$ zur QCD–Comptonstreuung (**a** und **b**) und zur Boson–Gluon–Fusion (**c** und **d**) beitragen

In Abbildung 1.5 sind die Feynmandiagramme zur 1. Ordnung in $\alpha_s$ für QCD–Comptonstreuung und Boson–Gluon–Fusion gezeigt. Der unbeteiligte Protonrest ist in den Diagrammen nicht dargestellt. Das virtuelle Photon, das mit dem Elektron ausgetauscht wird, ist mit $\gamma^\star$, die Gluonen mit g und die Quarks mit q bezeichnet. Zur Ordnung $\alpha_s^2$ [16, 17] kommen Prozesse, bei denen ein weiteres reelles Gluon abgestrahlt wird, hinzu. Außerdem sind in höheren Ordnungen Feynmandiagramme mit virtuellen Quarks und Gluonen beteiligt. Beispiele dazu sind in Abbildung 1.6 dargestellt.



Abbildung 1.6: Feynmandiagramme, die zu den Termen proportional zu $\alpha_{em}\alpha_s^2$ und $\alpha_{em}\alpha_s^3$ der Störungsreihe beitragen

Die Vorhersagen der störungstheoretischen QCD ergänzen also das oben dargestellte Modell der Elektron–Quarkstreuung. So sind Endzustände möglich, bei denen neben dem unbeteiligten Protonrest mehrere Quarks und Gluonen auftreten. Die Störungsrechnungen gelten jedoch nur bei genügend großen Energien der beteiligten Quarks und Gluonen. Daher lassen sich die dynamischen Abläufe im Proton nicht vollständig störungstheoretisch berechnen. Die störungstheoretischen Rechnungen enthalten Divergenzen für kollinear abgestrahlte Gluonen und für Quarks oder Antiquarks bei Boson–Gluon–Fusion, die sich kollinear zum einlaufenden Gluon bewegen. Außerdem treten Divergenzen bei der Abstrahlung von Gluonen auf, deren Energie gegen Null geht. Diese werden als *Infrarotdivergenzen* bezeichnet.

Um die innere Struktur des Protons über die Grenzen der Störungstheorie hinaus beschreiben zu können, werden zur Berechnung von Wirkungsquerschnitten die *Partondichten* $\phi_i(\xi)$ eingeführt. Sie beschreiben die Wahrscheinlichkeit, ein Gluon, ein Quark oder Antiquark der verschiedenen Flavor mit einem Impulsanteil $\xi$ zu finden. Für die Streuung dieser *Partonen* mit dem Elektron kann man dann den Wirkungsquerschnitt störungstheoretisch berechnen.

Ein einlaufendes Quark mit dem Impulsanteil $\xi$, das vor der Streuung am Elektron kollinear ein Gluon abstrahlt, trägt bei der Streuung am Elektron einen kleineren Impulsanteil, da das Gluon einen Teil des Anfangsimpulses erhält. Ebenso ist bei Boson–Gluon–Fusion der Impulsanteil des Gluons größer als der des Quarks bzw. Antiquarks, an dem das Elektron streut, da ein Teil des longitudinalen Impulses vom Antiquark bzw. Quark getragen wird. Allgemein ist bei Boson–Gluon–Fusion und bei der Gluonabstrahlung vor der Streuung am Elektron $x_{Bj} < \xi$. Ein Quark, das zunächst den Impulsanteil $\xi$ trägt und dann kollinear ein Gluon abstrahlt, bevor es am Elektron streut, könnte man also auch als einlaufendes Parton mit kleinerem Impulsanteil auffassen und das Gluon dem unbeteiligten Protonrest zurechnen. Das heißt, daß man die kollineare Abstrahlung in der Partondichte $\phi$ berücksichtigen kann. Das gleiche gilt bei der Boson–Gluon–Fusion, wenn sich ein auslaufendes Quark oder Antiquark des produzierten Paares parallel zum einlaufenden Gluon bewegt.

Aufgrund dieser Vieldeutigkeit der Definition des Partons, für das die Streuung störungstheoretisch berechnet werden kann, und zur Vermeidung der damit verbundenen Divergenzen, wird ein *Faktorisierungsschema* und eine *Faktorisierungsskala* $\mu_f$ eingeführt [10]. Dabei wird der divergente Teil der Integration wie bei der Renormierung regularisiert und die Partondichten entsprechend umdefiniert. Erst durch Festlegen des Faktorisierungsschemas und der Skala ist die Partondichte $\phi(\xi, \mu_f)$ definiert. In den Rechnungen, die in dieser Analyse verwandt werden, werden das $\overline{\text{MS}}$–Schema und $Q^2$ als Faktorisierungsskala verwandt. Man hat also einen Teil der Divergenzen, die in der Störungsrechnung auftreten, in die Partondichten absorbiert. In diesem Verfahren spiegelt sich wieder, daß man die Protonstruktur nur begrenzt störungstheoretisch berechnen kann. Die Grenze ist jedoch in der Theorie nicht genau festgelegt, sondern muß gewählt werden.

Der Wirkungsquerschnitt für eine Konstellation $X$ von Quarks und Gluonen nach der Streuung läßt sich schließlich durch

$$\sigma_{ep\to eX} = \sum_i \int d\xi\, \phi_i(\xi, \mu_f)\, \sigma_i(\xi, \mu_f) \tag{1.8}$$

berechnen, wobei $\sigma_i(\xi, \mu_f)$ der Wirkungsquerschnitt für die Streuung des Elektrons am Parton ist, der über störungstheoretische QCD berechnet wird. Im Idealfall hängt $\sigma_{ep\to eX}$ nicht vom Faktorisierungsschema und der Faktorisierungsskala ab. Die bleibende Abhängigkeit spiegelt die Ungenauigkeit der Störungsrechnung in Verbindung mit dem Faktorisierungsschema wieder. Die Summe über die Wirkungsquerschnitte aller möglichen Endzustände $X$ bildet den totalen Wirkungsquerschnitt für die Elektron–Protonstreuung. Er ist nach einem Theorem von T. Kinoshita, T.D. Lee und M. Nauenberg für renormierbare Quantenfeldtheorien zu jeder Ordnung in $\alpha_s$ endlich [18, 19]. Die Divergenzen in den einzelnen Beiträgen heben sich gegenseitig auf.

Die störungstheoretische Berechnung des totalen Wirkungsquerschnittes hängt von $Q^2$ ab, so daß auch die Vorhersage für die Strukturfunktionen $Q^2$–abhängig ist. Die Messung des totalen Wirkungsquerschnittes für Elektron–Protonstreuung bzw. der Strukturfunktionen in Abhängigkeit von $x_{Bj}$ und $Q^2$ wurde dazu verwandt, die Partondichten zu bestimmen oder Parametrisierungen der Partondichten anzupassen [20, 21, 22, 23, 24].

Die störungstheoretisch berechneten Teilquerschnitte $\sigma_{n+1}$ für Prozesse, bei denen $n$ Quarks oder Gluonen zusätzlich zum Protonrest aus der Streuung hervorgehen, sind divergent. Um endliche Resultate für $\sigma_{n+1}$ zu erhalten muß man einen Teil des Phasenraumes um den divergenten Bereich bei der Integration weglassen. Dazu führt man einen Schnitt ein, der kollineare oder niederenergetische Abstrahlungen vermeidet. Das bedeutet, daß man ein aus der Streuung auslaufendes Partonenpaar, das durch kollineare oder niederenergetische Abstrahlungen entstanden ist, nicht mehr als zwei getrennte Partonen zählt, sondern zu einem einzigen Parton zusammenfaßt. Dieses zusammengefaßte Parton wird im Folgenden auch *Partonjet* genannt. Der Divergenzschnitt ist also das Auflösungskriterium, mit dem bestimmt wird, welche Quarks und Gluonen getrennt betrachtet werden.

In dieser Analyse werden Endzustände $X$ betrachtet, bei denen neben dem Protonrest zwei Partonjets auftreten. Der Wirkungquerschnitt $\sigma_{2+1}$ für diese Prozesse ist also abhängig von der Wahl des Divergenzschnittes. Die genaue Wahl des Schnittes ist beliebig, sofern der divergente Bereich bei der Integration vermieden wird. Die Abhängigkeit des Wirkungquerschnittes vom Divergenzschnitt ist eine Observable. In der vorliegenden Arbeit wird eine Messung dieser Abhängigkeit beschrieben.

## 1.5 PROJET

Zur Berechnung von Wirkungsquerschnitten bei tiefunelastischer Streuung steht das Programm PROJET [25] zur Verfügung. Mit diesem Programm kann man die Wirkungsquerschnitte für zwei oder drei Partonjets im Endzustand zur Ordnung $\alpha_s^2$ und den Wirkungsquerschnitt für nur einen Jet zusätzlich zum Protonrest zur Ordnung $\alpha_s$ berechnen. Dabei werden die Quarks und Gluonen als masselose Teilchen angesehen. Die Divergenzen werden in PROJET durch den Schnitt

$$\frac{(p_i + p_j)^2}{W^2} > y_{min} \tag{1.9}$$

vermieden, wobei alle Paare $(p_i,\, p_j)$ der Vierervektoren zu den Partonen des Endzustandes einschließlich Protonrest betrachtet werden. Bei der Berechnung des Wirkungsquerschnittes für 2 Partonjets zusätzlich zum Protonrest zur Ordnung $\alpha_s^2$ werden neben den virtuellen Korrekturen auch Zustände mit 3 Quarks oder Gluonen und Protonrest berücksichtigt. Dabei wird das Partonpaar $(i, j)$ mit dem kleinsten $(p_i + p_j)^2$ gesucht. Falls für dieses Partonpaar $(p_i + p_j)^2/W^2 < y_{min}$ ist, werden diese zwei Partonen zu einem Partonjet zusammengefaßt, dessen Masse beim Divergenzschnitt in Gleichung 1.9 vernachlässigt wird. Der Wert für den Divergenzschnitt $y_{min}$ ist als Parameter des Programms anzugeben. In dieser Analyse wird die Vorhersage von PROJET für den differentiellen Wirkungsquerschnitt $d\sigma_{2+1}/dy_{min}$ mit der Messung verglichen.

## 1.6 Bildung von Hadronen

Bei der störungstheoretischen Beschreibung des Streuprozesses werden die Quarks und Gluonen als freie Teilchen aufgefaßt. Das Elektron koppelt über das virtuelle Photon nur an ein Quark des Protons und die übrigen Quarks und Gluonen des Protons bleiben unbeteiligt. Das gestreute Quark, die abgestrahlten Gluonen und die Teilchen des Protonrests tragen jedoch Farbladungen und üben daher Kräfte aufeinander aus. Vergrößern sich die Abstände zwischen den Teilchen, wird die rücktreibende Kraft immer stärker. Aus der Feldenergie bilden sich weitere Quarks und Gluonen, aus denen sich schließlich Hadronen formen.

Da bei diesen Prozessen der Energieübertrag immer kleiner und die Kopplung $\alpha_s$ größer wird, kann hierfür keine Störungsrechnung mehr durchgeführt werden. Zur Beschreibung der Bildung von Hadronen wurden daher phänomenologische Modelle entwickelt, die an die beobachteten Verteilungen von Hadronen angepaßt wurden. Eine Einführung in viel benützte Modelle ist in [26] zu finden. Allen Modellen ist gemeinsam, daß in Richtung der

Quarks und Gluonen, die aus der Störungsrechnung stammen, ein mehr oder weniger kollimiertes Bündel von Hadronen, ein *Jet* [26, 27], gebildet wird. Man nennt diese Verbindung zwischen Parton– und Hadronjets *lokale Parton–Hadron–Dualität* [28, 29]. Es besteht also die prinzipielle Möglichkeit, die gemessene Struktur des hadronischen Endzustandes mit den Vorhersagen der Störungsrechnungen zu vergleichen.

Für diese Analyse wurde das *Lund–String–Modell* [30] verwandt. Dabei wird zwischen den Farbladungen ein *String* gespannt, der das Farbfeld zwischen den Farbladungen darstellt. Da das Farbfeld auf sich selbst eine Anziehungskraft ausübt, zieht es sich zu einem Feldflußschlauch zusammen, der die beiden Ladungen miteinander verbindet. Gluonen, die ja selbst zum Farbfeld gehören, bilden im Lund–String–Modell einen Knick in einem String, der zwischen zwei Quarks gespannt ist. Das bedeutet, daß der String zwischen den Quarks einen Impuls transversal zur Verbindungslinie der Quarks haben kann. Der String des Modells nimmt mit wachsendem Abstand der Ladungen einer Feder ähnlich Energie auf. Wenn genügend Energie zur Erzeugung von Quarkpaaren vorhanden ist, bricht der String in mehrere Strings auf, an deren Enden sich wieder Farbladungen befinden. Das wiederholt sich, bis nicht mehr genug Energie in den einzelnen Strings bleibt, um weitere Quarks zu bilden. Die übriggebliebenen Teilchen an den Enden der Strings werden dann zu Hadronen zusammengefaßt.

## 1.7 Messung der Kopplungskonstanten $\alpha_s$

Zur Bestimmung von $\Lambda$ bzw. $\alpha_s$ eignet sich jede Teilchenreaktion, für die man den Beitrag der QCD zum Wirkungsquerschnitt berechnen kann, sofern dieser Beitrag von Null verschieden ist [31] . Man vergleicht dazu den gemessenen Wirkungsquerschnitt $\sigma_{\text{exp}}$ mit der Störungsrechnung und löst die Gleichung

$$\sigma_{\text{exp}} = a_0 + a_1\,\alpha_s(\frac{\mu_R}{\Lambda}) + a_2\,\alpha_s^2(\frac{\mu_R}{\Lambda}) + \ldots \tag{1.10}$$

nach $\alpha_s$ auf, wobei $a_i$ die Koeffizienten der Störungsreihe sind. Die führende Ordnung[3] für einen Prozeß ist der erste Term, bei dem der Koeffizient von Null verschieden ist. So ist zum Beispiel bei tiefunelastischer Streuung der Koeffizient $a_0$ der Störungsrechnung zum Wirkungsquerschnitt für Endzustände mit zwei Partonjets neben dem Protonrest gleich Null, da mindestens eine Quark–Gluonkopplung nötig ist. Das heißt, daß der führende Term von der Ordnung $\alpha_s$ ist. Dagegen ist der führende Term des totalen ep–Wirkungsquerschnittes von der Ordnung $\alpha_s^0$, da hier $a_0 \neq 0$ ist.

Der Koeffizient in führender Ordnung ist vom Renormierungsschema und der Renormierungsskala $\mu_R$ unabhängig, da in führender Ordnung keine virtuellen Quark– oder Gluonschleifen beitragen. Bestimmt man $\Lambda$ bei einer Messung durch den Vergleich mit einer LO–Rechnung, treten also nur Terme $\mu_R/\Lambda$ auf. Dadurch ist $\Lambda$ nur über die Wahl von $\mu_R$ festgelegt. Die Koeffizienten zu höherer Ordnung sind jedoch Funktionen von $\mu_R$.

[3]Rechnungen zu führender Ordnung werden im weiteren auch mit *LO* für *leading order* bezeichnet, Rechnungen zur nächst höheren Ordnung mit *NLO* für *next to leading order*.

Dadurch hängt $\Lambda$ weniger von der Wahl der Skala $\mu_R$ ab, wenn man die Messung mit einer NLO–Rechnung vergleicht. Falls die Beiträge aller noch höheren Ordnungen zu vernachlässigen sind, ist das Resultat für $\Lambda$ bei einer Messung unabhängig von der Wahl der Renormierungsskala $\mu_R$. Um die Messungen von $\alpha_s$ bei zwei verschiedenen Prozessen miteinander vergleichen zu können, ist mindestens eine NLO–Rechnung nötig, da die Wahl der Skala nicht eindeutig ist. Es ist üblich, eine für den Prozeß charakteristische Energie als Skala zu verwenden. Zum Vergleich der Ergebnisse bei verschiedenen Energien wird $\alpha_s$ über die Gleichung 1.7 bei der Masse des $Z^0$ angegeben. Das ist identisch mit der Angabe von $\Lambda$.

Bei einer Vielzahl von Teilchenreaktionen wurde die Kopplungskonstante $\alpha_s$ bzw. $\Lambda$ gemessen. Jede Messung von $\alpha_s$ entspricht einem Test der QCD. Die QCD ist universell gültig, wenn man bei allen Teilchenreaktionen das gleiche $\alpha_s$ erhält. Eine Zusammenfassung der Messungen von $\alpha_s$ ist in [32, 33] zu finden. Die bisher genauesten Messungen stammen vom hadronischen Zerfall des $\tau$–Leptons, aus hadronischen Endzuständen in der $e^+e^-$–Vernichtung, aus Strukturfunktionsmessungen und aus $b\bar{b}$–Zuständen, die über Gittereichtheorie berechnet wurden.

Der Fehler einer $\alpha_s$–Messung hängt in Verbindung mit dem Fehler des gemessenen Wirkungsquerschnittes unter anderem davon ab, wie groß der Koeffizient $a_0$ im Vergleich zu den übrigen Koeffizienten der Störungsreihe ist. Bei Prozessen mit großem $a_0$ führen schon kleine experimentelle Fehler zu großen Fehlern bei dem ermittelten $\alpha_s$. Hinzu kommen theoretische Unsicherheiten bei der Berechnung der Störungsreihe, insbesondere die Unsicherheit des Beitrages nicht berechneter Terme höherer Ordnung und die Abhängigkeit des Ergebnisses von der Renormierungsskala. Bei tiefunelastischer Streuung kommt die Unsicherheit durch die Wahl des Faktorisierungsschemas und der Faktorisierungsskala hinzu. Eine weitere Unsicherheit haben $\alpha_s$–Messungen, bei denen man die Struktur des hadronischen Endzustandes verwendet, da man von den phänomenologischen Hadronisationsmodellen abhängig wird.

Bei der tiefunelastischen ep–Streuung läßt sich $\alpha_s$ über die Messung der Strukturfunktionen bestimmen, da die QCD die Abhängigkeit der Strukturfunktionen von $Q^2$ beschreibt. Dazu muß man $\alpha_s$ gemeinsam mit den Partondichten $\phi_i$ an die Strukturfunktionen bzw. an den totalen Wirkungsquerschnitt, der in Abhängigkeit von $x_{Bj}$ und $Q^2$ gemessenen wurde, anpassen. Bei den Messungen der Strukturfunktionen bei den HERA–Experimenten H1 und ZEUS sind die experimentellen Fehler klein. Da der Koeffizient der Störungsreihe $a_0$ für den totalen Wirkungsquerschnitt groß ist, sind diese experimentellen Fehler für eine Bestimmung von $\Lambda$ bzw. $\alpha_s$ jedoch noch zu groß [34, 35, 36]. Daher wurden diese Messungen bisher nur dazu verwandt, Parametrisierungen der Partondichten $\phi_i$ anzupassen. Dabei wird $\alpha_s$ vorgegeben. Da die Gluondichte $\phi_g$ erst zur Ordnung $\alpha_s$ zur Strukturfunktion beiträgt, ist die ermittelte Gluondichte mit dieser Wahl für $\alpha_s$ stark verknüpft und mit einem größeren Fehler als die Quarkdichten behaftet. Durch die zusätzliche Messung des Wirkungsquerschnittes von hadronischen Endzuständen mit zwei oder mehr Jets neben dem Protonrest läßt sich die Genauigkeit der Bestimmung von $\alpha_s$ und $\phi_g$ erhöhen, da hier $a_0 = 0$ ist.

In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, daß durch die Messungen der Strukturfunktionen die Partondichten bekannt sind. Über den Wirkungsquerschnitt für Endzustände mit zwei Jets neben dem Protonenrest wird $\alpha_s$ bestimmt. Dabei wird vernachlässigt, daß zur Berechnung der Partondichten aus den gemessenen ep–Wirkungsquerschnitten bereits ein Wert für $\alpha_s$ angenommen wurde. Es zeigt sich jedoch, daß bei genügend großen $Q^2$ das gemessene $\alpha_s$ nur wenig von dieser Annahme für $\alpha_s$ abhängt [37], da hier der Beitrag der Gluondichte klein wird.

Der totale Wirkungsquerschnitt ist aus den Messungen der Strukturfunktionen bekannt. Hier wird nur der relative Anteil des Wirkungsquerschnittes für Endzustände mit zwei Jets neben dem Protonrest gemessen. Dieser relative Anteil wird im Folgenden als *Jetrate* bezeichnet. Die Meßgröße ist die differentielle Jetrate in Abhängigkeit von $y_2$, wobei $y_2 = min(p_i + p_j)^2/W^2$ und $p_i$ die Vierervektoren der Jets und des Protonrests sind. Die Größe $y_2$ entspricht dem oben vorgestellten Auflösungskriterium für Partonjets bzw. dem Divergenzschnitt in PROJET. Die genauen Definitionen von $y_2$ und die Vorschrift zur Bildung von Jets wird in Kapitel 5 vorgestellt. Ähnliche Messungen von $\alpha_s$ über differentielle Jetraten wurden bei Experimenten zur $e^+e^-$–Vernichtung gemacht [38, 39, 40, 41, 42]. Bei den HERA–Experimenten H1 und ZEUS wurde bisher nur die integrierte Jetrate bei einem festen Wert für die Jetauflösung zur Messung von $\alpha_s$ verwandt [43, 44, 45, 46]. Die in dieser Arbeit vorgestellte Messung verwendet erstmalig die differentielle Jetrate in Abhängigkeit vom Auflösungsparameter zur Messung von $\alpha_s$ bei H1.

## 1.8 Monte–Carlo–Generatoren

Die Modelle zur tiefunelastischen ep–Streuung sind in *Monte–Carlo–Generatoren* implementiert worden. Mit ihnen kann man einzelne Streuereignisse simulieren, deren jeweiliger Endzustand zufällig aus den möglichen Endzuständen ausgewählt wird. Die Häufigkeitsverteilungen für verschiedene Endzustände sind durch die zugrundeliegenden Modelle bestimmt. Allen Monte–Carlo–Generatoren für tiefunelastische Streuung ist gemeinsam, daß neben dem gestreuten Elektron zunächst Quarks und Gluonen, die aus der Streuung hervorgehen, simuliert werden, sie werden als *Partonen* der Streuung bezeichnet. Die Partonen sind dann der Ausgangspunkt für die Simulation der Hadronisation. In dieser Analyse wird das Programm LEPTO dazu verwandt, den Zusammenhang zwischen den experimentell beobachteten *Jets* von Hadronen und den Quarks und Gluonen zu ermitteln. Die Vorhersagen von ARIADNE dienen als zusätzlicher Vergleich bei der Untersuchung der Jets in Vorwärtsrichtung.

### 1.8.1 LEPTO

Die einlaufenden Partonen aus dem Proton werden bei LEPTO [47] nach vordefinierten Partondichten verteilt. Für diese Analyse wurde die Partondichte MRS H [21] verwandt, die an die bei den HERA–Experimenten gemessenen Strukturfunktionen angepaßt wurde. Es werden Boson–Gluon–Fusions– und QCD–Compton–Prozesse mit den Matrixelementen[4] zur Ordnung $\alpha_s$ generiert. Die Divergenzen wurden für diese Analyse mit dem Schnitt

$$\frac{(p_i + p_j)^2}{W^2} > y_{min} = 0.015 \tag{1.11}$$

vermieden, wobei zu den Vierervektoren $p_i$ die Partonen der Streuung und der Protonrest gehören. Die Differenz zwischen dem totalen Wirkungsquerschnitt und dem Wirkungsquerschnitt für Boson–Gluon–Fusion und QCD–Comptonprozesse, der vom Divergenzschnitt abhängt, wird durch Ereignisse berücksichtigt, bei denen das Elektron ein Quark aus dem Proton streut, ohne daß ein Gluon abgestrahlt wird.

Als Modell für QCD–Abstrahlungen höherer Ordnung werden ausgehend von den an der Streuung beteiligten Partonen Partonschauer gebildet. Die Partonschauer werden nach der *Leading Log Approximation* berechnet. Dabei werden führende Logarithmen der QCD–Störungsreihe berücksichtigt. Sowohl einlaufende Partonen als auch auslaufende Partonen, die über das Matrixelement berechnet werden, können Partonschauer bilden. Bei den einlaufenden Partonen wird der Partonschauer ausgehend vom Streuvertex berechnet, wobei die Partondichte berücksichtigt wird. Die maximale Virtualität, die die Partonschauer erzeugen dürfen, ist durch den Divergenzschnitt bei der Berechnung des Matrixelements gegeben. Dadurch wird eine Überlappung des Phasenraumes für Partonschauer und Matrixelement vermieden. Die Verbindung von Matrixelement und Partonschauer, die im weiteren auch mit *MEPS* bezeichnet wird, ist eine Faktorisierung, die nicht direkt aus der QCD zu begründen ist. Sie ist vielmehr als Modell aufzufassen, in das zusätzliche Annahmen eingehen, wie die genaue Definition der maximal erlaubten Virtualität und die Wahl des Divergenzschnittes.

Nach der Bildung der Partonschauer werden zwischen Quarks, Gluonen und Protonrest Strings gespannt. Aus den Strings werden dann über das Lund–String–Modell Hadronen gebildet. Die Vorschrift zur Anordnung der Strings ist eine Modellannahme, die anhand von Meßdaten optimiert wurde.

Zur Korrektur der Hadronisations– und Detektoreffekte wurde in dieser Analyse LEPTO in der Version 6.3 verwandt. Die Studien zum Einfluß der Partonschauer wurden mit der Version 6.1 durchgeführt.

### 1.8.2 ARIADNE

Bei dem Programm ARIADNE [48] wird anstelle des QCD–Matrixelements und den Partonschauern zwischen dem gestreuten Quark und dem Protonrest ein *Farbdipol* gebildet. Vergleichbar einem schwingenden Dipol der Elektrodynamik kann dieser Farbdipol Gluonen aussenden. Die Farbladungen, die dabei enstehen, bilden wieder neue Dipole, die wiederum strahlen können. Um die Gluondichte des Protons bei diesem Modell zu berücksichtigen, wird das QCD–Matrixelement für Boson–Gluon–Fusion zur Ordnung $\alpha_s$ berechnet. Zwischen dem Quark–Antiquark–Paar und dem Protonrest werden dann ebenfalls Farbdipole gebildet. Zur Hadronisation wird wieder das Lund–String–Modell verwandt.

[4] Die Matrixelemente der Streumatrix sind das Betragsquadrat der Streuamplituden.

# Kapitel 2

# Das Experiment H1

## 2.1 HERA




Abbildung 2.1: HERA und Vorbeschleuniger

Die *Hadronen–Elektronen–Ring–Anlage HERA* [49] besteht aus zwei Speicherringen, dem Elektronen– und dem Protonenring, die in einem 6.3 km langen Tunnel aufgebaut sind. Mit dem Protonenring können Protonen auf eine Energie von bis zu 820 GeV beschleunigt werden. Die Magnetfelder, die notwendig sind, um sie in der Kreisbahn zu halten und zu fokussieren, werden von supraleitenden Dipol– bzw. Quadrupolmagneten erzeugt. In normalleitenden Resonatoren werden die Protonen mit hochfrequenten elektromagnetischen Wellen beschleunigt. Der Elektronenring ist mit normalleitenden Magneten und supraleitenden

Resonatoren ausgerüstet und erlaubt eine maximale Strahlenergie von 30 GeV. Aufgrund der Beschleunigung durch hochfrequente Wellen sind die Teilchenstrahlen in Bewegungsrichtung in Pakete (*Bunche*) unterteilt. Der Abstand der Pakete beträgt 96 ns $\hat{=}$ 28m. Die Elektronen und Protonen in den Paketen sind in longitudinaler Richtung um die mittlere Position des Paketes herum verteilt. Die Wurzel des mittleren quadratischen Abstandes ist bei den Elektronen etwa 1cm und bei den Protonen etwa 20 cm. An zwei Stellen werden der Protonen– und der Elektronenstrahl unter einem Winkel von 180° aufeinander gelenkt. In diesen Wechselwirkungsbereichen treffen sich Protonen– und Elektronenbunche im Abstand von 96 ns. Aufgrund der longitudinalen Ausdehnung der Bunche finden die Kollisionen von einzelnen Elektronen mit Protonen wenige Zentimeter verteilt um den mittleren Wechselwirkungspunkt statt. Um die beiden Wechselwirkungsbereiche sind die Detektoren H1 in der Experimentierhalle Nord und ZEUS in der Experimentierhalle Süd aufgebaut. In zwei weiteren Experimentierhallen befinden sich der Detektor HERMES und das HERA–B Experiment. Dort kollidiert der Elektronen– bzw. Protonenstrahl mit einem stationären Target.

Die Protonen werden aus negativ ionisiertem Wasserstoff gewonnen. Mit einem Linearbeschleuniger werden die $H^-$–Ionen beschleunigt und bei der Injektion in das Synchrotron DESY III durch eine dünne Folie geschossen, in der die Elektronen zurückbleiben. Zur Erzeugung von Positronen werden zunächst Elektronen von einem Linearbeschleuniger auf Wolfram geschossen. Durch Bremsstrahlung und nachfolgende Paarbildung enstehen Positronen. Die Positronen werden im Speicherring PIA zwischengespeichert. Die Protonen und Positronen werden in den Speicherringen DESY und PETRA gesammelt und beschleunigt, bevor sie in HERA injiziert werden. Die Anordnung der Speicherringe und Linearbeschleuniger ist in Abbildung 2.1 dargestellt.

Während der Betriebszeit 1994 wurde der Elektronenring mit Positronen gefüllt, die auf eine Energie von 27.5 GeV beschleunigt wurden. Zusammen mit der Energie der Protonen von 820 GeV ergibt sich damit eine Schwerpunktsenergie von 300 GeV. Die mittleren Ströme, mit denen die Speicherringe von HERA im Jahr 1994 gefüllt wurden, waren 17 mA Positronen und 41 mA Protonen. Die maximal erreichte Luminosität betrug $4.3 \cdot 10^{30}\,\mathrm{cm}^{-2}\mathrm{s}^{-1}$. Die Lebensdauer der Luminosität war einige Stunden. Rund 160 Bunche von 220 maximal möglichen wurden gefüllt.

## 2.2 Aufbau des H1–Detektors

In Abbildung 2.2 ist der H1–Detektor schematisch dargestellt. Die Ausmaße des Detektors sind $\sim 12\,\mathrm{m} \times 10\,\mathrm{m} \times 15\,\mathrm{m}$ und sein Gewicht beträgt $\sim 2800\,\mathrm{t}$. Aufgrund der größeren Energie der Protonen bewegt sich das gemeinsame Schwerpunktsystem von Proton und Elektron bzw. Positron in Richtung des Protonenstrahls. Daher ist der Detektor asymmetrisch aufgebaut. Die Flugrichtung der Protonen ist in dieser Arbeit die $z$–Achse des Koordinatensystems. Der Nullpunkt ist der nominelle Wechselwirkungspunkt. Im weiteren wird die positive $z$–Richtung auch Vorwärtsrichtung genannt.

Direkt um das Strahlrohr im Wechselwirkungsbereich sind *Spurkammern* installiert.