# Messung von Multijetraten in der tief inelastischen Elektron-Proton Streuung mit dem H1 Detektor bei HERA

Dissertation

zur Erlangung des Doktorgrades
des Fachbereichs Physik
der Universität Hamburg


vorgelegt von

Armin Wegner

aus Hamburg


Hamburg 1994

| | |
|---|---|
| Gutachter der Dissertation: | Prof. Dr. G. Heinzelmann<br>Prof. Dr. K. Meier |
| Gutachter der Disputation: | Prof. Dr. K. Meier<br>Prof. Dr. E. Lohrmann |
| Leiter der Disputation: | Dr. G. Poelz |
| Datum der Disputation: | 27. Juli 1994 |
| Sprecher des Fachbereiches Physik und<br>Vorsitzender des Promotionsausschusses: | Prof. Dr. E. Lohrmann |

# Kurzfassung

In dieser Arbeit wird die erste Analyse von Mutijetproduktion mit dem H1-Detektor bei HERA vorgestellt. Die Daten wurden während der Meßperiode 92 aufgenommen und entsprechen einer integrierten Luminosität von $22.5\,nb^{-1}$. Es wird die Struktur von Multijetereignissen untersucht und mit Monte-Carlo Modellen verglichen. Jetraten werden mit dem JADE-Algorithmus für Impulsüberträge bis $Q^2 = 500\,GeV^2$ bestimmt. Es werden systematische Fehlereinflüsse auf die Messung der Jetraten untersucht.

Innerhalb der statistischen und sytematischen Fehler ergibt sich eine Übereinstimmung der Jetraten mit den Vorhersagen von Modellen, die auf der QCD basieren.

# Abtract

In this thesis the first analysis of multi-jet production with the H1 detector at HERA is presented. The studies are based on data taken in 1992. The integrated luminosity was $22.5\,nb^{-1}$. The structure of multi jet events are explored und compared to Monte Carlo models. Jet rates for momentum transfers squared up to $500\,GeV^2$ are determind using the JADE clustering algorithm. Sytematical effects are investigated.

Within the statistical and systematical errors the jet rates are found to be in agreement with the predictions from QCD based models.

# Inhaltsverzeichnis

# Abbildungsverzeichnis

# Tabellenverzeichnis

# Einleitung

Streuexperimente haben wesentlich zur heutigen Kenntnis vom Aufbau der Materie beigetragen. So hat die Untersuchnug der Steuung von $\alpha$-Teilchen mit einer Energie von einigen MeV an einer Goldfolie durch Lord Ernest Rutherford [1] Anfang des Jahrhunderts zum Einblick in die innere Struktur des Atoms geführt. Lepton-Proton-Streuexperimente mit Leptonenergien im GeV Bereich haben 1956 [2] gezeigt, daß das Proton ein ausgedehntes Objekt ist. Die innere Struktur des Protons konnte 1969 [3] durch die Streuung von 20 GeV Elektronen an Protonen untersucht werden [4]. Es zeigte sich, daß das Proton aus punktförmigen Konstituenten aufgebaut ist, was durch das Quark-Parton Modell erklärt werden konnte. Bei Leptonenergien von einigen hundert GeV wurde die „Skalenverletzung" der Protonstrukturfunktionen beobachtet [5], was wesentlich war für die Entwicklung der Theorie, die die Wechselwirkung der Quarks beschreibt, der Quantenchromodynamik (QCD).

Dagegen wurde die erste direkte Evidenz für das Teilchen, das die Wechselwirkung zwischen den Quarks vermittelt, das Gluon, nicht durch Lepton-Nukleon-Streuexperimente, sondern an dem $e^+e^-$-Speicherring PETRA gefunden. Die Gluonen wurden dabei durch hadronische Teilchenbündel, den sogenannten Jets, identifiziert.

HERA ist eine Weiterentwicklung der Lepton-Nukleon-Streuexperimente. Bei HERA werden nun erstmals nicht Leptonen an ruhenden Nukleonen gestreut, sondern es werden Elektronen mit einer Energie von 26.7 GeV an Protonen mit einer Energie von 820 GeV gestreut. Damit werden Schwerpunktsenergien von $\sqrt{s}$=300 GeV erreicht und Impulsüberträge möglich (bis zu $Q^2$=$10^5$ GeV$^2$), die um zwei Größenordnungen höher liegen als bei bisherigen Lepton-Nukleon-Streuexperimenten. Es eröffnen sich somit gänzlich neue kinematische Bereiche der Lepton-Nukleon-Physik. Neben dem kinematischen Bereich großer Impulsüberträge wird bei HERA auch die Region kleiner Bjorken-x Werte zugänglich, und es kann hier die innere Struktur des Protons im Grenzbereich zwischen perturbativer und nicht perturbativer QCD untersucht werden. Der neue kinematische Bereich bei HERA eröffnet auch die Möglichkeit der Suche nach supersymmetrischen Teilchen, schweren Quarks oder einer Quark/Lepton-Substruktur. Weiterhin können Parameter der elekroschwachen Wechselwirkung bestimmt werden. Photoproduktionsereignisse können in einem kinematischen Bereich gemessen werden, der den bisheriger Experimente um eine Größenordnug übersteigt.

Aufgrund der hohen Schwerpunktsenergie eröffnet sich bei HERA ein großer Phasenraum für QCD-Abstrahlungen, und der hadronische Endzustand erlaubt detaillierte Tests der QCD. In dieser Analyse wird die an $e^+e^-$-Beschleunigern angewendete Methode aufgegriffen, durch QCD-Prozesse abgestrahlte Quarks oder Gluonen anhand von Jets zu identifizieren. Im Gegensatz zu den $e^+e^-$-Speicherringen besteht bei HERA der Vorteil, daß $Q^2$ über mehrere Größenordnungen variiert. Damit kann bei HERA innerhalb eines Experimentes die $Q^2$ Abhängigkeit der starken Kopplungskonstanten beobachtet werden. Die höchsten erreichbaren Impulsüberträge liegen bei HERA eine Größenordnung höher als bei LEP. Aufgrund des Propagatorterms $1/Q^4$ im Wirkungsquerschnitt der tief inelastischen $ep$-Streuung nimmt allerdings die Anzahl der Ereignisse stark ab für wachsendes $Q^2$. Die hier vorgestellte erste Analyse von Multijetraten bei HERA beruht auf Daten mit Ereignissen bis zu einem maximalen $Q^2$ von $2600\,GeV^2$, die im ersten Betriebsjahr mit dem H1-Detektor gewonnenen wurden.

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert:

In **Kapitel 1** wird eine kurze Beschreibung der QCD und der Vorhersagen der QCD für die Multijetproduktion in der tief inelastischen $ep$-Streuung gegeben.

Neben den exakten QCD-Rechnungen gibt es mehrere phänomenologische Monte-Carlo-Modelle zur Beschreibung des hadronischen Endzustandes. Diese werden in **Kapitel 2** dargestellt. Außerdem werden in diesem Kapitel phänomenologische Modelle erläutert, die den Übergang von Partonen in Hadronen beschreiben und somit die Verbindung zwischen den experimentelle Beobachtungen und den QCD-Rechnungen bzw. den QCD-Modellen herstellen.

In **Kapitel 3** werden der HERA-Speicherring und die in dieser Analyse verwendeten Komponenten des H1-Detektors kurz beschrieben.

Die Selektion der in dieser Analyse verwendeten Datenmenge wird in **Kapitel 4** behandelt.

Der Definition von Jets liegt in dieser Arbeit der JADE-Algorithmus zugrunde, der bisher hauptsächlich bei der $e^+e^-$-Steuung verwendet wurde. In **Kapitel 5** wird beschrieben, wie der JADE-Algorithmus in dieser Analyse für die tief inelastische $ep$-Steuung implementiert wurde.

Die Einflüsse theoretischer Unsicherheiten, die beim Vergleich von gemessenen Jetraten mit QCD-Rechnungen beachtet werden müssen, werden für diese Analyse in **Kapitel 6** untersucht. Im zweiten Teil dieses Kapitels wird der Einfluß experimenteller Unsicherheiten auf die Bestimmung von Jetraten studiert.

**Kapitel 7** beschreibt zum JADE-Algorithmus alternative Jetdefinitionen. Es werden andere Formen des JADE-Algorithmus untersucht sowie auch andere Clusteralgorithmen betrachtet. Dabei werden im wesentlichen die Hadronisierungsverschiebungen und Detektorkorrekturen der mit diesen Algorithmen bestimmten Jetraten diskutiert.

**Kapitel 8** stellt die Resultate dieser Analyse vor. Es werden sowohl die Eigenschaften der rekonstruierten Jets untersucht und mit den QCD-Modellen verglichen als auch die Abhängigkeit der 2+1 Jetrate von $Q^2$ bestimmt und mit QCD-Rechnungen bzw. Modellen verglichen.

Abschließend werden die wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefaßt.

# Kapitel 1

# Theoretische Grundlagen

## 1.1 Quantenchromodynamik

### 1.1.1 Die Lagrangedichte der Quantenchromodynamik

Die Quantenchromodynamik (QCD) ist die Feldthorie der starken Wechselwirkung [6, 7]. Sie ist eine Eichtheorie mit der Eichgruppe $SU(3)_c$ (c wie „colour"). Die Spin-1/2 Felder der farbigen Quarks sind die fundamentalen Konstituenten der Theorie. Die $SU(3)_c$-Symmetrie ist in der QCD exakt. Es wird in dieser Eichtheorie gefordert, daß die Quarkfelder invariant gegenüber $SU(3)_c$-Transformationen sind:

$$q^i(x) \rightarrow q^{i'}(x) = U(x)q^i(x) = e^{-\frac{i}{2}\sum_a \lambda_a \theta_a(x)} q_i(x) \tag{1.1}$$

Dabei wird die Transformation durch die acht Generatoren der $SU(3)_c$ $\lambda_a$ (Gell-Mann-Matrizen) und die acht Parameter $\theta_a$ beschrieben. Wird als kinetischer Term der Quarks in der Lagrangedichte der QCD die Dirac-Gleichung angenommen, so müssen die Vektorfelder der Gluonen $G^a_\mu, a = 1, 2, ...8$ eingeführt werden, um die Invarianz der Lagrangedichte unter lokalen SU(3)-Transformationen zu erhalten. Eichinvarianz ergibt sich dann durch den Übergang zur kovarianten Ableitung:

$$\partial_\mu \rightarrow D_\mu = \partial_\mu + ig\lambda^a G^a_\mu \tag{1.2}$$

mit $g$ als dimensionsloser Kopplungskonstanten der QCD. Die Gluonfelder $G^a_\mu$ transformieren sich bei Eichtransformationen in der adjungierten $SU(3)_c$-Darstellung:

$$\lambda^a G^a_\mu \rightarrow U(x)\lambda^a G^a_\mu U^{-1}(x) - \frac{i}{g}U(x)\partial_\mu U^{-1}(x) \tag{1.3}$$

Mit den kinetischen Energien der Quarks und Gluonen ergibt sich für die Lagrangedichte der QCD:

$$\mathcal{L}_{QCD} = \sum_{j=1}^{f} \bar{q}^j_\alpha(x)(i\gamma^\mu D_\mu - m_j)q^j_\alpha(x) - \frac{1}{4}G^a_{\mu\nu}G^{a,\mu\nu} + \mathcal{L}_{Eichfixierung} + \mathcal{L}_{Geist} \tag{1.4}$$

Mit $G_{\mu\nu}$ wird dabei der Feldtensor der Gluonen bezeichnet:

$$G^a_{\mu\nu} = \partial_\mu G^a_\nu(x) - \partial_\nu G^a_\mu(x) + gf_{abc}G^b_\mu G^c_\nu, \tag{1.5}$$

mit den Strukturkonstanten $f_{abc}$ der SU$(3)_c$. Um in der Störungstheorie aus der Lagrangedichte den Gluonpropagator ableiten zu können, ist es erforderlich, einen eichfixierenden Term einzuführen. Mit

$$\mathcal{L}_{Eichfixierung} = -\frac{1}{2\lambda}\left(\partial^\mu G^a_\mu\right)^2 \tag{1.6}$$

wird die Klasse der kovarianten Eichungen mit dem Paramater $\lambda$ fixiert. Diese Verfahren ist notwendig, da das Gluon als Vektorfeld vier Polarisationsfreiheitsgerade besitzt, aber wegen seiner Masselosigkeit nur zwei transversale Freiheitsgerade haben kann. In der nicht abelschen QCD müssen in diesem Zusammenhang für kovariante Eichfixierungen außerdem noch weitere, nicht physikalische, sog. Fadeyev-Popov-Geisterfelder eingeführt werden [8]:

$$\mathcal{L}_{Geist} = \partial^+_\mu \eta D^\mu \eta \tag{1.7}$$

wobei $\eta$ komplexe skalare Felder sind, die aber der Fermi-Dirac-Statistik unterliegen.

Aus den in den Feldern bilinearen Termen der Lagrangedichte ergeben sich die Propagatoren der Störungstheorie. Die trilinearen und quadrilinearen Terme ergeben 3-Vertices und 4-Vertices [9]:

$$\mathcal{L}_{QCD} = \quad -\tfrac{1}{4}(\partial_\mu G^a_\nu - \partial_\nu G^a_\mu)^2 \quad + \quad \bar{q}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)q$$



$$-g f_{abc} G^a_\mu G^b_\nu \partial_\mu G^c_\nu \quad + \quad \tfrac{1}{4} g^2 f_{bca} f_{ab'c'} G^b_\mu G^b_\nu G^{b',\mu} G^{c',\nu}$$





$$+g G^a_\mu \bar{q}\gamma_\mu \tfrac{\lambda_a}{2} q \quad + \quad \mathit{Eichterme}$$





Die Selbstkopplungen der Gluonen sind mit den Strukturkonstanten der SU$(3)_c$ verbunden und somit eine Folge der nicht abelschen Symmetrie.

### 1.1.2 Renormierung

Bei der störungstheoretischen Beschreibung von physikalischen Prozessen treten neben Baumgraphen auch Schleifengraphen auf. Da bei den Schleifengraphen der innere Impuls nicht bestimmt ist, muß über diesen integriert werden. Die daraus resultierenden Integrale haben die Form:

$$\int_0^\infty \frac{d^4k}{(k^2 + M^2)^2}$$

und sind (ultraviolett-) divergent. Bei der Auswertung dieser Integrale wird eine Lösung in einem zweistufigen Verfahren erzielt. Es wird eine

1. Regularisierung und dann eine

2. Renormierung

der Theorie vorgenommen. Bei der Regularisierung werden die divergenten Integrale durch Einführung zusätzlicher Parameter zunächst in konvergente Ausdrücke überführt. Dabei wird häufig ein Verfahren benutzt, das als ,,dimensionale Regularisierung" [10, 11] bezeichnet wird. In diesem Ansatz werden die ultravioletten Divergenzen regulariesiert, indem die Anzahl der Raum-Zeit Dimensionen auf $n < 4$ reduziert wird:

$$\frac{d^4k}{(2\pi)^4} \to \mu_0^{2\varepsilon}\frac{d^{4-2\varepsilon}k}{(2\pi)^{4-2\varepsilon}} \quad \text{mit} \quad \varepsilon = 2 - \frac{n}{2}$$

Durch Einführung der Renormierungsskala $\mu_0$ erhält man die Dimensionen der Kopplungen und Felder. Schleifenintegrale der Form $d^nk/(k^2 + M^2)^2$ führen dann zu Polen bei $\varepsilon = 0$.

Die Renormierung besteht darin, die divergenten Ausdrücke in die Definition der Felder, Massen und Kopplungen zu absorbieren. Durch Addition von Gegentermen zur Lagrangedichte geht diese in die renormierte Lagrangedichte über, aus der sich endliche Ausdrücke ergeben. Eine Theorie gilt als remormierbar, wenn die in der Regularisierung extrahierten Divergenzen mit endlich vielen Typen von Gegentermen kompensiert werden können. Allerdings besteht bei der Extrahierung der Divergenzen eine erhebliche Freiheit, da neben den divergenten Termen auch endliche Terme subtrahiert werden können. Dieses kommt in unterschiedlichen Renormierungsschemata zum Ausdruck. Im $MS$-Schema (minimal subtraction) werden nur die $\frac{1}{\varepsilon}$ Terme subtrahiert. Da in der dimensionalen Regularisierung die Pole in der Kombination:

$$\frac{1}{\varepsilon} + \ln(4\pi) - \gamma_E$$

auftreten, wobei $\gamma_E$ die Eulersche Konstante ist, werden im $\overline{MS}$-Schema (modified minimal subtraction) diese Terme subtrahiert.

Nach der Renormierung und dem Übergang zum Grenzwert $\varepsilon = 0$ verbleibt im allgemeinen eine Abhängigkeit der endlichen Terme von der Renormalisierungsskala $\mu_0$.

### 1.1.3 Die laufende Kopplungskonstante

Die in der renormierten Theorie berechneten renormierten Greensfunktionen $\Gamma$ hängen von der Kopplung $\alpha_s = g^2/4\pi$, der Renormierungsskala $\mu_0^2$ und den äußeren Impulsen $p_i$ ab. Da aber $\mu_0$ ein willkürlicher Parameter ist, der in den Greensfunktionen der ursprünglichen Lagrangedichte nicht enthalten ist, ergibt sich für die Abhängigkeit der renormierten Greensfunktionen $\Gamma$ von $\mu_0$ die Differentialgleichung (Renormierungsgruppengleichung [12, 13, 14]):

$$\mu_0^2\frac{d}{d\mu_0^2}\Gamma\left(\frac{Q^2}{\mu_0^2}, \alpha_s\right) \equiv \left[\mu_0^2\frac{\partial}{\partial\mu_0^2} + \mu_0^2\frac{\partial\alpha_s}{\partial\mu_0^2}\frac{\partial}{\partial\alpha_s} + \gamma_\Gamma\right]\Gamma(\mu_0, \alpha_s, p_i) = 0 \tag{1.8}$$

Hängen die äußeren Impulse $p_i$ von einer Skala $\mu$ ab, so kann die Renormierungsgruppengleichung mit den Definitionen:

$$t = \ln\left(\frac{\mu^2}{\mu_0^2}\right), \ \beta(\alpha_s) = \mu_0^2 \frac{\partial \alpha_s}{\partial \mu_0^2}, \tag{1.9}$$

umgeschrieben werden zu:

$$\left[-\frac{\partial}{\partial t} + \beta(\alpha_s)\frac{\partial}{\partial \alpha_s}\right]\Gamma(\mu_0, \alpha_s, p_i) = 0. \tag{1.10}$$

Die Differentialgleichung wird implizit durch Einführung der laufenden Kopplungskonstanten $\alpha_s(\mu^2)$ gelöst:

$$t = \int_{\alpha_s(\mu_0^2)}^{\alpha_s(\mu^2)} \frac{dx}{\beta(x)}. \tag{1.11}$$

Durch Differentiation obiger Gleichung ergibt sich:

$$\frac{\partial \alpha_s(\mu^2)}{\partial t} = \beta(\alpha_s(\mu^2)), \ \frac{\partial \alpha_s(\mu^2)}{\partial \alpha_S} = \frac{\beta(\alpha_s(\mu^2))}{\beta(\alpha_s)}. \tag{1.12}$$

Somit ist:

$$\Gamma(0, \alpha_s(\mu^2), p_i) \int_{\alpha_s(\mu_0^2)}^{\alpha_s(\mu^2)} dx \frac{\gamma_\Gamma}{\beta(x)}$$

eine Lösung der Renormierungsgruppengleichung. Die Abhängigkeit der Größe $\Gamma$ von $\mu$ ergibt sich also ausschließlich durch die laufende Kopplungskonstante $\alpha_s(\mu^2)$.

Die Form der laufenden Kopplungkonstanten wird durch Gleichung 1.12 bestimmt. Die $\beta$-Funktion kann als perturbative Entwicklung in $\alpha_s$ geschrieben werden:

$$\beta(\alpha_s) = -b\alpha_s^2(1 + b'\alpha_s + \mathcal{O}(\alpha_s^2)) \tag{1.13}$$

$$b = \tfrac{33-2N_f}{12\pi}, \ b' = \tfrac{153-19N_f}{2\pi(33-2N_f)}, \tag{1.14}$$

wobei $N_f$ die Anzahl der aktiven Flavours bezeichnet. Dabei ergeben sich die Koeffizienten $b$, $b'$, ... aus den Schleifenkorrekturen zu den trilinearen Vertizes [6]. Die beiden ersten Koeffizienten $b$ und $b'$ hängen nicht vom Renormierungschema ab. Aus den Einschleifenkorrekturen wird der Koeffizient $b$ ermittelt, und die höheren Koeffizienten folgen entsprechendend aus Graphen mit weiteren Schleifen. Beachtet man nur den Koeffizienten $b$, so ergibt sich:

$$\ln\left(\frac{\mu^2}{\mu_0^2}\right) = \int_{\alpha_s(\mu_0^2)}^{\alpha_s(\mu^2)} \frac{dx}{-bx^2} = \frac{1}{b\,\alpha_s(\mu^2)} - \frac{1}{b\,\alpha_s(\mu_0^2)} \tag{1.15}$$

Führt man weiterhin den Paramter $\Lambda$ ein, der durch folgende Definition gegeben ist [15]:

$$\ln\left(\frac{\mu_0^2}{\Lambda^2}\right) = \int_{\alpha_s(\mu^2)}^{\infty} \frac{dx}{\beta(x)} = \int_{\alpha_s(\mu^2)}^{\infty} \frac{dx}{b\,x} = \frac{1}{b\,\alpha_s(\mu_0^2)}, \tag{1.16}$$

so ergibt sich für die Abhängigkeit der Kopplungskonstanten von $\mu^2$:

$$\alpha_s(\mu^2) = \frac{1}{b\,\ln\left(\frac{\mu^2}{\Lambda^2}\right)} \tag{1.17}$$

Ist der Koeffizient $b$ der $\beta$-Funktion größer als Null, so geht die Kopplung für $\mu^2 \to \infty$ gegen Null. Diese Eigenschaft wird als „asymptotische Freiheit" bezeichnet.

Schließt man den Zweischleifenkoeffizienten $b'$ mit in die Rechnung ein, so ergibt sich als Lösung von Gleichung 1.12:

$$\frac{1}{b\,\alpha_s(Q^2)} - \frac{1}{b\,\alpha_s(\mu_0^2)} + b' \ln\left(\frac{\alpha_s(Q^2)}{1+b'\alpha_s(Q^2)}\right) - b' \ln\left(\frac{\alpha_s(\mu_0^2)}{1+b'\alpha_s(\mu_0^2)}\right) = bt \tag{1.18}$$

Wird wieder, unter Einbeziehung des $b'$-Koeffizienten, durch Gleichung 1.16 ein Parameter $\Lambda$ definiert, so ergibt sich für die laufende Kopplungskonstante in der Zweischleifennäherung:

$$\frac{1}{\alpha_s(Q^2)} + b' \ln\left(\frac{b'\alpha_s(Q^2)}{1+b'\alpha_s(Q^2)}\right) = b \ln\left(\frac{Q^2}{\Lambda^2}\right). \tag{1.19}$$

Für einen festen Wert von $\Lambda$ kann damit $\alpha_s(Q^2)$ numerisch ermittelt werden. Allerdings ist die Definition von $\Lambda$ nicht eindeutig. Eine alternative Definition ergibt sich [15], wenn Gleichung 1.19 durch eine Entwicklung nach inversen Potenzen von $\ln(\mu^2/\Lambda^2)$ gelöst wird. Wird $\Lambda_1$, wie in Gleichnug 1.16 definiert, in folgender Weise umdefiniert:

$$\Lambda_1 = \left(\frac{b}{b'}\right)^{\frac{b'}{2b}} \Lambda_1 = 1.148\,\Lambda_2 \quad (\text{für } N_f = 5) \tag{1.20}$$

so ergibt sich als Lösung für $\alpha_s(\mu^2)$:

$$\alpha_s(\mu^2) = \frac{1}{b\,\ln(\mu^2/\Lambda^2)}\left[1 - \frac{b'}{b}\frac{\ln\ln(\mu^2/\Lambda^2)}{\ln(\mu^2/\Lambda^2)} + \cdots\right] \tag{1.21}$$

Aus der Definition von $\Lambda$ ergibt sich, daß diese Größe von der Anzahl der aktiven Flavours abhängt. Dabei ändert sich $\Lambda$ an den Flavour-Schwellen auf diskrete Weise. Die Änderung von $\Lambda$ an den Schwellen ergibt sich dabei aus der Bedingung, daß die Kopplungskonstante eine Lösung der Renormierungsgruppengleichung ist und stetig sein muß. Für die Beziehungen zwischen den $\Lambda$-Werten für unterschiedliche Anzahlen aktiver Flavours gilt näherungsweise [73]:

$$\begin{aligned} \Lambda^{(4)}_{\overline{MS}} &\approx \Lambda^{(5)}_{\overline{MS}} \left[\frac{m_b}{\Lambda^{(5)}_{\overline{MS}}}\right]^{2/25} \left[2\ln\frac{m_b}{\Lambda^{(5)}_{\overline{MS}}}\right]^{963/14375} \\ \Lambda^{(4)}_{\overline{MS}} &\approx \Lambda^{(3)}_{\overline{MS}} \left[\frac{\Lambda^{(3)}_{\overline{MS}}}{m_c}\right]^{2/25} \left[2\ln\frac{m_c}{\Lambda^{(3)}_{\overline{MS}}}\right]^{-107/1875} \end{aligned} \tag{1.22}$$

Weiterhin hängt $\Lambda$ in der Zweischleifennäherung von dem Renormalisierungsschema ab. Das Verhältnis zwischen den $\Lambda$-Werten unterschiedlicher Renormalisierungsschemata ist allerdings eine reelle Zahl, die aus der Einschleifennäherung folgt [17]. Aufgrund der der unterschiedlichen Definitionen von $\Lambda$ wird statt dieser Größe häufig bei Messungen von $\alpha_s$ das Ergebnis $\alpha_s(\mu^2)$ bei festem $\mu^2$, wie z.B. $\mu^2 = M^2_{Z^0}$, angegeben.

## 1.2 Die tief inelastische Elektron-Proton Streuung

In Abbildung 1.1 ist der elektroschwache Bornterm der tief inelastischen Elektron-Proton Streuung dargestellt. Das Elektron tritt mit dem Proton durch Austausch eines Bosons in Wechselwirkung. Handelt es sich bei dem Boson um ein $\gamma$ oder $Z^0$, werden diese Prozesse als neutrale Ströme bezeichnet. Bei Austausch von $W$-Bosonen ist das auslaufende Lepton ein Neutrino und man spricht von geladenen Strömen. In dieser Analyse werden aber nur Ereignisse des neutralen Stromes betrachtet. Wird vom Endzustand nur das gestreute




Abb. 1.1: *Feynmangraph der tief inelastischen Elektron-Proton Streuung*

Elektron gemessen, so läßt sich der differentielle Wirkungsquerschnitt schreiben als:

$$\frac{d^2\sigma}{dE'_e d\Omega_{e'}} = \frac{1}{16\pi^2}\frac{E'_e}{E_e}\sum_{i,j=\gamma Z^0} \chi_i\chi_j L^{i,j}_{\mu\nu} W^{i,j}_{\mu\nu} \tag{1.23}$$

Dabei werden die leptonischen Tensoren $L_{\mu\nu}$ aus den elektroschwachen Strömen $l^i_\mu = \bar{u}\gamma_\mu(v^i + a^i\gamma_5)u$ gebildet. Die Vektor- und Axialvektorkonstanten $v^i$ und $a^i$ des Elektrons lauten:

$$\begin{array}{lllll} v^\gamma & = & -e & v^Z & = & -\frac{1}{2} + 2e\sin 2\theta_W \\ a^\gamma & = & 0 & a^Z & = & -\frac{1}{2} \end{array} \tag{1.24}$$

Die Faktoren $\chi^i$ bestimmen die relative Stärke des $Z^0$-Anteils:

$$\chi^\gamma = 1, \qquad \chi^{Z^0} = \frac{Q^2}{Q^2 + M^2_{Z^0}} \cdot \frac{1}{4\sin^2_{\theta_W}\cos^2_{\theta_W}} \tag{1.25}$$

Der leptonische Tensor läßt sich als Summe von einem symmetrischen und einem antisymmetrischen Anteil schreiben:

$$L^{i,j}_{\mu\nu} = \left[v^i v^j + a^i a^j - P_L(a^i v^j + a^j v^i)\right] L^S_{\mu\nu} + \left[a^i v^j + a^j v^i - P_L(v^i v^j + a^i a^j)\right] L^A_{\mu\nu} \tag{1.26}$$

Dabei wird mit $P_L$ der Anteil der longitudinalen Polarisation des Elektrons bezeichnet. Die Tensoren $L_S$ und $L_A$ lauten:

$$\begin{array}{lll} L^S_{\mu\nu} & = & 4(k_\mu k'_\nu + k_\nu k'_\mu - (k\cdot k')g_{\mu\nu}) \\ L^A_{\mu\nu} & = & 4i\varepsilon_{\mu\nu\alpha\beta}k^\alpha k'^\beta, \end{array} \tag{1.27}$$

wobei $\varepsilon_{\mu\nu\alpha\beta}$ den total antisymmetrischen Tensor vierter Stufe bezeichnet. Der hadronische Tensor $W_{\mu\nu}$ beschreibt die Struktur des Protons und ist nicht aus der perturbativen QCD herleitbar. Da aber über alle hadronischen Endzustände und über alle Spinorientierungen des Protons summiert wird, kann $W_{\mu\nu}$ nur von den Vierervektoren $p$ und $q$ abhängen. Mit diesen beiden Vierervektoren lasssen sich sechs unabhängige Lorentz-Tensoren zweiter Stufe konstruieren:

$$W_{\mu\nu} = -g_{\mu\nu} W_1 + \frac{p^\mu p^\nu}{M^2} W_2 + \frac{i\varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} p_\alpha p_\beta}{2M^2} W_3 + \frac{q^\mu q^\nu}{M^2} W_4 + \frac{(p^\mu q^\nu + p^\nu q^\mu)}{2M^2} W_5 + \frac{(p^\mu q^\nu - p^\nu q^\mu)}{2M^2} W_6 \tag{1.28}$$

Dabei wurden die Fromfaktoren $W_{1\ldots 6}$ eingeführt. Für $m_e/E_e \ll 1$ können die letzten drei Tensoren vernachlässigt werden [18]. Durch Kontraktion des Lepton-Tensor mit dem Hadron-Tensor egibt sich dann für den differentiellen Wirkungsquerschnitt:

$$\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{xQ^4} \left( xy\mathcal{F}_1 + (1-y)\mathcal{F}_2 + y\left(1 - \frac{y}{2}\right) x\mathcal{F}_3 \right), \tag{1.29}$$

mit den acht Strukturfunktionen:

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_1 &= F_1 + \chi_{Z^0}(-v + P_L\, a) G_1 + \chi^2_{Z^0}(v^2 + a^2 - 2P_L\, a\, v) H_1 &(1.30)\\
\mathcal{F}_2 &= F_2 + \chi_{Z^0}(-v + P_L\, a) G_2 + \chi^2_{Z^0}(v^2 + a^2 - 2P_L\, a\, v) H_2 &(1.31)\\
x\mathcal{F}_3 &= \chi_{Z^0}(-a + P_L\, v) G_3 + \chi^2_{Z^0}(-P_L(v^2 + a^2) + 2\, a\, v) x H_3 &(1.32)
\end{aligned}$$

Dabei wurde der differentielle Wirkungsquerschnitt in lorentzinvarianten Variablen umgeschrieben:

$$\begin{aligned}
Q^2 = -q^2 &= (k-k')^2 &&= 4E_e E_{e'} \cos^2\tfrac{\theta_{e'}}{2}\\
x &= \tfrac{Q^2}{2pq} &&= \frac{E_{e'}\cos^2\frac{\theta_{e'}}{2}}{E_p\left(1 - \frac{E_{e'}}{E_e}\sin^2\frac{\theta_{e'}}{2}\right)}\\
y &= \tfrac{pq}{2pk} &&= 1 - \tfrac{E_{e'}}{E_e}\sin^2\tfrac{\theta_{e'}}{2}
\end{aligned} \tag{1.33}$$

Eine weitere häufig verwendete lorentzinvariante Variable ist die invariante Masse des gesamten hadronischen Systems:

$$W^2 \equiv P_X^2 = (P_p + P_e - P_{e'})^2 = \frac{1-x}{x} Q^2 + M_p^2 \tag{1.34}$$

Die oben definierten Variablen werden durch $Q^2 = sxy$ verknüpft, wobei $s$ das Quadrat der Schwerpunktsenergie ist: $s \approx 4E_e E_p$. Neben der Definition der kinematischen Variablen durch Winkel und Energie des gestreuten Elektrons können diese auch durch das hadronische System, oder aus beiden, bestimmt werden. In bestimmten kinematischen Bereichen ist dieses aufgrund der Meßfehler günstiger [19].

Durch den Propagatorterm $\chi^{Z^0}$ dominieren für $Q^2 \ll M^2_{Z^0}$ die elektromagnetischen Strukturfunktionen $F_1$ und $F_2$. Da in dieser Arbeit im wesentlichen Daten mit kleinem $Q^2$ verwendet werden, wird im Folgendem nur dieser Anteil betrachtet.

Zwischen den Strukturfunktionen $F_1$ und $F_2$ und dem Wirkungsquerschnitt für die Absorption transversal und longitudinal polarisierter virtueller Photonen durch das Proton ($\sigma_T$ und $\sigma_L$) besteht folgender Zusammenhang:

$$2xF_1 = (1-x)\frac{\sigma_T}{\sigma_0} \tag{1.35}$$

$$F_2 = (1-x)\frac{\sigma_T + \sigma_L}{\sigma_0} \tag{1.36}$$

$$F_L \equiv \frac{F_2 - 2xF_1}{x} = (1-x)\frac{\sigma_l}{\sigma_0} \tag{1.37}$$

mit $\sigma_0 = 4\pi^2\alpha/Q^2$.

### 1.2.1 Das Quark-Parton-Modell

Im Quark-Parton-Modell [20] wird die tief inelastische Elektron-Proton Streuung beschrieben als Streuung an punktförmigen Teilchen, den Partonen, die sich frei im Proton bewegen. Eine heuristische Rechtfertigung dieses Modells ergibt sich in einem Bezugssystem, in dem sich das Proton mit großem Impuls bewegt (was für das H1-Laborsystem zutrifft). Aufgrund der relativistischen Zeitdilatation wird in diesem Bezugssytem die Rate vermindert, mit der die Partonen untereinander wechselwirken. Im Quark-Parton-Modell ergibt sich die Wechselwirkung des Elektrons mit dem Proton als inkohärente Summe von Elektron-Parton Wechselwirkungen. Für Spin-1/2 Partonen gilt im Quark-Parton-Modell für die Strukturfunktionen $F_1$ und $F_2$:

$$F_2 = x\sum_{f=1}^{N_f} e_f^2(q(x) - \bar{q}(x)) \tag{1.38}$$

$$2xF_1 = F_2, \quad (\mathrm{Callan-Gross-Relation}) \tag{1.39}$$

wobei $f(x)$ die Wahrscheinlichkeit angibt, ein Quark $f$ mit dem Impulsanteil $x$ im Proton zu finden. Im Quark-Parton-Modell mit als masselos angenommene Partonen[1] ist $x$ identisch mit der Bjorkenvariable $x$ in Gleichung 1.33. Die Partondichten und somit auch $F_2$ und $F_1$ hängen im Quark-Parton-Modell nur von $x$ ab („Skalenverhalten"). Aus der Callan-Gross-Relation folgt, daß im Quark-Parton-Modell $\sigma_L$ bzw. $F_L$ verschwindet.

### 1.2.2 QCD-Korrekturen zum Quark-Parton-Modell

#### Korrekturen der Ordnung $\alpha_s$

Ergebnisse der $\mathcal{O}(\alpha_s)$-Korrekturen zum Quark-Parton-Modell wurden in den Referenzen [23, 22, 24, 26, 27, 28] veröffentlicht. In der Ordnung $\alpha_s$ der QCD-Störungsreihe tragen die in Abbildung 1.2 dargestellten Feynmangraphen zum Wirkungsquerschnitt bei. Dabei erhält der Bornterm des Quark-Parton-Modells virtuelle Korrekturen aufgrund der Interferenz mit Schleifengraphen (Abbildung 1.2 a). Weiterhin gibt es reelle Beiträge durch QCD-Compton Prozesse (Abbildung 1.2 b) und Boson-Gluon-Fusionsprozesse (Abbildung 1.2 c). Das Matrixelement für den QCD-Compton-Prozeß $\gamma^* q \to q g$ lautet:

$$|M_{fi}|^2 = 32\pi^2(e_i^2\alpha\alpha_s)\frac{3}{4}\left(\frac{1-x_p}{1-z_p} + \frac{1-z_p}{1-x_p} + \frac{2x_p z_p}{(1-x_p)(1-z_p)}\right) \tag{1.40}$$

mit $x_p = Q^2/2pq$ und$z_p = p_1 p/pq$. Dabei gibt es für folgende kinematische Konfigurationen Divergenzen:

[1]In allen hier zitierten Rechnungen werden die Quarks im wesentlichen als masselos betrachtet.




Abb. 1.2: *Feynmangraphen der $\gamma^* q$ Wechselwirkung der Ordnung $\alpha_s$*

| | | |
|---|---|---|
| $p_2$ kollinear zu $p$ | $\Rightarrow$ | $z_p \to 1$ |
| $p_2$ kollinear zu $p_1$ | $\Rightarrow$ | $x_p \to 1$ |
| $p_2$ niederenergetisch | $\Rightarrow$ | $z_p,\ x_p \to 1$ |

Das Matrixelement für den Boson-Gluonfusions-Prozeß $\gamma^*\, q \to q\,\bar{q}$ lautet:

$$|M_{fi}|^2 = 32\pi^2(e_i^2\alpha\alpha_s)\frac{3}{4}\left[\left(\frac{1}{z_p}+\frac{1}{1-z_p}-2\right)-2x_p(1-x_p)\left(\frac{1}{z_p}+\frac{1}{1-z_p}\right)\right] \qquad (1.41)$$

Dabei gibt es für folgende kinematische Konfigurationen Divergenzen:

| | | |
|---|---|---|
| $p_2$ kollinear zu $p$ | $\Rightarrow$ | $z_p \to 1$ |
| $p_1$ kollinear zu $p$ | $\Rightarrow$ | $z_p \to 0$ |
| $p_2$ niederenergetisch | $\Rightarrow$ | $z_p \to 1$ |
| $p_1$ niederenergetisch | $\Rightarrow$ | $z_p \to 0$ |

Die infraroten Divergenzen und die kollinearen oder Massendivergenzen[2] im Endzustand werden gerade durch die Divergenzen der virtuellen Beiträge kompensiert (entsprechend dem Theorem von Kinoshita, Lee und Nauenberg [21]). Allerdings verbleiben die kollinearen Divergenzen zum einlaufenden Quark (Gluon). Diese werden in die Partonverteilungen absorbiert. Die Ereignisse der störungstheoretischen Rechnung für die Strukturfunktionen $F_2$ und $F_L$ haben die Form:

$$\frac{F_2}{x} \;=\; \int_x^1 \frac{dx_p}{x_p}\left\{\sum_{i=1}^{N_f} e_i^2(q_i(x_p,M_f^2)+\bar{q}_i(x_p,M_f^2))\left[\delta\left(1-\frac{x}{x_p}\right)+\alpha_s 2N_f C_2^g\left(\frac{x}{x_p},\frac{Q^2}{M_f^2}\right)\right]\right.$$

[2]Diese Divergenzen gibt es nur für als masselos angenommene Quarks, da für massive Quarks die Abstrahlung kollinearer Gluonen kinematisch nicht erlaubt ist.

$$+g(x_p, M_f^2)\alpha_s C_2^g\left(\frac{x}{x_p}, \frac{Q^2}{M_f^2}\right)\Bigg\} \tag{1.42}$$

$$\frac{F_L}{x} = \int_x^1 \frac{dx_p}{x_p}\left\{\sum_{i=1}^{N_f} e_i^2(q_i(x_p, M_f^2) + \bar{q}_i(x_p, M_f^2))\alpha_s C_L^q\left(\frac{x}{x_p}, \frac{Q^2}{M_f^2}\right)\right.$$
$$\left. +2N_f g(x_p, M_f^2)\alpha_s C_L^g\left(\frac{x}{x_p}, \frac{Q^2}{M_f^2}\right)\right\}, \tag{1.43}$$

mit endlichen Koeffizentenfunktionen $C$. Die Strukturfunktion $F_L$ ist dabei ungleich Null. Diese Renormierung erfordert, analog zur Renormierung der ultravioletten Divergenzen, die Einführung einer Massenskala (Faktorisierungsskala $M_f^2$). Die renormierten Partonverteilungen $f$ hängen von der Massenskala $M_f$ ab („Skalenverletzung"):

$$f_i(x, M_f^2) = \sum_j \int_x^1 \frac{dx_p}{x_p}\left[f_i(x)\delta_{ij} + \frac{\alpha_s}{2\pi}\left\{P_{ij}\left(\frac{x}{x_p}\right)\log\frac{M_f^2}{\mu^2} + R\left(\frac{x}{x_p}\right)\right\} f_j\left(\frac{x}{x_p}\right)\right] \tag{1.44}$$

Dabei ist $R$ eine divergente Größe. Die Altarelli-Parisi-Splittingfunktionen $P_{ij}$ geben die Wahrscheinlichkeit an, daß ein Parton $j$ durch Abstrahlung eines Partons $k$ in ein Parton $i$ übergeht. Die Altarelli-Parisi-Splittingfunktionen haben die Form [29]:

$$q \to qg \quad P_{qq} = \frac{4}{3}\left[\left(\frac{1+z^2}{1-z}\right)_+ + \frac{3}{2}\delta(1-x)\right] \tag{1.45}$$

$$g \to gg \quad P_{gg} = 6\left[\frac{1-z}{z} + z(1-z) + \left(\frac{z}{1-z}\right)_+ + \frac{33-2N_f}{6}\delta(z-1)\right] \tag{1.46}$$

$$g \to \bar{q}q \quad P_{qg} = \frac{1}{2}(z^2(1-z)^2) \tag{1.47}$$

mit der „+"-Distribution:

$$\int_0^1 dz\frac{f(z)}{(1-z)_+} \equiv \int_0^1 dz\frac{f(z)-f(1)}{1-z} \tag{1.48}$$

Die Partondichten sind in der perturbativen QCD nicht berechenbar, doch kann ihre Abhängigkeit von der Skala $M_f^2$ in den Altarelli-Parisi-Entwicklungsgleichnungen [29] angegeben werden:

$$\frac{d}{d\log M_f^2}q(x, M_f^2) = \frac{\alpha_s}{2\pi}\int_x^1 \frac{dy}{y}\left(q(x, M_f^2)P_{qq}\left(\frac{x}{y}\right) + g(x, M_f^2)P_{gq}\left(\frac{x}{y}\right)\right) \tag{1.49}$$

$$\frac{d}{d\log M_f^2}g(x, M_f^2) = \frac{\alpha_s}{2\pi}\int_x^1 \frac{dy}{y}\left(q(x, M_f^2)P_{gq}\left(\frac{x}{y}\right) + g(x, M_f^2)P_{gg}\left(\frac{x}{y}\right)\right) \tag{1.50}$$

Die Separation der divergenten und endlichen Anteile in den Gleichungen 1.42 und 1.43 ist allerdings nicht eindeutig. Neben der Singularität können auch endliche Terme in den Partondichten absorbiert werden. Die Aufteilung der divergenten und endlichen Terme wird durch das Faktorisierungschema angegeben. Im $DIS$-Schema werden die Koeffizentenfunktionen $R$ in der Gleichung 1.44 so gewählt, daß die Koeffizentenfunktionen $C_2$ in Gleichung 1.42 verschwinden und somit die Gleichung für $F_2$ die gleiche Form hat wie im Quark-Parton-Modell. Im $\overline{MS}$-Schema werden, nachdem die Divergenzen durch die dimensionale Regularisierung parametrisiert wurden, nur die Pole : $1/\varepsilon + \ln 4\pi - \gamma_E$ in die Partondichten absorbiert.

### Jet-Wirkungsquerschnitte in der Ordnung $\alpha_s$

Nach der Renormalisierung der Partondichten ist der inklusive Wirkungsquerschnitt in der Ordnung $\alpha_s$ der perturbativen QCD endlich. Allerdings kann für den Endzustand mit drei auslaufenden Partonen (inklusive dem Protonrest) allein kein endlicher Wirkungsquerschnitt angegeben werden, da die Kompensation der Divergenzen durch die virtuellen Korrekturen zum Wirkungsquerschnitt mit zwei auslaufenden Partonen fehlt. Bei der Integration der Matrixelemente für QCD-Compton und Boson-Gluon-Fusionsprozesse (Gleichung 1.40 und 1.41) über den Zweipartonphasenraum (i. e. Integration über $x_p$ und $z_p$ im Intervall $[0,1]$) kann der Phasenraum auf den Bereich außerhalb der Divergenzen beschränkt werden. Damit wird der sogenannte 2+1-Jetphasenraum definiert[3]. Der verbliebende Teil des Phasenraums definiert die 1+1-Jetregion für die $\mathcal{O}(\alpha_s)$-Bornterme. Zusammen mit den $\mathcal{O}(\alpha_s^0)$-Termen für den Einpartonendzustand ergeben sich dann ebenfalls endliche 1+1-Jetwirkungsquerschnitte. Der 2+1-Jetphasenraum kann über die invariante Masse zweier Partonen $s_{ij}$ wie folgt definiert werden:

$$s_{ij} > y_{cut} W^2 \equiv y_{cut}(p_1 + p_2 + p_3)^2 \quad (i \neq j = 1,2,3). \tag{1.51}$$

Dabei wird mit $p_3$ der Impuls des Protonrestes bezeichnet. Damit ergeben sich folgende Integrationsgrenzen für $x_p$ und $z_p$ [28]:

$$z_p^{min} = \frac{1-x_p}{x_p - x} y_{cut} = 1 - z_p^{max} \tag{1.52}$$

$$x_p^{min} = \frac{x}{1 - 2(1-x)y_{cut}} \tag{1.53}$$

$$x_p^{max} = \frac{x}{x - (1-x)y_{cut}} \tag{1.54}$$

Der 2+1-Jetwirkungungsquerschnitt lautet:

$$\frac{d^2\sigma^{2+1}}{dx dQ^2} = \frac{2\pi\alpha}{xQ^4}\left((1+(1-y)^2)F_2^{2+1\,Jet} - y^2 F_L^{2+1\,Jet}\right) \tag{1.55}$$

mit [28]:

$$\begin{aligned}
F_{2,L}^{2+1\,Jet} &= x\frac{as}{2\pi}\int_{x_p^{min}}^{x_p^{max}} \frac{dx_p}{x_p}\sum_{f=1}^{N_f} e_f^2\left[(q(x/x_p)+\bar{q}(x/x_p))\frac{d\sigma_{2,L}^q}{dx_p} + g(x/x_p)\frac{d\sigma_{2,L}^g}{dx_p}\right] \\
\frac{d\sigma_2^q}{dx_p} &= \frac{4}{3(1-x_p)}\left\{-(1-x_p)\ln\frac{(1-x)x_p y_{cut}}{x_p - x - (1-x)x_p y_{cut}}\right. \\
&\quad \left. +\frac{1}{2}\left(1 - 2\frac{(1-x)x_p y_{cut}}{x_p - x}\right)(1+2x_p-6x_p^2)\right\} \\
\frac{d\sigma_L^q}{dx_p} &= \frac{8}{3}x_p\left(1 - 2\frac{(1-x)x_p y_{cut}}{x_p - x}\right) \\
\frac{d\sigma_2^g}{dx_p} &= 2\left\{[-1+6x_p(1-x_p)]\left(1 - 2\frac{(1-x)x_p y_{cut}}{x_p - x}\right)\right.
\end{aligned}$$

[3] Das +1 in der Ausdruck 2+1-Jet bezieht sich auf den Protonrest

$$-[1-2x_p(1-x_p)]\ln\frac{(1-x)x_p y_{cut}}{x_p-x-(1-x)x_p y_{cut}}\Bigg\}$$

$$\frac{d\sigma_L^g}{dx_p} = 4x_p(1-x_p)\left(1-2\frac{(1-x)x_p y_{cut}}{x_p-x}\right) \qquad (1.56)$$

Die Integration über $x_p$ enthält die Partondichteverteilungen und muß numerisch durchgeführt werden. Die Vorhersagen obiger Rechnungen für die 2+1 Jetrate in dem für diese Analyse relevanten kinematischen Bereich werden in Abschnitt 1.2.3 gezeigt.

**Korrekturen der Ordnung $\alpha_s^2$**

Die Ergebnisse der Rechnungen der störungstheoretischen QCD in fester Ordnung von $\alpha_s$ hängen von der Renormalisierungsskala $\mu^2$ und der Faktorisierungsskala $M_f^2$ ab. Die Skalen verursachen Terme der Form $\ln(\mu^2/M^2)$ und $\ln(M_f^2/M^2)$ in der Störungsreihe [31], wobei $M^2$ eine typische Massenskala des Prozesses ist. Die Skalen $\mu^2$ und $M_f^2$ sollten deshalb in derselben Größenordnung wie $M^2$ liegen. Oft wird für beide Skalen $Q^2$ verwendet, doch sind diese nicht durch die Theorie vorgegeben. Da diese Parameter durch die Renormierung eingeführt wurden und nicht in der ursprünglichen Lagrangedichte vorhanden sind, sollten observable Größen nicht von ihnen abhängen. Allerdings gilt dieses nur, falls die Störungsreihe vollständig aufsummiert wird, was nicht möglich ist. Doch wird erwartet, daß durch Berechnung höherer Ordnungen in $\alpha_s$ der Einfluß dieser Parameter auf die Ergebnisse verringert wird. Um aus dem Vergleich von berechneten Größen mit experimentellen Daten Parameter der QCD, wie $\alpha_s$, zu bestimmen, sollten diese Größen in „next to leading order" Rechnungen vorliegen. Für die 2+1 Jetrate bedeutet dieses, daß Rechnungen bis zur Ordnung $\alpha_s^2$ verwendet werden sollten. Ergebnisse dieser Rechnungen sind in [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37] veröffentlicht worden. In beiden Rechnungen werden Einschleifenkorrekturen zum 1+1- und 2+1 Jetwirkungsquerschnitt bestimmt. Die Jetregionen werden dabei mit dem Aufösungskriterium aus Gleichung 1.51 definiert. In der Ordnung $\alpha_s^2$ ergeben sich ebenfalls Bornterme für die Produktion von 3+1-Partonen im Endzustand. Außerhalb der 3+1-Jetregion ergibt sich daraus ein Beitrag zum 2+1 Jetwirkungsquerschnitt. Berechnungen der $O(\alpha_s^2)$-Korrekturen zum 1+1-Jetwirkungsquerschnitt sind bisher nicht vorhanden. In den Referenzenzen [30, 31, 32, 33] werden die $O(\alpha_s^2)$-Korrekturen zum 2+1 Jetwirkungsquerschnitt für die Kombination $d\sigma_u + d\sigma_L/2$ von unpolarisierten und longitudinal polarisierten Wirkungsquerschnitten berechnet. Der Beitrag des nicht berechneten Anteils an der $O(\alpha_s^2)$-Korrektur wird auf 20% geschätzt, entsprechend dem Anteil dieses Helizitätswirkungsquerschnitts am Gesamtwirkungsquerschnitt auf Bornniveau.

Die Vorhersagen obiger Rechnungen für die 2+1 Jetrate in dem für diese Analyse relevanten kinematischen Bereich werden im folgenden Abschnitt gezeigt.

### 1.2.3 Vorhersagen der QCD-Rechnungen für die 2+1 Jetrate

In diesem Abschnitt werden die Vorhersagen der QCD-Rechnungen für die 2+1 Jetrate in dem kinematischen Bereich gezeigt, in dem die in dieser Analyse verwendeten Daten liegen (siehe Abschnitt 4.3).

In Abbildung 1.3 ist die Abhängigkeit der 2+1 Jetrate von $Q^2$ für die QCD-Rechnungen in erster und zweiter Ordnung von $\alpha_s$ für den kinematischen Bereich $W^2 > 5000\,GeV^2$,

$y < 0.5$ und $y_{cut} = 0.02$ gezeigt. Dabei wird für die Rechnung in erster Ordnung von $\alpha_s$ die Einschleifennäherung für $\alpha_s(\mu^2)$ benutzt und entsprechend die Zweischleifennäherung für die $\alpha_s^2$-Rechnung. Als Renormalisierungsskala und Faktorisierungsskala wird $Q^2$ verwendet, und der Wert von $\Lambda_{\overline{MS}}$ beträgt $341\,MeV$ (für 4 Flavours). Im Bereich kleiner $Q^2$ beträgt der Einfluß der $O(\alpha_s^2)$-Korrekturen ca. 30%.




Abb. 1.3: *Die 2+1 Jetrate bei $y_{cut} = 0.02$ für QCD-Rechnungen in erster (—) und zweiter Ordnung (···) von $\alpha_s$ in Abhängigkeit von $Q^2$, für Ereignisse, die in dem kinematischen Bereich $W^2 > 5000\,GeV^2$ und $y < 0.5$ liegen.*

Der Abhängigkeit der 2+1 Jetrate von einer Renormalisierungsskala $\rho \cdot Q$, mit $0.1 < \rho < 10$, ist in Abbildung 1.4 für die QCD-Rechnungen in erster und zweiter Ordnung von $\alpha_s$ gezeigt. Wie erwartet wird der Einfluß der Renormalisierungsskala durch die $O(\alpha_s^2)$-Korrekturen verringert. Wie in Abbildung 1.5 dargestellt gilt dieses auch für die Faktorisierungsskala.




Abb. 1.4: *Die 2+1 Jetrate bei $y_{cut} = 0.02$ in Abhängigkeit von der Renormaliesierungsskala $\rho \cdot Q$ mit $0.1 < \rho < 10$ für QCD-Rechnungen in erster (—) und zweiter Ordnung (···) von $\alpha_s$:*
*a) für $W^2 > 5000\,GeV^2$, $y < 0.5$ und $10\,GeV^2 < Q^2 < 100\,GeV^2$;*
*b) für $W^2 > 5000\,GeV^2$, $y < 0.5$ und $100\,GeV^2 < Q^2 < 5000\,GeV^2$.*




Abb. 1.5: *Die 2+1 Jetrate bei* $y_{cut} = 0.02$ *in Abhängigkeit von der Faktorisierungsskala* $\rho \cdot Q$ *mit* $0.1 < \rho < 10$ *für QCD-Rechnungen in erster (—) und zweiter Ordnung* $(\cdots)$ *von* $\alpha_s$*:*
*a) für* $W^2 > 5000\,GeV^2$*,* $y < 0.5$ *und* $10\,GeV^2 < Q^2 < 100\,GeV^2$*;*
*b) für* $W^2 > 5000\,GeV^2$*,* $y < 0.5$ *und* $100\,GeV^2 < Q^2 < 5000\,GeV^2$*.*

Die jeweiligen Anteile der gluoninitiierten Ereignisse (Boson-Gluon-Fusion) und quarkinitiierten Ereignisse (QCD-Compton) an der 2+1 Jetrate ist in Abbildung 1.6 in Abhängigkeit von $Q^2$ gezeigt. Bei kleinen $Q^2$ dominieren die gluoninitiierten Prozesse.

Die Ergebnisse der QCD-Rechnungen für die 2+1 Jetrate werden in Abschnitt 8.2 mit den Messungen dieser Analyse verglichen.




Abb. 1.6: *Der Anteil von QCD-Compton-Prozessen und Boson-Gluon-Fusionsprozessen an der 2+1 Jetrate in Abhängigkeit von* $Q^2$*, für Ereignisse, die in dem kinematischen Bereich* $W^2 > 5000\,GeV^2$ *und* $y < 0.5$ *liegen.*

# Kapitel 2

# Monte-Carlo-Modelle und Ereignisgeneratoren

## 2.1 Monte-Carlo-Modelle zur Erzeugung partonischer Endzustände

### 2.1.1 Matrixelemente

Die geeignete Weise, QCD-Effekte in Monte-Carlo-Modelle zu integrieren, ist die Verwendung der exakten Matrixelemente, wie sie in Abschnitt 1.2.2 beschrieben wurden. Gemäß den Jetwirkungsquerschnitten (die, wie in Abschnitt 1.2.2 erläutert, von einem Abschneideparameter abhängen) können die unterschiedlichen partonischen Endzustände „gewürfelt" werden. Die Impulse der Partonen folgen aus den differentiellen Wirkungsquerschnitten. Für die tiefinelastische $ep$-Streuung gibt es zur Zeit allerdings nur Monte-Carlo-Modelle, die Matrixelemente bis zur ersten Ordnung in $\alpha_s$ verwenden.

### 2.1.2 Das Partonschauer-Modell

Eine Alternative zur Beschreibung des hadronischen Endstandes in $ep$-Kollisionen mittels Matrixelementen in fester Ordnung von $\alpha_s$ bildet das Partonschauermodell. Das Partonschauermodell basiert auf QCD-Partonverzweigungen in der „leading logarithm approximation", wobei nur die führenden kollinearen Singularitäten der vollständigen QCD-Rechnug beachtet werden. Innerhalb dieses Modells zerfallen die bei einem harten Prozeß erzeugten Partonen über die Prozesse $q \rightarrow qg$, $q \rightarrow gg$ und $g \rightarrow gg$. Durch iterative Partonverzweigungen lassen sich hadronische Endzustände mit beliebig vielen Partonen beschreiben, während bei QCD Matrixelementen die Anzahl der Partonen durch die $\alpha_s$-Ordnung der Rechnung gegeben ist. Das Partonschauermodell bietet also die Möglichkeit, Prozesse in höherer Ordnung in $\alpha_s$ angenähert zu beschreiben. Allerdings sind aufgrund der kollinearen Näherung in diesem Modell die Vorhersagen für harte QCD-Abstrahlung unter großen Winkeln unsicher. In Abb. 2.1 ist das Partonschauermodell schematisch dargestellt. Es wird unterschieden zwischen Partonschauer im Endzustand, mit Partonverzweigungen nach dem Photonvertex, und Partonschauer im Anfangszustand, mit Partonverzweigungen vor dem Photonvertex. Diese Unterscheidung impliziert eine Vernachlässigung der Interferenzterme und ist nicht eichinvariant. Der Partonschauer im Anfangszustand beginnt mit der Verzweigung eines Partons aus dem Proton mit einer Virtualität nahe Null. Eines der Zerfallsprodukte ist raumartig, während das andere Tochterparton reell oder zeitartig (in diesem Fall kann dieses Parton einen zeitartigen Partonschauer auslösen) gewählt werden kann [1]. Der Zweig mit der raumartigen Virtualität führt zum Photonvertex. Der Hauptbeitrag kommt dabei von der Phasenraumregion, in der raumartige Virtualität monoton zunimmt [6, 50]:

$$p_1{}^2 > p_3{}^2 > p_5{}^2$$

Nach dem Photonvertex ist das auslaufende Quark zeitartig und initiiert den Partonschauer im Endzustand. In diesem Fall ergibt sich aus der Kinematik der Verzweigungen für den Partonschauer im Endzustand, daß die Virtualität in jeder Verzweigungskette abnimmt:

$$p_1'^2 > p_2'^2 > p_4'^2 \quad , \quad p_1'^2 > p_2'^2 > p_5'^2 \quad , \quad p_1'^2 > p_3'^2$$

Im Folgenden werden beide Modelle getrennt dargetellt, wobei sich die Darstellung auf die Lund-Implementation des Modells [51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58] bezieht.




Abb. 2.1: *QCD Prozesse mit Abstrahlung im Anfangs- und Endzustand.*

**Partonschauer im Endzustand**

Die Wahrscheinlichkeit einer Verzweigung des Partons $a$ mit einer virtuellen Masse $m_a > 0$ $a \to bc$ wird näherungsweise durch die Altarelli-Parisi Gleichungen gegeben. Die Wahrscheinlichkeit $P(z, m_a^2)$ für die Verzweigung $a \to bc$, bei einer Virtualität $m_a^2$ des Partons $a$, hat die Form:

$$P_{a\to bc}(z, m_a^2) = \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi}\frac{dm_a^2}{m_a^2}P_{a\to bc}(z)dz \tag{2.1}$$

[1] Damit wird erreicht, daß im Endzustand die Partonen keine raumartige Virtualität besitzen.

mit den Altarelli-Parisi Kernen:

$$P_{q\to qg} = \frac{4}{3}\frac{1+z^2}{1-z}, \tag{2.2}$$

$$dP_{g\to gg} = \frac{6(1-z(1-z^2))^2}{z(1-z)}, \tag{2.3}$$

$$P_{g\to q\bar{q}} = \frac{1}{2}(z^2(1-z)^2). \tag{2.4}$$

Die Variable $z$ gibt die Aufteilung des Viererimpulses zwischen den Zerfallsprodukten an. Das Zerfallsprodukt $b$ erhält den Impulsanteil $z$ und das Zerfallsprodukt $c$ den Impulsanteil $(1-z)$. Die genaue Definition von $z$, die die transversale Entwicklung des Partonschauers bestimmt, ist nicht apriori vorgegeben. In [52] wird:

$$z = \frac{(P+q)p'_2}{(P+q)p'_1} \tag{2.5}$$

(für die erste Verzweigung) für den Partonschauer im Anfangszustand definiert. Im hadronischen Schwerpunktsystem reduziert sich dieses zu $z = \frac{E'_2}{E'_1}$.

Die Wahrscheinlichkeit, daß zwischen $m^2_{min}$ und einer maximalen Virtualität $m^2$ nicht genau eine Verzweigung eintritt, ist gegeben durch:

$$\bar{P}_{a\to bc} = 1 - \int_{m^2_{min}}^{m^2} \frac{dm_a^2}{m_a^2} \int_{z_{min}(m_a^2)}^{z_{max}(m_a^2)} dz \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi} P_{a\to bc}(z) \tag{2.6}$$

Durch Summation über beliebig viele Abstrahlungen exponentiert die Wahrscheinlichkeit für keine Abstrahlung zwischen $m^2_{min}$ und $m^2$ und man erhält den Sudakov-Formfaktor:

$$S(m^2) = exp\left(-\int_{m^2_{min}}^{m^2} \frac{dm^2}{m^2} \int_{z_{min}(m_a^2)}^{z_{max}(m_a^2)} dz \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi} P_{a\to bc}(z)\right) \tag{2.7}$$

Im Rahmen eines Monte-Carlo-Modells kann die Virtualität $m^2$ eines sich verzweigenden Partons mittels eines Zufallszahl $R$ zwischen 0 und 1 über $S_a(m^2) = \frac{S_a(m^2_{max})}{R}$ gefunden werden. Mit der Definition von $z$ in Gleichung (2.5) ergibt sich aus der Kinematik die maximale Virtualität zu $m_{max} = E_1 = W/2$. Die relative Wahrscheinlichkeit für verschiedene Verzweigungen $a \to bc$ ist durch das $z$ Integral:

$$\int_{z_{min}(m^2)}^{z_{max}(m^2)} dz \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi} P_{a\to bc}(z) \tag{2.8}$$

gegeben, während $z$ aus dem Integranden der Gleichung 2.8 folgt. Dieses Verfahren läßt sich iterativ bis zu einem Abbruch bei einer minimalen Virtualität $m^2_{min} \approx 1\,GeV^2$ fortsetzen, unterhalb derer eine Beschreibung der Kaskade mittels perturbativer QCD nicht mehr möglich ist. Durch diesen Abschneideparameter werden ebenfalls die kolliniaren Singularitäten in $z$ abgeschnitten.

### Partonschauer im Anfangszustand

Bei der Vorwärtsentwicklung des Partonschauers im Anfangszustand treten Schwierigkeiten auf, da sich erst bei Abbruch der Kaskade, d.h. bei dem Photonvertex, die Kinematik der harten Wechselwirkung bestimmen läßt. Für ein Monte-Carlo-Modell ist es aber günstiger, die Kinematik des Photonvertex zuerst festzulegen. Durch eine Rückwärtsentwicklung des Partonschauers, beginnend bei der harten Wechselwirkung, läßt sich diese Problematik umgehen.

Ausgangspunkt für die Rückwärtsentwicklung des Partonschauers im Anfangszustand sind die Altarelli-Parisi Entwicklungsgleichungen für die Protonstrukturfunktionen $f_i(x,t)$:

$$df_a(x,t) = \frac{\alpha_s(t)}{2\pi} dt \sum \int_{x_{min}}^{x_{max}} \frac{dx'}{x} f_a(x',t) P_{a\to bc}\left(\frac{x}{x'}\right), \tag{2.9}$$

die die Wahrscheinlichkeit ausdrücken, daß während einer kleinen Zunahme von $dt$, wobei $t = \frac{lnQ}{\Lambda}$, ein Parton $a$ mit Impulsanteil $x'$ in ein Parton $b$ mit Impulsanteil $x = zx'$ und ein Parton $c$ mit $x' - x = (1-z)x'$ aufgelöst wird. Umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit, daß während einer Verminderung $dt$ ein Parton $b$ in ein Parton $a$ „unaufgelöst" wird, gegeben durch:

$$dP_b = \frac{df_b(x,t)}{f_b(x,t)} = |dt| \frac{\alpha_s(t)}{2\pi} \sum \frac{dx'}{x'} \frac{f_a(x',t)}{f_a(x,t)} P_{a\to bc}\left(\frac{x}{x'}\right) \tag{2.10}$$

Durch Aufsummation der Beiträge vieler kleiner Änderungen $dt$ exponentiert die Wahrscheinlichkeit für keine Abstrahlung zwischen $t$ und $t_{max}$:

$$S_b(x, t_{max}, t) = exp\left(-\int_t^{t_{max}} dt' \frac{\alpha_s(t)}{2\pi} \sum \frac{dx'}{x'} \frac{f_a(x',t)}{f_a(x,t)} P_{a\to bc}\left(\frac{x}{x'}\right)\right) \tag{2.11}$$

Aus diesem modifizierten Sudakov-Formfaktor kann, ebenso wie aus dem entsprechendem Sudakov-Formfaktor für Abstrahlung im Endzustand, in einem iterativen Monte-Carlo-Verfahren $t$, die Partonart und die Aufspaltungsvariable $z$ für die verschiedenen Aufspaltungen erhalten werden. Gegenüber dem Sudakov-Formafaktor für Abstrahlung im Endzustand gehen hier die Protonstrukturfunktionen ein, da die Wahrscheinlichkeit für ein Parton $b$, aus der Verzweigung eines Partons $a$ zu stammen, proportional der Anzahl der Partonen $a$ im Proton ist. Dadurch wird der Partonschauer im Anfangszustand relativ zu dem Partonschauer im Endzustand unterdrückt. Die Partonschauerentwicklung wird ebenfalls bei einem $t_{min} \approx 1\,GeV$ abgebrochen.

Für die Aufspaltungsvariable $z$ wird in [52] $z = \frac{(p_1+q)p_1}{(p_3+q)p_3}$ definiert. Dadurch wird sichergestellt, daß das Bjorken $x$, $x = \frac{Q^2}{2Pq}$, des Ereignisses nicht durch die Rückwärtsentwicklung des Partonschauers verändert wird und alle $z_i$ innerhalb der Kaskade, die über die Protonstrukturfunktionen in den Sudakov-Formfaktor eingehen, einen Wert kleiner eins besitzen.

### Die Skala der maximalen Virtualität

Die Skala der maximalen Virtualität des Partons vor ($t_{max}$) und nach ($m_{max}$) dem Photonvertex ist aufgrund der Phasenraumgrenze durch $W^2/4$ gegeben. Sowohl die Anzahl der abgestrahlten Partonen wie auch deren Energie hängen von diesem Parameter ab. Doch ist besonders für Ereignisse mit kleinem $x$ diese Skala als zu hoch anzunehmen ,weil die hadronische Schwerpunktsenergie größtenteils vom Protonrest davongetragen wird und diese somit nicht voll für Partonabstrahlung zur Verfügung steht. In den Partonschauermodellen wird deshalb die maximale Virtualität als freier Parameter behandelt. Dieser Parameter sollte entsprechend der Skala des harten QCD-Subprozesses gewählt werden. Gegenüber $e^+e^-$-Wechselwirkungen, wo diese Skala eindeutig durch $Q^2$ gegeben ist, können in der $ep$-Streuung sowohl $Q^2$ als auch $W^2$ sowie eine Funktion beider als maximal erlaubte Virtualität gewählt werden. Beide Größen sind durch die Gleichung:

$$W^2 = m_P^2 + Q^2 \left(\frac{1-x}{x}\right) \approx Q^2 \left(\frac{1-x}{x}\right) \tag{2.12}$$

verbunden. Aus dieser Gleichung folgt, daß im $x$-Bereich zwischen $10^{-4}$ und $10^{-2}$, in dem der größte Anteil der ersten untersuchten tief inelastischen Ereignisse bei HERA liegt, die beiden Skalen sich um einen Faktor $10^{-4}$ bis $10^{-2}$ unterscheiden.

### Kohährenzeffekte

Interferenzeffekte führen bei „leading log"-Partonschauern zu einer Verminderung der Abstrahlung niederenergetischer Gluonen in bestimmten Bereichen des Phasenraums. Diese Korrekturen können dadurch berücksichtigt werden, daß der Phasenraum für die Partonabstrahlung auf den Bereich beschränkt wird, in dem für die Winkel $\theta_i$ der abgestrahlten Partonen gilt [59, 60] („angular ordering"):

$$\theta_1 > \theta_2 > \theta_3 > ... > \theta_n.$$

Schleifenkorrekturen zum „leading log"-Partonschauer ergeben, daß das geeignete Argument für die laufende Kopplungskonstante $\alpha_s$ nicht $Q^2$ sondern $k_T = (1-z)Q^2$ ist (für raumartige Schauer) [61]. Für eine Verzweigung $a \to bc$ mit masselosen Partonen $a$ und $c$ und $Q^2 = m_b^2$ kann $k_T$ als Transversalimpuls der Verzweigung aufgefaßt werden, falls für $z = E + p_z$ gewählt wird. Für zeitartige Schauer wird als Argument von $\alpha_s$ $k_T^2 = z(1-z)Q^2$ gewählt [62]. Dieses kann für $Q^2 = m_a^2$ und $m_b = m_c = 0$ ebenfalls als Transversalimpuls interpretiert werden.

### Matrixelemente + Partonschauer

Wie bereits erwähnt, gilt die „leading-log"-Nährung für die Abstrahlung niederenergetischer und kollinearer Partonen. Dagegen wird die Abstrahlung hochenergetischer Partonen unter großen Winkeln möglicherweise in dieser Nährung falsch beschrieben. Für diese Prozesse ist deshalb eine Beschreibung mit Hilfe der korrekten Matrixelemente vorzuziehen. Prozesse in höherer Ordnung in $\alpha_s$ können dann dadurch berücksichtigt werden, daß die Beschreibung mit Matrixelementen und das Partonschauermodell kombiniert werden. Im Rahmen einer Monte-Carlo-Simulation kann mit einer harten Abstrahlung gemäß des Matrixelements (in erster Ordnung von $\alpha_s$) begonnen werden, und anschließend können „weichere" Abstrahlungen unter Benutzung des Partonschauermodells vorgenommen werden. Um im Partonschauermodell die Abstrahlung zu beschreiben, die „weicher" ist als diejenige, die durch den Matrixelementansatz beschrieben wird, muß eine geeignete Skala für die maximale Virtualität gewählt werden. Im Monte-Carlo-Generator LEPTO 6.1

(siehe Abschnitt 2.3) wird diese Skala für unterschiedliche Ereignistopologien wie folgt festgelegt:

- Ergibt das Matrixelement für ein generiertes Ereignis keine Abstrahlung oberhalb des Abschneidewertes $yW^2$, so wird dieser Abschneidewert für die maximale Virtualität des Partonschauers benutzt, um eine Doppelzählung der harten Abstrahlung zu vermeiden.

- Findet eine Abstrahlung statt, so definiert die invariante Masse der beiden Partonen die Skala der maximalen Virtualität für den Partonschauer im Endzustand.

  Für den Partonschauer im Anfangszustand wird die maximale Virtualität durch die Masse des Quarkpropagators vor dem Photonvertex gegeben. Dieser kann aus den Vierervektoren des Photons und eines der beiden auslaufenden Partonen berechnet werden. Welches der beiden Partonen für die Berechnung zu nehmen ist, hängt von dem zu Grunde liegenden Feynmangraph ab. Da sowohl bei dem QCD-Comptonprozeß wie auch bei der Boson-Gluon-Fusion jeweils zwei Graphen kohährent zum Wirkungsquerschnitt beitragen, ist diese Berechnungsvorschrift nicht eindeutig. In LEPTO 6.1 wird diese Rechnung für beide auslaufende Partonen durchgeführt und das Maximum beider Ergebnisse als Skala verwendet. Die Auswirkung dieser Unsicherheit auf die Vorhersagen dieses Modells für die Jetproduktion wird in Abschnitt 2.4 untersucht.

### 2.1.3 Das Farbdipolmodell

Die Grundlage des Farbdipolmodells (CDM) [63, 64, 65] ist die Betrachtung der Gluonabstrahlung in $e^+e^-$-Kollision, die in der Ordnung $\alpha_s^1$ durch folgende Gleichung gegeben ist:

$$d\sigma_{q\bar{q}} = \frac{2\alpha_s}{3\pi}\frac{x_q^2 + x_{\bar{q}}^2}{(1-x_q)(1-x_{\bar{q}})}dx_q dx_{\bar{q}} \tag{2.13}$$

mit

$$x_i = \frac{2E_i}{W_{Dipol}}. \tag{2.14}$$

Dieses kann als Abstrahlung eines Farbdipols zwischen $q$ und $\bar{q}$ aufgefaßt werden. Die Abstrahlung eines weiteren Gluons läßt sich näherungsweise beschreiben als Abstrahlung von zwei unabhängigen Dipolen, nämlich zwischen Quark und Gluon und zwischen Gluon und Antiquark. Im Farbdipolmodell werden auch weitere Abstrahlungen in gleicher Weise beschrieben. Neben Abstrahlung von $q\bar{q}$- Dipolen gibt es Abstrahlung von $qg\,(\bar{q}g)$ und $gg$- Dipolen mit den Wirkungsquerschnitten:

$$d\sigma_{qg} = \frac{3\alpha_s}{4\pi}\frac{x_q^2 + x_g^2}{(1-x_q)(1-x_g)}dx_q dx_g \tag{2.15}$$

$$d\sigma_{gg} = \frac{3\alpha_s}{4\pi}\frac{x_g^2 + x_g^2}{(1-x_g)(1-x_g)}dx_g dx_g \tag{2.16}$$

Um auch den Prozeß $g \to Q\bar{Q}$ in das Modell einzufügen, wird als Richtschnur der Wirkungsquerschnitt für den Prozeß $e^+e^- \to q\bar{q}Q\bar{Q}$ betrachtet. Für eine kleine invariante

Masse des $Q\bar{Q}$-Paares kann er in die zwei Teile $e^+e^- \rightarrow qg\bar{q}$ und $qg\bar{q} \rightarrow q\bar{q}Q\bar{Q}$ aufgespalten werden, wobei der erste Teil durch Gleichung 2.13 beschrieben wird. Im Farbdipolmodell wird der zweite Teil in zwei gleiche Anteile der Dipole $qg$ und $g\bar{q}$ aufgespalten:

$$d\sigma_{qg\rightarrow qQ\bar{Q}} = \frac{3\alpha_s}{8\pi}\frac{(1-x_Q)^2+(1-x_{\bar{Q}})^2}{1-x_q}dx_q dx_{\bar{Q}} \tag{2.17}$$

Aufeinander folgende Dipole werden in $p_\perp$ geordnet:

$$p_{\perp 1}^2 > p_{\perp 1}^2 > p_{\perp 3}^2 > ...$$

Dabei gilt:

$$p_\perp^2 = W_{Dipol}^2(1-x_q)(1-x_{\bar{q}})$$

für $q\bar{q}$-Dipole und entsprechende Gleichungen für die anderen Dipole. Als Argument für die laufende Kopplungskonstante $\alpha_s$ wird ebenfalls $p_\perp^2$ gewählt. Für die Wahrscheinlichkeit der Abstrahlung eines Gluons von einem $q\bar{q}$-Dipol bei einer Skala $p_\perp^2$ ergibt sich dann:

$$\frac{dP(p_\perp^2,y)}{dp_\perp^2 dy} = \frac{d\sigma_{q\bar{q}}(p_\perp^2,y)}{dp_\perp^2 dy} exp - \int_{p_\perp^2}^{p_{\perp max}^2}\int_{y_{min(k_\perp)}}^{y_{max(k_\perp)}} dk_\perp^2 dy' \frac{d\sigma_{q\bar{q}}(k_\perp^2,y')}{dk_\perp^2 dy'} \tag{2.18}$$

mit

$$y = \frac{1}{2}ln\left(\frac{1-x_q}{1-x_{\bar{q}}}\right), \tag{2.19}$$

was angenähert der Rapidität des abgestrahlten Gluons entspricht. Dabei gibt der zweite Faktor (Sudakov-Formfaktor) die Wahrscheinlichkeit an, keine Abstrahlung bei einer höheren Skala $p_\perp^2$ zu haben. Entsprechende Gleichungen ergeben sich für die anderen Dipole, wobei bei der Aufspaltung eines $qg$-Dipols in ein $Q\bar{Q}$-Paar der konkurierende Prozeß der Gluonabstrahlung beachtet werden muß. Für den verfügbaren Phasenraum gilt:

$$|y| < ln\left(\frac{W}{p_\perp}\right)$$

was als ein Dreick in der $(ln(p_\perp^2, y))$-Ebene dargestellt werden kann.

In der tief inelastischen Elektron-Proton-Streuung wird der führende Dipol von dem gestreuten Quark und dem Protonrest gebildet. Dabei wird der Protonrest als ausgedehntes Objekt betrachtet, was für die Dipolabstrahlung bedeutet, daß durch Interferenzeffekte effektiv nur ein Teil der Protonrestes mit einer transversalen Ausdehnung proportional zur abgestrahlten Wellenlänge $\lambda \approx 1/p_\perp$ an der Abstrahlung teilnimmt. Im Farbdipolmodell wird dieser Effekt dadurch berücksichtigt, daß nur der Anteil $a$:

$$a = \left(\frac{\mu}{p_\perp}\right)^\alpha \tag{2.20}$$

an der Abstrahlung mit dem Transversalimpuls $p_\perp$ teilnimmt. Dabei beschreibt $\mu$ die inverse Ausdehnung und $\alpha$ die Dimension des Protonrestes. Dieses führt zu einer Einschränkung des zur Verfügung stehenden Phasenraumes:

$$ln\left(\frac{p_\perp^{\alpha+1}}{W\mu^\alpha}\right) < y \tag{2.21}$$

Dadurch ergibt sich für den maximalen Transversalimpuls:

$$p_{\perp max} \sim (W^2 \mu^\alpha)^{1/(\alpha+2)} \tag{2.22}$$

Diese Einschränkung des Phasenraumes kann mit der entsprechenden Einschränkung des Phasenraumes durch den Sudakov-Formfaktor für den Partonschauer im Anfangszustand verglichen werden.

Das Farbdipolmodell erfordert nicht die Aufteilung in Abstrahlung vom Anfangszustand und Abstrahlung im Endzustand. Es werden automatisch Kohährenzeffekte berücksichtigt (die Ordnung in $p_\perp$ impliziert eine Ordnung in den Öffnungswinkeln der Abstrahlung). Allerdings fügt sich der Prozeß $g \to Q\bar{Q}$ nicht auf einfache Weise in das Modell ein. Für die $ep$-Steuung bedeutet dieses, daß die Boson-Gluon-Fusion, bei der die auslaufenden Quarks ein hohes $p_\perp$ und das $Q\bar{Q}$-Paar eine große invariante Masse haben können, im Farbdiplomodell nicht richtig beschrieben wird.

## 2.2 Fragmentationsmodelle zur Erzeugung hadronischer Endzustände

Da die Störungstheorie der QCD nur Produktion von, gemäß des confinement unbeobachtbaren, Quarks und Gluonen beschreibt, müssen phänomenologische Nährungen benutzt werden, um den hadronischen Endzustand zu beschreiben. Ein in vielen Monte-Carlo-Generatoren verwendetes Modell ist das Lund-String-Modell. In diesem Abschnitt wird sowohl auf dieses Modell, wie auch auf das Modell der unabhängigen Fragmentation von Feynman und Field und auf das Cluster-Modell von Marchesini und Webber eingegangen.

Der Einfluß der verschiedenen Fragmentationsmodelle bzw. deren Pararmeter auf die Jetmultiplizitäten wird in Abschnitt 6.1.1 untersucht.

### 2.2.1 Unabhängige Fragmentation

Dem Modell der unabhängigen Fragmentation [66] liegt kein physikalisch motiviertes Modell für den Übergang Partonen→Hadronen zugrunde. Es ist vielmehr ein einfaches rekursives Schema, in dem die Partonen unabhängig voneinander betrachtet werden.

Ausgangspunkt der Fragmentation ist ein primäres Quark $q$, das ein Quark-Antiquarkpaar $q_1\bar{q}_1$ erzeugt und sich mit dem Antiquark $\bar{q}_1$ zu einem Meson $q\bar{q}_1$ verbindet. Die Aufteilung von Energie und Impuls zwischen dem Quark $q$ und diesem Meson wird durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung $f(z)$ gegeben, wobei $z$ der Anteil des Mesons ist und $(1-z)$ der des verbliebenen Quarks $q_1$. Dieses Verfahren kann, nun ausgehend von $q_1$, iterativ mit der gleichen Form von $f(z)$ fortgesetzt werden. Die Größe $z$ wird dabei interpretiert als

$$z = \frac{E + p_{||\ Hadron}}{E + p_{||\ Quark}} \tag{2.23}$$

Diese Größe ist lorentzinvariant in Richtung des Impulses des ursprünglichen Quarks. Für die Fragmentations-Punktion $f(z)$ haben Field und Feynman die Form

$$f(z) = 1 - a + 3a(1-z)^2 \tag{2.24}$$

vorgeschlagen, wobei für $a$ aus experimentellen Daten ein Wert von $a \approx 0.88$ ermittelt wurde. Aus einer Anpassung an Messdaten wird für die Erzeugung der verschiedenen Flavour ein Verhältnis von:

$$u : d : s : c = 1 : 1 : 0.3 : 10^{-11} \tag{2.25}$$

gewählt. Allerdings wird für die Beschreibung der Fragmentation schwerer Quarks eine härtere Fragmentations-Funktion benötigt, die nach Peterson et al. [67] wie folgt gewählt werden kann:

$$f(z) \sim \frac{1}{z\left(1 - \frac{1}{z} - \frac{\epsilon}{1-z}\right)^2} \tag{2.26}$$

mit $\epsilon = (m_0/m_Q)^2$, wobei $m_0$ eine Referenzmasse ist und $m_Q$ die Masse des schweren Quarks. Die Produktion von Baryonen kann in diesem Modell durch die Erzeugung von Diquark-Antidiquark-Paaren, statt $q\bar{q}$ Paaren, eingeführt werden. Eine Diquark-Antidiquark-Produktionsrate von 10% bezüglich der $q\bar{q}$ Rate reproduziert das aus Meßdaten bestimmte Verhältnis von Baryonen zu Mesonen. Bei der Fragmentation erhält das Quark einen Transversalimpuls $p_t$ bzw. das Antiquark einen Transversalimpuls $-p_t$, deren Größen durch eine Gaußverteilung bestimmt werden. Mit einer Breite der Gaußverteilung von $\sigma = 350\, MeV$ ergibt sich eine Transversalimpuls-Verteilung der erzeugten Mesonen, die mit den Meßdaten annähernd übereinstimmt.

Im Rahmen der unabhängigen Fragmentation gibt es kein einheitliches Verfahren, die Fragmentation von Gluonen zu beschreiben. Eine Möglichkeit besteht darin, Gluonen wie Quarks mit zufällig ausgewähltem Flavour zu behandeln. Da erwartet wird, daß Gluonen weicher fragmentieren, muß dann eine unabhängige Fragmentations-Funktion gewählt werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, das Gluon gemäß der Altaralli-Parisi Aufspaltungs-Funktion:

$$P_{g\rightarrow q\bar{q}} = \frac{1}{2}(z^2 + (1-z)^2) \tag{2.27}$$

mit $z = \frac{E_q}{E_g}$ in ein Quark-Antiquarkpaar $q\bar{q}$ aufzuspalten.

Das Modell der unabhängigen Fragmentation ist nicht lorentz-invariant; die Fragmentation wird im hadronischen Schwerpunktsystem ausgeführt. Da aus einem einzelnen masselosen Quark ein massiver Jet erzeugt wird, wird bei der Fragmentation die Energie- und Impulserhaltung verletzt und muß anschließend durch Einführung von Skalierungsfaktoren wiederhergestellt werden. Weiterhin kann der von JADE beobachtete „String-Effekt" [68, 69] nicht reproduziert werden. Ein weiteres Problem des Modells der unabhängigen Fragmentation besteht in der Behandlung zum ursprünglichen Quark kollinearer Partonen, wie sie im Partonschauerbild auftreten. Bei der unabhängigen Fragmentation ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse für die Teilchenmultiplizität nach der Fragmentation eines einzelnen Quarks und für die Teilchenmultiplizität dieses Quarks, nachdem sich dieses in mehere annäherend kollineare Partonen aufspaltet. Daraus folgt eine Sensitivität der unabhängigen Fragmentation gegenüber dem Abschneideparameter im Partonschauermodell [70].

### 2.2.2 Fragmentation durch Clusterzerfall

Das Modell der Fragmentation durch Clusterzerfall [71] wird im Zusammenhang mit dem Partonschauer-Modell von Webber und Marchesini [72, 73] verwendet. Die Fragmentation verläuft in drei Schritten :

- Erzwungener Zerfall von Gluonen in Quark-Antiquark-Paare und Erzeugung von farbneutralen Clustern durch die im Partonschauer entstandenen Quarks- und Antiquarks (Preconfinement).
- Zerfall schwerer Cluster mit einer Masse größer als $M_{Clus.}^{max}$ in zwei kleinere Cluster.
- Zerfall der Cluster in Hadronen.

Der Zerfall in Hadronen verläuft dabei über einen isotropen Zweikörper-Zerfall, dessen Zerfallsraten durch die Dichte der Zustände, i.e. Phasenraum und Spinfaktor, bestimmt werden. Da isotroper Zweikörper-Zerfall für schwere Cluster unrealistisch ist, wird der oben erwähnte zweite Schritt vorgenommen. Durch den Zerfall eines Clusters mit dem Flavour $f_1\bar{f}_2$ entstehen, nach der zufälligen Wahl eines dritten Flavours $f$, die Zufallsprodukte $f_1\bar{f}$ und $f\bar{f}_2$. Bottom- und Topquarks zerfallen über die schwache Wechselwirkung bevor die Cluster gebildet werden, d.h. die Cluster enthalten nur u, d, s, oder c-Quarks. Die Erzeugung von Baryonen läßt sich in diesem Modell durch Aufspaltung der Gluonen in Diquark-Antidiquark-Paare statt in Quark-Antiquark-Paare einführen. Der transversale Impuls, der bei der Fragmentation entsteht, wird in diesem Modell ohne Einführung weiterer Parameter durch die mittlere im Cluster-Zerfall freiwerdende Energie bestimmt.

Die Fragmentation durch Cluster-Zerfall ist explizit lorentz-invariant. Ein Problem besteht in der Abstrahlung weicher Gluonen, da auch sehr niederenergetische Gluonen das Preconfinement (Bilden der Cluster) abändern und die Fragmentation beeinflussen können [70].

Das Modell der Fragmentation durch Cluster-Zerfall benötigt keine phänomenologischen Parametrisierungen wie die Fragmentations-Funktion und wenig an Meßdaten angepaßte Parameter. Da dieses Fragmentationsmodell im Zusammenhang mit dem Partonschauermodell von Webber und Marchesini benutzt wird, verlagert sich eine Beschreibung des Stringeffektes auf das Partonschauermodell, wo dieser Effekt durch Interferenz weicher Gluonen erzeugt wird [74].

### 2.2.3 String-Fragmentation

In der Quantenchromodynamik wird für große Abstände ein lineares Confinement erwartet. Dieses ist der Ausgangspunkt des String-Fragmentations-Modells [75]. Im String-Modell wird ein Farbfeld (String) zwischen „farbigen" Partonen als Farbflußröhre ohne transversalen Freiheitsgrad aufgefaßt. Die Energie, die in einem String enthalten ist, ist proportional zur Länge $l$:

$$U = \kappa l \ , \tag{2.28}$$

wobei die Stringkonstante $\kappa$ durch Hadron-Massenspektroskopie zu $\kappa \approx 1\,GeV/fm \approx 0.2\,GeV^2$ bestimmt wurde. Die Kinematik der Stringfragmentation kann für das Beispiel eines Quark-Antiquark-Paares $q_0\bar{q}_0$, das bei $x = t = 0$ erzeugt wird, erläutert werden.

Während Quark und Antiquark in entgegengesetzte Richtung auseinanderlaufen, erhöht sich die Energie im String, bis er in einem Punkt $(x_1, t_1)$ durch Erzeugung eines $q_1\bar{q}_1$ Paares aufbricht (typischerweise bei einem Abstand von $2 - 5\,fm$), sodaß das System in zwei Farbsingulet-Systeme $q_0\bar{q}_1$ und $q_1\bar{q}_0$ aufgespalten wird. Ist die invariante Masse der einzelnen Systeme groß genug, finden weitere Aufspaltungen statt.

Quarks mit Masse und/oder Transversalimpuls müssen klassisch mit einem Abstand erzeugt werden, sodaß die Feldenergie zwischen Quark und Antiquark in die transversale Masse $m_\perp = \sqrt{m^2 + p_\perp^2}$ umgewandelt werden kann. Quantenmechanisch können Quark und Antiquark in einem Punkt erzeugt werden und in den klassisch erlaubten Bereich tunneln mit der Tunnelwahrscheinlichkeit

$$exp(-\pi m_T^2/\kappa) = exp(-\pi m^2/\kappa)\, exp(-\pi p_T^2/\kappa). \tag{2.29}$$

Diese Aufspaltung von Masse und Transversalimpuls führt zu einem Flavour-unabhängigen $p_\perp$ mit einer Gaußverteilung mit $< p_\perp >= \sigma^2 = \kappa/\pi$. Hadronen erhalten Transversalimpuls von zwei Quark-Antiquark-Paaren und haben somit einen mittleren Transversalimpuls von $< p_\perp >= 2\sigma^2$. Allerdings wird bei der String-Fragmentation für die Transversalimpulsverteilung eine Gaußverteilung mit $\sigma \approx 350\,MeV$ eingeführt, um eine mit Meßdaten verträgliche Verteilung zu erhalten

Obige Formel impliziert ebenfalls die Unterdrückung schwerer Quarks mit $u : d : s : c = 1 : 1 : 0.3 : 10^{-11}$. Baryonproduktion kann in das Modell eingeführt werden, indem zusätzlich zu Quark-Antiquark-Paaren auch Diquark-Antidiquark-Paare im Feld erzeugt werden. Mit einer geeignet angepaßten Diquarkmasse kann das Verhältnis von Quark zu Diquarkproduktion auf die aus Meßdaten bestimmte Größe von $qq : q \approx 0.09 : 1$ gebracht werden.

Die longitudinale Fragmentation wird durch die Fragmentationsfunktion $f(z)$ bestimmt:

$$f(z) = \frac{(1-z)^a}{z}\, exp\left(\frac{-bm_\perp^2}{z}\right) \tag{2.30}$$

mit

$$z = \frac{E + p_{||\ Hadron}}{E + p_{||\ Quark}}$$

Mit dieser Fragmentationsfunktion kann Links-Rechts Symmetrie erreicht werden, d.h. die Fragmentation ist unabhängig davon, ob man mit der Stringaufspaltung beim Quark oder beim Antiquark beginnt.

Gluonen werden im Modell der Stringfragmentation als Anregung behandelt und lassen sich als „Knick" auf dem String darstellen. Hat das Gluon ausreichend Energie, entstehen entlang der Stringstücke $q\bar{q}$-Paare, sodaß der „Knick" auf ein Feldsegment isoliert wird. Dieses Segment muß die Masse eines physikalischen Teilchens haben. Die verbliebenen Stringsegmente sind nun relativ zum Schwerpunktsystem des $q\bar{q}g$-System in Bewegung und fragmentieren in ihrem eigenen Schwerpunktsystem. Dieses führt zu einer Asymmetrie der Teilchendichte zwischen Quark-Quark und Quark-Gluon-Jets („String-Effekt").

Im String-Fragmentationsmodell bleiben an jeder Stelle des Fragmentationsprozesses Energie, Impuls und Flavour erhalten. Die Fragmentation ist lorentz-invariant.

Die wesentlichen freien Parameter im String-Fragmentationmodell sind die beiden Parameter $a$ und $b$ in der Fragmentationsfunktion und die Breite der Transversalimpulsverteilung.

### 2.2.4 Der Protonrest

In $e^+e^-$- Reaktionen besteht der Anfangszustand aus punktförmigen Teilchen ohne innere Struktur. Die innere Struktur des Protons in $ep$-Reaktionen wird, neben der Beschreibung durch die Partonstrukturfunktionen, in den oben beschriebenen QCD-Modellen durch Einführung zusätzlicher phänomenologischer Größen berücksichtigt.

Für die Fermibewegung der im Proton gebundenen Partonen wird eine gaußförmige Transversalimpulsverteilung $k_t$ der Partonen eingeführt. Dieses führt zu einem Transversalimpuls des Protonrestes und somit zu einem zusätzlichen Transversalenergiefluß. Für Lepton-Nukleon-Reaktionen mit kleineren Schwerpunktsenergien als bei HERA hängt der beobachtbare hadronische Endzustand sensitiv von diesem Parameter ab. Der Einfluß dieser Größe für die Jetratenbestimmung bei HERA-Energien wird in Abschnitt 6.1.3 untersucht.

Die Behandlung des Protonrestes ist nur im einfachsten Fall eindeutig, in dem ein Valenzquark von dem Boson aus dem Proton „herausgeschlagen" wird. In diesem Fall besteht der Protonrest aus einem Diquark. Wird ein Seequark oder ein Gluon getroffen, ist das System des Protonrestes komplizierter und wird in den verschiedenen QCD-Modellen unterschiedlich behandelt. In den Monte-Carlo-Generatoren (siehe Abschnitt 2.3) LEPTO und ARIADNE, die für die Hadronisierung die Stringfragmentation verwenden, werden komplexe Protonrest-Systeme wie folgt behandelt:

- Wird ein Seequark getroffen, so besteht der Protonrest aus dem 4-Quark-System $q_v q_v q_v \bar{q}_s$. Für $\bar{q}_s = \bar{u}$ oder $\bar{d}$ wird das Seeantiquark gegen ein entsprechendes Valenzquark vernichtet, sodaß der Protonrest wieder aus einem Diquark besteht. Für andere Quark-Flavours $\bar{q}_s$ wird dieses mit einem Valenzquark zu einem Meson ($M = q_v \bar{q}_s$) verbunden. Dieses Meson erhält einen Anteil $z$ des Protonrestimpulses ($z = E - p_z$) in Protonrichtung gemäß einer Wahrscheinlichkeitsverteilung $P(z)$ und einen Transversalimpuls $p_\perp$ gemäß einer Gaußverteilung mit der Breite $\sigma_{p_\perp}$. Das verbliebene Diquark mit Longitudinalimpuls $1-z$ und Transversalimpuls $-p_\perp$ bildet mit dem getroffenen Quark einen String, und der in Abschnitt 2.2.3 beschriebene Hadronisierungsprozeß beginnt.

- Wird ein Antiseequark getroffen, besteht der Protonrest aus $q_v q_v q_v q_s$ und seine Behandlung erfolgt analog zu dem oben beschriebenen Fall. Das Quark ($q_s$) wird mit zwei Valenzquarks zum Baryon $q_v q_v q_s$ verbunden, und das Stringsystem wird mit dem verbliebenen Quark gebildet.

- In Boson-Gluon-Fusionsereignissen hinterläßt das vernichtete Gluon die drei Valenzquarks in einem Farboktett-Zustand. Dieser wird in ein Quark und ein Diquark aufgespalten mit der oben beschriebenen Aufteilung des Transversalimpulses und einer Transversalimpulsverteilung $p_\perp$.

Der Einfluß der Parameter $P(z)$ und $\sigma_{p_\perp}$ in dieser Behandlung des Protonrestes wird in Abschnitt 6.1.3 untersucht.

Eine andere Behandlung des Protonrestes wird in dem Monte-Carlo-Generator HERWIG (siehe Abschnitt 2.3) vorgenommen. Die in diesem Generator verwendete Clusterfragmentation kann wahlweise durch ein sogenanntes „soft underlying event" (SUE) erweitert werden. Zur Erzeugung des SUE wird der Cluster, der den Protonrest enthält, in kleinere Cluster aufgespalten, bis sich durch den anschließenden Zerfall der Cluster eine vorgegebene Teilchenmultiplizität ergibt. Die Teilchenmultiplizität wird dabei aus Parametrisierungen der von inelastischen $p\bar{p}$-Reaktion beobachteten Teilchenmultiplizitäten abgleitet. Durch dieses Verfahren werden zusätzlich Hadronen mit kleinem $p_\perp$ erzeugt. Der Einfluß des SUE auf die Bestimmung von Jetraten wird ebenfalls in Abschnitt 6.1.3 untersucht.

## 2.3 Ereignisgeneratoren

In diesem Abschnitt werden die Generatoren vorgestellt, in denen die oben beschriebenen QCD- und Fragmentationsmodelle implementiert sind. Dann werden die Vorhersagen der Generatoren für die Multijetproduktion gezeigt. Die Parameter der Generatoren sind, soweit nicht explizit erwähnt, auf die vorgegebenen Werte gesetzt. Ein Vergleich der Vorhersagen der Generatoren für die Jetraten mit den Messungen wird in Abschnitt 8.2 vorgestellt.

### 2.3.1 LEPTO

Der Monte-Carlo-Generator LEPTO (in der Version 6.1) [76] generiert Ereignisse in der tief inelastischen Lepton-Nukleon-Streuung gemäß dem elektroschwachen Wirkungsquerschnitt in führender Ordung der Kopplungskonstanten. QCD-Effekte werden in drei verschiedenen Optionen berücksichtigt:

**Partonschauer (PS):** Das Partonschauermodell mit Abstrahlung im Anfangs-(IPS) und Endzustand (FPS) wird, wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, verwendet um QCD-Effekte in der „leading logarithmic approximation" zu implementieren. Als Skala der maximalen Virtualität sind verschieden Möglichkeiten vorhanden:

1. Die Skala $Q^2$
2. Die Skala $W^2$
3. Die Skala $W^2 \cdot Q^2$
4. Die Skala $Q^2(1-x)$
5. Die Skala $Q^2(1-x)\, max\,(1, ln\frac{1}{x})$
6. Die Skala $W^{4/3}$ analog zum Farbdipolmodell

Die Skala $Q^2(1-x)\, max\,(1, ln\frac{1}{x})$ ist dabei durch die exakten Matrixelemente motiviert, aus denen sich für die Partonen ein Transversalimpulsspektrum $< p_\perp > \approx Q^2(1-x)$ für $x \to 1$ und $< p_\perp > \approx Q^2 \ln(1/x)$ für $x \to 0$ ergibt [25]. QCD-Kohärenzeffekte werden nur im Endzustandspartonschauer durch Ordnung der Abstrahlungswinkel berücksichtigt (Abschnitt 2.1.2).

**Matrixelemente (ME):** Als weitere Option besteht die Möglichkeit, die Matrixelemente in erster Ordnung der QCD zur Ereignisgenerierung zu verwenden. Die Matrixelemente der zur Ordnung $\alpha_s^1$ hinzukommenden Prozesse der Quark- oder

Gluonabstrahlung ($q\bar{q}$- und $qg$-Ereignisse) beinhalten drei weitere Freiheitsgrade im differentiellen Wirkungsquerschnitt :

$$\frac{d^5\sigma}{dx\,dQ^2\,d\xi\,dz_p\,d\phi} \tag{2.31}$$

mit $\xi = x/x_p$, $z_p = P\cdot p_q/P\cdot q$ und dem Azimuthalwinkel $\phi$. Mit $x_p$ wird der Impuls des einlaufenden Partons bezeichnet.

Um Rechenzeit zu sparen, wird im Lepto-Generator in einem Initalisierungsschritt zunächst in einem $x\,W^2$-Gitter die Wahrscheinlichkeit für die Abstrahlungsprozesse $P(q\bar{q})$- und $P(qg)$ berechnet und gespeichert. $P(q\bar{q})$- und $P(qg)$ sind definiert durch Integrale der Matrixelemente über $\xi$, $z_p$ und $\phi$, geteilt durch den totalen differentiellen Wirkungsquerschnitt $d\sigma/dQ^2\,dx$, wobei das Integral über $\xi$ die Partonstrukturfunktionen beinhaltet und numerisch ausgeführt werden muß. In der Ereignisgenerierung kann dann anhand dieser Wahrscheinlichkeiten entschieden werden, ob ein $q\bar{q}$ oder $qg$-Ereignis generiert wird, und die Variablen $\xi$, $z_p$ und $\phi$ folgen aus den Matrixelementen mit ausintegrierten $Q^2$ und $x$. Als Abschneidekriterium der kollinearen und weichen Divergenzen wird die invariante Masse $m_{ij}$ zwischen den Partonen verwendet. Es werden nur $q\bar{q}$- und $qg$-Ereignisse mit $m_{ij} > y_{cut}^{gen.}W^2$ generiert, wobei $y_{cut}^{gen.}$ ein Parameter des Generators ist

**Matrixelemente+Partonschauer (MEPS):** Als weitere Option kann die Matrixelemente-Option durch die Hinzunahme von Partonschauern erweitert werden (Abschnitt 2.1.2).

Die Behandlung des Protonrestes erfolgt wie in Abschnitt 2.2.4 beschrieben. Es stehen aber auch alternative Modelle für den Protonrest zu Verfügung, deren Einfluß auf die Jetraten in Abschnitt 6.1.3 untersucht wird. Die Hadronisierung wird gemäß dem Lund-Stringmodell mit dem Programm JETSET durchgeführt (Abschnitt 2.3.4). Allerdings werden für die Matrixelemente-Option von den Sollwerten abweichende Fragmentationsparameter verwendet, und zwar mit den abgeänderten Werten: $a = 1.0$, $b = 0.7\,GeV^{-2}$, $\sigma_{p_t} = 0.4\,GeV$.

In Tabelle 2.1 sind die in dieser Analyse wesentlichen Parameter des Generators, deren Sollwerte sowie die hier benutzten Werte aufgeführt.

### 2.3.2 ARIADNE

In ARIADNE [77] ist das Farbdipolmodell, wie in Abschnitt 2.1.3 beschrieben, implementiert. ARIADNE verwendet LEPTO für die Generierung des elektroschwachen Teils der Ereignisse. Ferner wird LEPTO mit der Matrixelemente-Option verwendet, um Boson-Gluon-Fusionsereignisse zu generieren, da diese im Farbdipolmodell nicht gut beschrieben werden. Um die Gluonabstrahlung im Farbdipolmodell in einem Boson-Gluon-Fusionsereignis an die Skala des harten Prozesses anzugleichen, besteht als Option die Möglichkeit, für das maximale erlaubte $p_T^2$ des ersten abgestrahlten Gluons das $p_T^2$ des $q\bar{q}$-Paares einzusetzen. Die Hadronisierung wird gemäß dem Lund-Stringmodell mit dem Programm JETSET durchgeführt (Abschnitt 2.3.4). Auch für ARIADNE werden von

| Parameter | Bedeutung | Sollwert | benutzter Wert |
|---|---|---|---|
| PARU(112) | $\lambda_{QCD}$ in $\alpha_s(Q^2)$ | $0.25\,GeV$ | $0.2\,GeV$ |
| MSTU(112) | Anzahl der Flavours | 5 | 5 |
| PYPAR(22) | Partonschauerabschneidewert IPS | $1\,GeV^2$ | $1\,GeV^2$ |
| PARJ(82) | Partonschauerabschneidewert FPS | $1\,GeV$ | $2\,GeV$ |
| PARL(8) | $y_{cut}^{gen.}$ | 0.01 | 0.0025 |
| PARL(3) | intrinsisches$< k_t >$ im Proton | $0.44\,GeV$ | $0.44\,GeV$ |
| PARL(14) | $\sigma_{p_\perp}$ komplexer Protonreste | $0.44\,GeV$ | $0.44\,GeV$ |

Tab. 2.1: *Die in dieser Analyse diskutierten Werte der LEPTO-Parameter.*

| Parameter | Bedeutung | Sollwert | benutzter Wert |
|---|---|---|---|
| PARA(1) | $\lambda_{QCD}$ in $\alpha_s(Q^2)$ | $0.2\,GeV$ | $0.2\,GeV$ |
| MSTA(15) | Anzahl der Flavours | 5 | 5 |
| PARA(3) | $p_T$-Schnitt für Dipolabstrahlung | $1\,GeV$ | $1\,GeV$ |
| PARA(10) | $\alpha$ für Protonausdehnung | 1 | 1 |
| PARA(11) | $\mu$ für Protonausdehnung | $1\,GeV$ | $1\,GeV$ |

Tab. 2.2: *Die in dieser Analyse diskutierten Werte der ARIADNE-Parameter.*

den Sollwerten abweichende Fragmentationsparameter, und zwar mit den abgeänderten Werten: $a = 0.23$, $b = 0.34\,GeV^{-2}$, $\sigma_{p_t} = 0.405\,GeV$, verwendet.

Die in dieser Analyse wesentlichen Parameter des Generators, sowie deren Sollwerte und die hier benutzten Werte, sind in Tabelle 2.2 aufgeführt.

### 2.3.3 HERWIG

Im HERWIG-Monte-Carlo-Generator [78] ist ein „leading log" Partonschauermodell implementiert, das sowohl für den Partonschauer im Endzustand als auch für den Partonschauer im Anfangszustand QCD-Kohärenzeffekte berücksichtigt.

Für den Partonschauer im Anfangszustand wird der Phasenraum durch Interferenzeffekte auf den Bereich:

$$E_i \theta_{pq_i} < E_{i-1} \theta_{pq_{i-1}} \tag{2.32}$$

beschränkt [74]. Dabei ist $\theta_{qp_i}$ der Öffnungswinkel zwischen dem einlaufendem Parton $p$ und dem abgetrahlten Parton $q$. In HERWIG wird als Entwicklungsvariable für den Partonschauer, abweichend vom Lund-Partonschauermodell, die Größe:

$$Q_i = E_i \sqrt{\xi_i} \quad \text{mit } \xi_i = (pq_i)/(E\omega_i) \tag{2.33}$$

verwendet. Dabei ist die Energie des einlaufenden Partons mit $E$ und die des abgestrahlten Partons mit $\omega_i$ bezeichnet. Die Ordnungsbedingung (Gleichung 2.32) lautet damit:

$$Q_{i+1} < Q_i \tag{2.34}$$

Für den Partonschauer im Endzustand wird als Entwicklungsvariable:

$$Q_i = E_i \sqrt{\xi_{ij}} \quad \text{mit } \xi_{ij} = (p_i p_j)/(E_i E_j) \tag{2.35}$$

für die Verzweigung $i \to jk$ verwendet. Es wird hier wie im Lund-Partonschauermodell eine Winkelordnung eingeführt. Die Skala der maximalen Virtualität ist in HERWIG näherungsweise durch $Q^2$ gegeben.

In HERWIG sind azimutale Korrelationen zwischen den abgestrahlten Partonen aufgrund von Interferenz sowie aufgrund von Gluonpolarisation implementiert. Interferenzeffekte zwischen den Partonschauern im Anfangs- und Endzustand werden berücksichtigt, indem der von einem Parton der harten Wechselwirkung ausgehende Partonschauer in einem Konus begrenzt wird, dessen Öffnungswinkel durch den Winkel zwischen diesem Parton und dem durch eine Farbflußlinie verbundenem Parton gegeben ist.

Für die Hadronisierung wird in HERWIG die Clusterfragmentation (Abschnitt 2.2.2) verwendet. In dieser Analyse wird HERWIG, soweit nicht anders erwähnt, mit der Option des „soft underlying events" (Abschnitt 2.2.4) benutzt.

### 2.3.4 JETSET

Im Programmpaket JETSET [85] ist das Lund-Stringmodell, wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, implementiert. Es wird dabei die symmetrische Fragmentationsfunktion (Gleichung 2.30) verwendet. Es besteht auch die Möglichkeit, die unabhängige-Fragmentation zu benutzen. Neben der Fragmentation wird in JETSET ein Zerfall instabiler Teilchen in Teilchen simuliert, die im Detektor beobachtet werden können, und zwar gemäß den aus Daten bestimmten Zerfallsraten. Die in dieser Analyse diskutierten Parameter sind in Tabelle 2.3 aufgeführt.

| Parameter | Bedeutung | Solltwert | benutzter Wert |
|---|---|---|---|
| PARJ(21) | $\sigma_{P_t}$ der Fragmentation | $0.35\,GeV$ | $0.35\,GeV$ |
| PARJ(41) | $a$ Fragmentationparameter | 0.5 | 0.5 |
| PARJ(42) | $b$ Fragmentationparameter | $0.9\,GeV^{-2}$ | $0.9\,GeV^{-2}$ |

Tab. 2.3: *Die in dieser Analyse diskutierten Werte der JETSET-Parameter.*

## 2.4 Vorhersagen der Generatoren für die Jetraten

In diesem Abschnitt werden die Vorhersagen der jeweiligen QCD-Modelle, die den verschiedenen Monte-Carlo-Generatoren zugrunde liegen, für die 2+1 Jetrate untersucht.

Wie in Abschnitt 2.1.2 erwähnt, hängt Umfang und Härte der QCD-Abstrahlung in den Partonschauermodellen von der Skala der maximalen Virtualität ab. In Abbildung 2.2 ist die mit dem JADE-Algorithmus (siehe Abschnitt 5.1.1) erhaltene 2+1 Jetrate bei $y_{cut} = 0.02$ (siehe Abschnitt 5.1.1) für verschiedene Skalen in Abhängigkeit von $Q^2$ dargestellt. Besonders für kleines $Q^2$ ist die 2+1 Jetrate sehr unterschiedlich. Die extremen




Abb. 2.2: *Die Vorhersagen für die 2+1 Jetrate bei* $y_{cut} = 0.02$ *des LEPTO-PS-Modells für verschiedene Skalen der maximalen Virtualität in Abhängigkeit von* $Q^2$*:*

| | |
|---|---|
| (- · -) $Q^2$; | (· · ·) $W^2$; |
| (- - -) $W \cdot Q$; | (—) $Q^2(1-x)$; |
| ( ○ ) $Q^2(1-x)\,max(1, \ln\frac{1}{x})$; | ( ● ) $W^{4/3}$ |

Skalen $Q^2$ und $W^2$ konnten allerdings schon mit den ersten vom H1-Detektor gewonnenen Daten (entsprechend einer integrierten Luminosität von $1.6\,nb^{-1}$) durch Vergleich der Energieflüsse ausgeschlossen werden [79].

In Hinblick auf QCD-Tests durch Vergleich der QCD-Vorhersagen für die 2+1 Jetrate mit Messungen sind Monte-Carlo-Modelle, die auf exakten Matrixelementen basieren, von besonderem Interesse. Bisher verfügbar sind allerdings nur Monte-Carlo-Generatoren basierend auf $\mathcal{O}(\alpha_s^1)$-Matrixelementen, wobei der Einfluß höherer Ordnungen durch anschließende Partonschauer beschrieben werden kann. Abbildung 2.3 zeigt die Vorhersagen des LEPTO-ME-Monte-Carlo-Modells und des LEPTO-MEPS-Monte-Carlo-Modells für die 2+1 Jetrate in Abhängigkeit von $Q^2$. Der Einfluß des Partonschauers auf die 2+1 Jetrate ist besonders für kleine $Q^2$ erheblich. Wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, ist die Festlegung der maximalen Virtualität des Partonschauers im Anfangszustand für Ereignisse mit harter QCD-Abstrahlung gemäß den Matrixelementen zweideutig. Eine offensichtliche Alternative zum Maximum beider Möglichkeiten ist das Minimum. Wie in Abbildung 2.3 gezeigt, hängt die 2+1 Jetrate stark von dieser Zweideutigkeit ab.

Wie in Abschnitt 2.3.1 beschrieben, wird als Abschneidekriterium der kollinearen und infraroten Divergenzen im LEPTO-ME-Generator die invariante Masse der Partonen $m_{ij}$ verwendet: $y_{cut}^{gen} = \frac{m_{ij}}{W^2}$. Zum Vergleich mit Messungen sollte der Abschneideparameter $y_{cut}^{gen.}$ gegenüber dem Experimentellen $y_{cut}$ im JADE-Algorithmus klein genug gewählt werden, sodaß der Abstand beider Werte größer ist als die Auflösung der Bestimmung von $y_{cut}$. Für das LEPTO-MEPS-Monte-Carlo sollte die Wahl von $y_{cut}^{gen.}$ allerdings weniger wichtig sein, da weichere Abstrahlungen als die durch $y_{cut}$ zugelassenen durch den Partonschauer beschrieben werden. Wie in Abbildung 2.4 dargestellt, verbleibt aber eine größere Abhängigkeit der 2+1 Jetrate bei $y_{cut} = 0.02$ von $y_{cut}^{gen.}$ .

Die Vorhersagen der Monte-Carlo-Modelle ARIADNE und HERWIG für die 2+1 Jetrate sind in Abbildung 2.5 gezeigt. Gegenüber dem LEPTO-MEPS-Monte-Carlo ist




Abb. 2.3: *Der Einfluß des Partonschauers auf die 2+1 Jetrate bei* $y_{cut} = 0.02$ *in Abhängigkeit von* $Q^2$ *im LEPTO-MEPS-Modell:*
*(—) IPS +FPS; (···) ohne Partonschauer; (-·-) nur FPS; (- - -) nur IPS; ( • ) IPS mit der kleineren Skalenanpassung.*

die Entwicklung der 2+1 Jetrate in Abhängigkeit von $Q^2$ flach. Die Vorhersage des ARIADNE-Generators für die 2+1 Jetrate ist bei kleinen $Q^2$ höher als die des LEPTO-MEPS-Generators.

Die Vorhersagen der Monte-Carlo-Modelle für die 2+1 Jetrate sind, besonders für kleine $Q^2$, sehr unterschiedlich. In Abschnitt 8.2 werden die Vorhersagen der Monte-Carlo-Modelle mit den Messungen verglichen.




Abb. 2.4: *Der Einfluß von $y_{cut}^{gen}$ für die 2+1 Jetrate im LEPTO-MEPS-Modell in Abhängigkeit von $y_{cut}$ für Monte-Carlo-Ereignisse mit kleinem und großem $Q^2$:*
*(—) $y_{cut}^{gen} = 0.0010$; $(\cdots)$ $y_{cut}^{gen} = 0.0025$;*
*(- - -) $y_{cut}^{gen} = 0.0050$; (- · -) $y_{cut}^{gen} = 0.0150$.*




Abb. 2.5: *Die Vorhersagen für die 2+1 Jetrate bei $y_{cut} = 0.02$ des ARIADNE- (- - -) und HERWIG $(\cdots)$ -Modells im Vergleich zum LEPTO-MEPS-Modell (—) in Abhängigkeit von $Q^2$. Ebenfalls gezeigt ist das ARIADNE-Modell ohne Protonausdehnung (- · -).*

# Kapitel 3

# Das H1-Experiment

## 3.1 Der Speicherring HERA

Im Speicherring HERA (Hadron-Elektron-Ring-Anlage) werden Protonen mit einer Energie von $820\,GeV$ und Elektronen mit einer Energie von $26.7\,GeV$ [1] zur Kollision gebracht. HERA besteht aus zwei separaten $6.3\,km$ langen Speicherringen. Elektronen werden mit normalleitenden Magneten auf der Bahn gehalten. Um Protonen auf der Bahn zu halten, kommen bei HERA supraleitende Magnete zur Anwendung. Bei den beiden Experimenten H1 und ZEUS werden die Strahlen zur Kollision gebracht.

Die Teilchen werden mit Hilfe von Linearbeschleunigern und unter Verwendung der bestehenden Ringanlagen DESY und PETRA vorbeschleunigt und dann in HERA eingespeist. Protonen werden im Linearbeschleuniger LINAC III als $H^-$ Ion auf $50\,MeV$ beschleunigt, nach Abstreifen der Elektronenhülle im Synchrotron DESY III auf $7.4\,GeV$ weiterbeschleunigt, in PETRA auf eine Energie von $40\,GeV$ gebracht, und anschließend in die HERA Maschine injiziert, wo sie dann auf die Nominalenergie von $820\,GeV$ beschleunigt werden.

Elektronen werden von LINAC I mit $50 - 400\,MeV$ in DESY II eingespeist, dort auf $9\,GeV$ beschleunigt, anschließend in PETRA auf $12\,GeV$ weiterbeschleunigt und dann ebenfalls in die HERA-Maschine injiziert, wo sie auf $26.7\,GeV$ weiterbeschleunigt werden.

Um die Solluminosität von $1.5 \cdot 10^{31}\,cm^2 s^{-1}$ zu erreichen, ist es vorgesehen, jeweils 210 Teilchenpakete mit ca. $10^{11}$ Teilchen in den HERA-Ringen zu speichern und zur Kollision zu bringen. Aus technischen Gründen waren jedoch bei der Datennahme 1992 nur 10 der 210 Teilchenpakete gefüllt, wovon nur 9 Pakete kollidierten, während jeweils ein leeres Proton- bzw. Elektron-Teilpaket zu Untergrundstudien benutzt wurden. Für die im Herbst 1992 von HERA in dieser Weise produzierte Luminosität betrug ca. $50\,nb$. Die mit dem H1-Detektor gewonnenen Daten entsprechen einer durch Totzeit und technischen Problemen verringerten Luminosität von $31.6\,nb^{-1}$. Fordert man zusätzlich, daß alle Detektor-Komponenten einwandfrei arbeiten, vermindert sich die zur Analyse nutzbare integrierte Luminosität weiter auf $22.5\,nb^{-1}$.

[1] HERA wurde für eine Elektronenenergie von 30 GeV konzipiert. Die Datennahme 1992/93 erfolgte mit einer etwas reduzierten Energie der Elektronen von 26.7 GeV.