Neuronaler Netzwerk-Trigger für Myonen im H1-Detektor bei HERA

Diplomarbeit

vorgelegt von

Susanne Mohrdieck

II. Institut für Experimentalphysik
Universität Hamburg

Hamburg
August 1997

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

Die Elementarteilchenphysik beschäftigt sich mit der Frage, woraus die Materie aufgebaut ist und was sie zusammen hält. Die Ansichten über die „fundamentalen Teilchen“ der Welt und den zwischen ihnen wirkenden Kräften haben sich im Laufe der Zeit verändert und sind weiterentwickelt worden.
Erstmals wurde ein Modell des Aufbaus der Materie aus nicht weiter teilbaren Bausteinen (Atomen; von gr. atomos $\widehat{=}$ unteilbar) von Demokrit (ca.460-380 v.Chr.) aufgestellt.
Es zeigte sich aber in den Rutherfordschen Streuversuchen (1911 - 1913), daß die Atome weiter in eine aus Elektronen gebildete Hülle und einem positiven Kern zerlegt werden können. Zunächst stellte man sich vor, daß der Kern aus Protonen (1919 entdeckt) und Elektronen gebildet sein müßte. Dieses Bild führt aber zu Widersprüchen. So wurden weitere neutrale Teilchen im Kern gefordert, die Neutronen, die erstmals von Chadwick (1932) nachgewiesen wurden. Die drei Teilchen, Proton, Neutron und Elektron, bildeten von da an die „elementaren Teilchen“ der Materie. Eine theoretische Beschreibung dieses Bildes ist mit Hilfe der Quantentheorie möglich geworden. Als Kräfte zwischen den Teilchen beinhaltet das Modell die elektromagnetische Wechselwirkung und die Kernkraft.
Doch können mit diesem Bild der Materie nicht alle Prozesse in der Natur korrekt erklärt werden, so beispielsweise nicht die Radioaktivität. Wegen der Beschreibung des β-Zerfalls wurde die Einführung der schwachen Wechselwirkung und eines weiteren Teilchens, des Neutrinos, nötig.
Neben der Postulierung des Neutrinos (1956 nachgewiesen) wurden in Experimenten noch weitere Teilchen gefunden (Pionen, Myonen). Schließlich zeigte sich in Streuexperimenten, daß die Protonen und Neutronen selbst aus weiteren Partonen, den Quarks, aufgebaut sind, die im Nukleon durch die starke Wechselwirkung zusammengehalten werden.
Diese Entdeckungen bilden die Grundlage für das heute verwendete Standard-Modell: Die Materie ist aus sechs Leptonen (e, ν_e; μ, ν_μ; τ, ν_τ) und sechs Quarks (u, d; c, s; t, b) aufgebaut. Das Modell beinhaltet zwei Kräfte, die elektroschwache und die starke Wechselwirkung. Die elektroschwache Wechselwirkung ist die Vereinheitlichung von elektromagnetischer und schwacher Wechselwirkung. Sie ist die einzige Wechselwirkung, an die die Leptonen koppeln. Neutrinos wechselwirken sogar nur über die schwache Komponente mit anderen Teilchen.

Mit Streuexperimenten an Speicherringen kann das Standard-Modell getestet werden.
Ein solcher Speicherring ist die Hadron-Elektron-Ring-Anlage HERA am Deutschen Elek-

tronen Synchrotron DESY in Hamburg. Hier werden Positronen und Protonen beschleunigt und bei einer Schwerpunktsenergie von $\sqrt{s}\ = 300$ GeV zur Kollision gebracht. Es werden mit zwei Experimenten der *ep*-Wechselwirkung (H1 und ZEUS) sowie einem Experiment mit dem Positronenstrahl (HERMES) die Struktur von Proton, Neutron und Photon erforscht. Ebenso wird mit der Anlage nach neuen Teilchen und Aspekten außerhalb des Standard-Modells gesucht (beispielsweise Supersymmetrie und Leptoquarks).

Diese Arbeit wurde am H1-Experiment erstellt. Ein Forschungsschwerpunkt des Experiments ist die Produktion der schweren Quarks *bottom* und *charm*. Schwere Quarks werden im Detektor z.B. durch den leptonischen Zerfall von J/ψ- und Υ-Mesonen oder über semileptonische Zerfälle von Hadronen mit *charm*- oder *bottom*-Quarks in Myonen („inklusive Myonen“) identifiziert.
Neben physikalisch interessanten Prozessen treten im Detektor mit deutlich höherer Rate auch Untergrundereignisse auf, die nicht aus *ep*-Wechselwirkungen stammen. Diese werden beim H1-Experiment über ein vierstufiges Triggersystem von den Physikereignissen getrennt. Die erste Stufe wendet eindimensionale Schnitte auf die vom Detektor bereitgestellten Informationen an. Solche Schnitte reichen jedoch nicht immer aus, um die Ereignisrate für ein Aufzeichnen der Daten genügend zu senken. Häufig wird die Rate nach der ersten Triggerstufe noch vom Untergrund dominiert. Hier wird die zweite Stufe aktiviert, die u.a. mit Hilfe neuronaler Netze den Untergrund weiter reduziert.
Neuronale Netze besitzen den Vorteil, daß sie in hochdimensionalen Räumen Korrelationen zwischen den Ereignissen finden können und über multidimensionale Schnitte in diesem Raum Ereignisse eines bestimmten physikalischen Prozesses vom Untergrund trennen können. Sie werden über Lernalgorithmen auf ein Klassifizierungsproblem optimiert, um dann unbekannte Ereignisse den verschiedenen Klassen zuzuordnen (Training und Generalisierung).

Das Ziel dieser Diplomarbeit ist es, für Ereignisse mit unelastischen J/ψ-Kandidaten und für Daten mit inklusiver Myon-Produktion neuronale Netze zu trainieren, die dann auf der zweiten Ebene des H1-Triggersystems eingesetzt werden können. Dabei stellt sich die Frage, ob ein gemeinsames Netz zur Trennung von Untergrund und den beiden physikalischen Ereignisgruppen effizient arbeiten kann oder ob der Einsatz zweier einzelner Netze erfolgreicher ist.

In dieser Arbeit werden zunächst in Kapitel 2 die wichtigsten Mechanismen zu Produktion und Zerfall von schweren Quarks beschrieben.
Daran schließt sich eine Darstellung des H1-Experiments an (Kapitel 3).
Die theoretischen und mathematischen Grundlagen neuronaler Netze, wie sie in der zweiten Triggerstufe bei H1 verwendet werden, werden in Kapitel 4 gegeben.
In den folgenden Kapiteln dieser Arbeit wird die Erstellung der Netze und ihr Einsatz in der Datennahme behandelt.
Gegenstand des Kapitels 5 ist die Selektion der für das Training benötigten physikalischen Datensätze und der Untergrundereignisse. In Kapitel 6 wird dann die Trainingskette vorgestellt, an deren Ende das Netz fertiggestellt ist. Außerdem wird auf die im Training und Test erreichten Resultate der Netze eingegangen. Am Ende des Kapitels werden die Effizienzen der Netze in der Datennahmeperiode 1997 besprochen.

Kapitel 2

Produktion und Zerfall schwerer Quarks bei HERA

Eines der Forschungsgebiete beim H1-Experiment am Speicherring HERA ist die Produktion schwerer Quarks Q (*bottom* b und *charm* c). Die Produktion kann über mehrere verschiedene Mechanismen erfolgen. Es entstehen dabei meistens schwere Quark-Antiquark-Paare, die in gebundene $Q\overline{Q}$-Zustände (J/ψ- und Υ-Mesonen) oder mit leichten Quarks in D- und B-Mesonen übergehen können.
Die schweren Quarks werden über ihre typischen Zerfallsprodukte identifiziert, insbesondere über die leptonischen und semileptonischen Zerfälle in Elektronen und Myonen.
In der vorliegenden Arbeit werden Ereignisse mit J/ψ-Mesonen im Zerfallskanal $\mu^+\mu^-$ und mit inklusiver Myon-Produktion verwendet. Inklusive Myonen sind Ereignisse mit mindestens einem Myon im Endzustand. Dieses kann z.B. aus dem Zerfall schwerer Quarks oder auch seltener aus dem eines W-Bosons hervorgehen.
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Produktionsmechanismen für schwere Quarks sowie ihre Zerfälle beschrieben.

2.1 Produktion schwerer Quarks

Die ep-Wechselwirkung bei HERA läßt sich in zwei kinematische Bereiche unterteilen:

- der Bereich tiefunelastischer Streuung (DIS, **D**eep **I**nelastic **S**cattering) mit großem Viererimpulsübertrag Q^2.
- der Bereich der Photoproduktion mit $Q^2 \approx 0$.

Beide Bereiche liefern Beiträge zur Produktion schwerer Quarks durch den dominierenden Prozeß der Boson-Gluon-Fusion (BGF). In erster Ordnung (α_s, α) koppelt bei der Boson-Gluon-Fusion ein vom Positron ausgesandtes Boson (γ, Z^0, W^+) über ein Quark-Antiquark-Paar an ein Gluon, das aus dem Partoninhalt des Protons stammt. Dabei überwiegt in der ep-Wechselwirkung der Austausch eines quasireellen Photons ($Q^2 \approx 0$), d.h. es liegt Photoproduktion vor (Photon-Gluon-Fusion):

$$\gamma + g \rightarrow Q + \overline{Q} \tag{2.1}$$

Durch diese Tatsache ist die Entstehung eines schweren Quarks zusammen mit einem leichteren Quark, die nur über geladene Ströme mit $W^{\pm}$ möglich ist, gegenüber der Bildung eines schweren Quark-Antiquark-Paares stark unterdrückt. In Abbildung 2.1 sind die Feynmangraphen für die Photon-Gluon-Fusion gezeigt.



Abbildung 2.1: *Produktion schwerer Quarks mit Photon-Gluon-Fusion.*

Neben diesem Vorgang erster Ordnung können noch weitere Prozesse höherer Ordnung in (α_s, α) auftreten.
Zur theoretischen Berechnung des Wirkungsquerschnittes der Photon-Gluon-Fusion wird die ep-Wechselwirkung in zwei unabhängige Vorgänge unterteilt: die Emission eines Photons vom Positron und die Wechselwirkung des Photons mit dem Proton. Die Emission des Photons wird dabei durch die Weizsäcker-Williams-Näherung [Weiz34] beschrieben, die das elektromagnetische Feld eines sich schnell am Nukleon vorbei bewegenden Positrons als Fluß virtueller Photonen betrachtet. Hieraus wird für die $b\overline{b}$-Produktion ein Wirkungsquerschnitt von $\sigma(bottom) = 6.0 \pm 2$ nb abgeschätzt [Eich88, Frix95]. Für die $c\overline{c}$-Erzeugung wurde $\sigma(charm) = 941 \pm 160^{+142}_{-120}$ nb gemessen [Aid96].
Im folgenden werden die Prozesse höherer Ordnung aufgelistet (nach [Krüg94]):

- Prozeß mit aufgelöstem Photon: Bei Prozessen höherer Ordnung in α_s kann die hadronische Komponente des Photons aufgelöst werden. Es reagiert ein Gluon oder Quark (q) aus dem Photon mit einem Gluon oder Quark (q) des Protons. Es entsteht im Endzustand neben dem Protonrest und dem $Q\overline{Q}$-Paar ein vom Photon stammender hadronischer Rest (*photon remnant*).

$$q + \overline{q} \rightarrow Q + \overline{Q} \tag{2.2}$$
$$g + g \rightarrow Q + \overline{Q} \tag{2.3}$$

- Prozesse höherer Ordnung mit direktem Photon: Dieser Prozeß ähnelt dem in Abbildung 2.1 dargestellten Vorgang. Das Gluon strahlt, bevor es über ein $Q\overline{Q}$-Paar an das Photon koppelt, ein weiteres Gluon ab.

$$\gamma + g \rightarrow Q + \overline{Q} + g \tag{2.4}$$

- QCD-Compton-Prozesse: das Photon reagiert direkt mit einem leichten Quark (q) oder Antiquark ($\overline{q}$) aus dem Proton. Das betroffene Quark sendet ein Gluon aus, das in ein $Q\overline{Q}$-Paar übergeht.

$$\gamma + q(\overline{q}) \rightarrow Q + \overline{Q} + q(\overline{q}) \tag{2.5}$$

Die tiefunelastische Streuung kann außer durch die Boson-Gluon-Fusion auch durch die in Abbildung 2.2 dargestellten Prozesse zur Produktion schwerer Quarks beitragen.



Abbildung 2.2: *Tiefunelastische Streuung mit Bildung schwerer Quarks (am Beispiel des c-Quarks): a) neutraler Strom mit Austausch der Bosonen γ, Z^0, b) geladener Strom mit Austausch eines W-Bosons.*

Dabei strahlt das Positron ein Eichboson (γ, Z^0, W^+) ab, das mit einem Quark des Protons in Wechselwirkung tritt. Es entsteht ein hadronischer Endzustand X.
Die tiefunelastische Streuung ist ein rein elektroschwacher Vorgang, der durch das Quark-Parton-Modell beschrieben wird. Er setzt sich aus einem Anteil mit geladenen Strömen und einem mit neutralen Strömen zusammen. Der Beitrag der neutralen Ströme zum Wirkungsquerschnitt ist jedoch aufgrund des geringen *charm*- und *bottom*-Anteils im Proton klein. Die Existenz von *charm* und *bottom* im Proton ist noch nicht nachgewiesen, wird aber vermutet. Mit einer Schwerpunktsenergie von $\sqrt{s} = 314$ GeV lassen sich als Wirkungsquerschnitte für tiefunelastische Streuung $\sigma(charm) = 4.1$ pb und $\sigma(bottom) = 0.12 \cdot 10^{-2}$ pb abschätzten [Ali87]. Diese sind gegenüber denen der Photoproduktion vernachlässigbar.

	Wirkungsquerschnitt [nb]	
	bottom	*charm*
Photoproduktion	6.0	941
DIS	$0.12 \cdot 10^{-5}$	$4.1 \cdot 10^{-3}$

Tabelle 2.1: *Produktionswirkungsquerschnitte*

2.2 Zerfall schwerer Quarks

Schwere Quarks zerfallen über schwache Wechselwirkung mit geladenen Strömen:

$$b \rightarrow c + W^- \tag{2.6}$$
$$b \rightarrow u + W^- \tag{2.7}$$
$$c \rightarrow s + W^+ \tag{2.8}$$

Die Zerfallsbreite für diese Übergänge ist proportional zum Quadrat des Matrixelements in der Cabbibo-Kobayashi-Maskawa-Matrix. Wegen eines sehr kleinen Matrixelements ist der Zerfall (2.7) stark unterdrückt.
Da die Massen der Quarks kleiner als die Masse des W-Bosons sind, sind die Bosonen virtuell. Sie zerfallen zum einen hadronisch unter Bildung eines $q\overline{q}$-Paares oder semileptonisch in ein Lepton und ein Neutrino (Abbildung 2.3).



Abbildung 2.3: *Semileptonischer Zerfall schwerer Quarks in Myonen.*

Neben Myonen sind als Zerfallsprodukte Elektronen und Tauonen (nur für das b-Quark) möglich. Die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Endzustände kann im Zuschauermodell berechnet werden. Dabei wird das schwere Quark als „frei“ unter Vernachlässigung der Wechselwirkung mit anderen Quarks und Gluonen betrachtet.
Die theoretisch berechneten Verzweigungsverhältnisse für die einzelnen semileptonischen Zerfälle sind in Tabelle 2.2 aufgelistet.

Quark	Verzweigungsverhältnis		
	$\rightarrow e$	$\rightarrow \mu$	$\rightarrow \tau$
b	0.11	0.11	0.026
c	0.11	0.11	0

Tabelle 2.2: *Theoretisch bestimmte Verzweigungsverhältnisse für den Zerfall von* b- *und* c-*Quarks in Leptonen [Eich88]*

2.3 Produktion und Zerfall von J/ψ-Mesonen

J/ψ-Mesonen sind gebundene $c\bar{c}$-Zustände. Man unterscheidet bei der Produktion in *ep*-Wechselwirkung zwei Entstehungsarten: die Diffraktion und die unelastische Erzeugung. Wenn nur Impuls übertragen wird und keine Quantenzahlen ausgetauscht werden, spricht man von Diffraktion. Sie unterteilt sich weiter in einen elastischen und einen protondissoziativen Anteil. Der elastische Prozeß zeichnet sich dadurch aus, daß im Detektor nur die Zerfallsprodukte des J/ψ-Mesons nachgewiesen werden.
J/ψ-Mesonen werden unelastisch vorwiegend in Photon-Gluon-Fusion erzeugt. Dabei ist zu beachten, daß bei der unter Abschnitt 2.1 beschriebenen Produktion das Quark-Antiquark-Paar in einem farbgeladenen Zustand vorliegt. Um zu den farblosen J/ψ-Mesonen zu gelangen, muß mindestens ein Gluon abgestrahlt werden (Abbildung 2.4 a)).



Abbildung 2.4: *a) Erzeugung eines J/ψ-Mesons, b) Zerfall eines J/ψ-Mesons in zwei Myonen.*

Neben der direkten Erzeugung von J/ψ-Mesonen über die Produktion eines schweren Quark-Antiquark-Paares mit anschließender Aussendung eines Gluons können J/ψ-Mesonen auch über die Fragmentation des Quark-Antiquark-Paares oder eines in der γp-Wechselwirkung gebildeten Gluons produziert werden. Größere Beiträge durch diesen Vorgang werden bei J/ψ-Mesonen mit großem Transversalimpuls erwartet.
Der Übergang des Quark-Antiquark-Paares in den farbneutralen gebundenen Zustand wird im Farb-Singulett-Modell (*color singlet model*) [Berg81, Baie81] beschrieben. Bei der Berechnung des Wirkungsquerschnittes wird für das $c\bar{c}$-System nur der farblose $^3S_1$-Zustand berücksichtigt.
Ein neueres Modell bezieht neben diesem Zustand auch farbgeladene Zustände und höhere Anregungen im Fock-Raum ein, die Farb-Oktett-Beiträge [Bodw95]. Über Abstrahlung weicher Gluonen erfolgt der Übergang aus diesen anderen Anregungen in den $^3S_1$-Zustand des J/ψ-Mesons. Nach theoretischen Voraussagen sind Prozesse dieser Art für die Erzeugung von J/ψ-Mesonen über aufgelöste Photonen von Bedeutung. Dadurch würde der Beitrag der Produktion mit aufgelösten Photonen um einen Faktor 10 steigen.

J/ψ-Mesonen zerfallen zu 87% in Hadronen und zu je 6% über elektromagnetische Wechselwirkung in ein Elektron und ein Positron bzw. zwei Myonen [PDG]. In dieser Arbeit wird der Zerfall in zwei Myonen zur Identifizierung verwendet (Abbildung 2.4 b)).

Kapitel 3

Das H1-Experiment

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die **H**adron-**E**lektron-**R**ing-**A**nlage (HERA) und das Experiment H1 gegeben. Dabei werden bei der Beschreibung des H1-Detektors nur die für diese Arbeit relevanten Bestandteile genauer erläutert. Gegenstand des letzten Teils des Kapitels ist die Entstehung von Untergrundereignissen und ihre Reduzierung in der Datennahme.

3.1 Der Speicherring HERA

In dem 6336 m langen Speicherring HERA werden seit 1992 Elektronen (seit Juli 1994 Positronen) und Protonen beschleunigt, gespeichert und zur Kollision gebracht. Durch den Übergang von e^- zu e^+ erhöht sich die Lebensdauer des Leptonenstrahls von 3 auf 11 Stunden.
In einem System aus Vorbeschleunigern werden die Teilchen zunächst auf Energien von 12 GeV (e) bzw. 40 GeV (p) beschleunigt, bevor sie im HERA-Ring in zwei separaten Strahlrohren auf ihre Endenergien gebracht und gespeichert werden (Abbildung 3.1). Die Endenergie beträgt für die Positronen 27.5 GeV und für die Protonen 820 GeV. Damit ergibt sich eine Schwerpunktsenergie des ep-Systems von $\sqrt{s}$ =300 GeV, so daß ein maximaler Viererimpulsübertrag Q^2 von ungefähr 10^5 GeV^2 erreicht wird. Dieser Wert liegt zwei Größenordnungen über dem von Experimenten am ruhenden Proton (*fixed target*-Experimente).
Die von HERA gelieferte integrierte Luminosität für die letzten Jahre ist in Tabelle 3.1 zusammengefaßt. Positronen und Protonen werden in dem Speicherring simultan auf maximal je 220 mit Teilchenpaketen (*bunches*) besetzten Plätzen gespeichert. Dies führt an

	1995	1996	1997
integrierte Luminosität	5 pb^{-1}	10 pb^{-1}	>15 pb^{-1}

Tabelle 3.1: *Integrierte Luminositäten der letzten Jahre.*



Abbildung 3.1: *Der Speichering HERA und seine Vorbeschleuniger.*

den Wechselwirkungspunkten zu Abständen von 96 ns zwischen zwei Kollisionen von Paketen (*bunch crossings*) entsprechend einer Umlauffrequenz von 10.4 MHz. Die Zeit zwischen zwei Kollisionen von Paketen wird auch als Zeiteinheit verwendet, sie wird im folgenden mit 'Zeitscheibe' bezeichnet. Beim Auffüllen der Plätze mit Paketen wird eine bestimmte Anzahl von Plätzen nur mit Positronen oder Protonen gefüllt, so daß sie nicht miteinander kollidieren. Mit diesen Paketen kann der nicht aus ep-Wechselwirkungen stammende Untergrund untersucht werden. Die wichtigsten von Protonen induzierte Untergrundquellen sind Kollisionen mit dem Strahlrohr und Wechselwirkungen mit dem darin befindlichen Restgas. Für die Positronen ist die Synchrotronstrahlung anzuführen.
Die beiden Teilchenstrahlen werden in zwei Wechselwirkungszonen zur Kollision gebracht, an denen die Detektoren der Experimente H1 und ZEUS aufgebaut sind. Neben diesen beiden Experimenten arbeiten zwei *fixed target*-Experimente am Speicherring HERA. HERMES untersucht unter Verwendung longitudinal polarisierter Positronen und polarisierter Protonen und Neutronen die Spinstrukturen von Proton und Neutron. Noch im Aufbau befindlich ist das Experiment HERA B, mit dem durch ein nahe an den Protonenstrahl herangeführten Draht B-Mesonen mit hoher Rate erzeugt werden sollen und die CP-Verletzung beim Zerfall der B-Mesonen untersucht werden soll.

3.2 Der H1-Detektor

Der Universaldetektor des H1-Experiments ist in der Experimentierhalle Nord des Speicherrings HERA aufgebaut. Der Detektor umfaßt nahezu den gesamten 4π-Raumwinkel um den nominellen Wechselwirkungspunkt und ermöglicht bei guter Orts- und Impulsauflösung eine Identifizierung der Teilchen und die Messung ihrer Energie.



Abbildung 3.2: *Polarwinkelbereiche des H1-Detektors: Eingezeichnet sind die Akzeptanzbereiche des zentralen Myonsystems, des Flüssig-Argon-Kalorimeters sowie des zentralen Spurkammersystems. Rechts ist das H1-Koordinatensystem dargestellt.*

Das bei H1 verwendete Koordinatensystem ist ein rechtshändiges Koordinatensystem mit Ursprung im nominellen Wechselwirkungspunkt. Die z-Achse ist durch die Richtung des einlaufenden Protons definiert, die x-Achse zeigt zum Mittelpunkt des Speicherrings, y weist nach oben (Abbildung 3.2). Der Bereich kleiner Polarwinkel θ wird mit Vorwärtsrichtung bezeichnet.
Man erwartet, daß die Ereignisse eine Symmetrie im Azimutwinkel ϕ aufweisen und daß wegen des Lorentz-Boosts ein Großteil der Reaktionsprodukte in Vorwärtsrichtung geht. Deshalb ist der Detektor im vorderen Bereich aufwendiger gestaltet. Außerdem sind die Detektorkomponenten zylindersymmetrisch um das Strahlrohr angeordnet.
In Abbildung 3.3 ist ein Überblick über den Detektor zu sehen, Abbildung 3.2 zeigt die Polarwinkelbereiche einzelner Detektorkomponenten. Eine detaillierte Beschreibung der Detektorbestandteile befindet sich in [H1-96-01, H1-97]. Hier werden nur die wichtigsten Komponenten vorgestellt.

Das Spurkammersystem

Das Spurkammersystem besteht aus Driftkammern zur präzisen Spurrekonstruktion und Impulsmessung geladener Teilchen sowie Proportionalkammern, die nur grobe Information über Spurverlauf und Ereignisvertex liefern, aber aufgrund ihrer größeren Geschwindigkeit zu Triggerzwecken verwendet werden. Es setzt sich aus einem zentralen Spurdetektor (CTD, **C**entral **T**racking **D**etector), einem Vorwärtsspurdetektor (FTD, **F**orward **T**racking **D**etector) und einem rückwärtigen Driftkammersystem zusammen. Spuren, die im zentralen Spurdetektor rekonstruiert werden, heißen zentrale Spuren, die im Vorwärtsdetektor rekonstruierten Vorwärtsspuren. Werden für ein Teilchen in beiden Detektoren