Untersuchung der inelastischen Photoproduktion von J/ψ-Mesonen im H1-Detektor bei HERA

DISSERTATION
zur Erlangung des Doktorgrades
des Fachbereichs Physik
der Universität Hamburg

Vorgelegt von
Stephan Schiek
aus Kiel

Hamburg
1996

Gutachter der Dissertation:	Prof. Dr. B. Naroska Prof. Dr. F.W. Büßer
Gutachter der Disputation:	Prof. Dr. B. Naroska Prof. Dr. V. Blobel
Datum der Disputation:	29. Januar 1997
Sprecher des Fachbereichs Physik und Vorsitzender des Promotionsausschusses:	Prof. Dr. B. Kramer

Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit wird die inelastische Photoproduktion von J/ψ-Mesonen am Speicherring HERA im leptonischen Zerfallskanal untersucht. Die Ereignisse sind mit dem H1-Detektor während der Datennahmeperioden 1994 und 1995 aufgezeichnet worden.
Es zeigt sich, daß die inelastische J/ψ-Produktion im Bereich der Photon-Proton Schwerpunktenergie $30\,\mathrm{GeV} \leq W_{\gamma p} \leq 150\,\mathrm{GeV}$ und der Elastizität $z < 0.9$ (z ist der relative Energieübertrag vom Photon auf das J/ψ-Meson) als Funktion von $W_{\gamma p}$ in der Form durch NLO-QCD Rechnungen im Colour-Singlet Modell beschrieben werden kann. In einem eingeschränkten Bereich $z < 0.8$ und einem Schnitt auf den Transversalimpuls des J/ψ-Mesons von $p_{t,\psi}^2 > 1\,\mathrm{GeV}^2$ sind sowohl Form als auch absolute Höhe des gemessenen Wirkungsquerschnitts in Übereinstimmung mit den entsprechenden QCD-Rechnungen. Eine Log-Likelihood Anpassung an die $p_{t,\psi}^2$-Verteilung der Form $e^{-bp_t^2}$ liefert einen Wert von $b = (0.387 \pm 0.036 \pm 0.030)\,\mathrm{GeV}^{-2}$, der innerhalb der Fehler mit den NLO-QCD Vorhersagen von $b = 0.33\,\mathrm{GeV}^{-2}$ übereinstimmt. Die Rechnungen in führender Ordnung in α_s sagen einen deutlich steileren Abfall der $p_{t,\psi}^2$-Verteilung voraus, der nicht durch die Messungen bestätigt wird. Die Messung des differentiellen Wirkungsquerschnitts als Funktion von z wird durch das Colour-Singlet Modell beschrieben und zeigt keine Evidenz für das Vorhandensein großer Colour-Octet Beiträge im Bereich $z > 0.8$. Eine direkte Messung der Gluondichte $x_g g(x_g, \mu^2)$ bei $\mu^2 = m_\psi^2$ im Bereich $10^{-3} \leq x_g \leq 10^{-2}$ ergibt einen Anstieg zu kleinen Werten von x_g der Form $x_g^{-\lambda}$ mit $\lambda = 0.35 \pm 0.05 \pm 0.05$. Dieser Anstieg ist innerhalb der Fehler verträglich sowohl mit der Parametrisierung MRS(A') als auch mit der steileren Vorhersage von GRV.

Abstract

In this thesis the inelastic photoproduction of J/ψ-mesons at HERA is analysed in the leptonic decay channel. The events were taken in the years 1994 and 1995 with the H1-detector.
The shape of the cross section in the range of the photon-proton center of mass energy $30\,\mathrm{GeV} \leq W_{\gamma p} \leq 150\,\mathrm{GeV}$ and the elasticity $z < 0.9$ is described by NLO-QCD calculations in the colour-singlet model. In a restricted kinematic range $z < 0.8$ and $p_{t,\psi}^2 > 1\,\mathrm{GeV}^2$ shape and height of the measured cross section is in agreement with the QCD-calculations. A log-likelihood fit to the $p_{t,\psi}^2$-distribution of the form $e^{-bp_t^2}$ yields a value of $b = (0.387 \pm 0.036 \pm 0.030)\,\mathrm{GeV}^{-2}$ which is within the errors in agreement with the NLO-QCD prediction of $b = 0.33\,\mathrm{GeV}^{-2}$. The prediction of the leading order QCD-calculations is much steeper and not in agreement with the data. The z-distribution is well described by the calculations in the colour-singlet model. There is no evidence for large colour-octet contributions in the differential z distribution in the range $z > 0.8$. A direct measurement of the gluon density $x_g g(x_g, \mu^2)$ at $\mu^2 = m_\psi^2$ in the range $10^{-3} \leq x_g \leq 10^{-2}$ shows a behaviour of the form $x_g^{-\lambda}$ with $\lambda = 0.35 \pm 0.05 \pm 0.05$, which is within the errors compatible with the gluon parametrisation MRS(A') and also with the steeper prediction of GRV.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

Am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY wurde 1992 der weltweit erste Positron-Proton Speicherring (HERA) mit einer Schwerpunktenergie von $\sqrt{s} \approx 300\,\mathrm{GeV}$ in Betrieb genommen. Ein wesentlicher Forschungsaspekt ist die Messung der Protonstruktur in zuvor unzugänglichen kinematischen Bereichen. Es werden maximale Impulsüberträge von $Q^2 \approx 10^5\,\mathrm{GeV}^2$ erreicht. Der experimentell zugängliche Bereich von x, dem Impulsbruchteil des an der Reaktion beteiligten Konstituenten des Protons, liegt bei Werten von $x \gtrsim 10^{-5}$ bei Impulsüberträgen $Q^2 \gtrsim 1\,\mathrm{GeV}^2$.
Ein interessantes Forschungsgebiet der Lepton-Proton Streuung bei HERA ist die Untersuchung von Ereignissen mit der Erzeugung schwerer Quarks (c, b). Ein wesentlicher Prozeß hierfür ist die Photon-Gluon Fusion (PGF), bei der ein vom Positron abgestrahltes quasireelles Photon ($Q^2 \approx 0$) mit einem Gluon aus dem Proton über ein Quark-Antiquarkpaar in Wechselwirkung tritt. Diese Art von Wechselwirkung bei HERA ist sensitiv auf den Gluonanteil im Proton im Bereich $0.5 \times 10^{-3} \lesssim x_g \lesssim 10^{-2}$. Sie kann störungstheoretisch beschrieben werden im Rahmen der Quantenchromodynamik (QCD).
Die Produktion von b-Quarks ist aufgrund ihrer höheren Masse gegenüber der von c-Quarks etwa um einen Faktor 100 unterdrückt. Zur experimentellen Untersuchung sind Ereignisse mit gebundenen Charmonium-Zuständen besonders geeignet, da die ungebundenen $c\bar{c}$-Zustände experimentell nur schwer von der Produktion leichter Quarksorten getrennt werden können.
In dieser Arbeit wird die *inelastische* Produktion von J/ψ-Vektormesonen untersucht. Dieser Prozeß kann beschrieben werden durch eine Photon-Gluon Wechselwirkung, bei der das erzeugte $c\bar{c}$-Paar durch Abstrahlung eines harten Gluons (Colour-Singlet Modell) oder weicher Gluonen (Colour-Octet Modell) in einen farbneutralen gebundenen J/ψ-Zustand übergeht.
Inelastische J/ψ-Produktion ist bereits in Fixed-Target Experimenten bei einer Photon-Proton Schwerpunktenergie von $W_{\gamma p} < 25\,\mathrm{GeV}$ untersucht worden. Dabei wurde die inelastische J/ψ-Produktion von der elastischen durch einen Schnitt von $z < 0.9$ getrennt (die Elastizität z gibt den relativen Energieübertrag vom Photon auf das J/ψ-Meson

an). Man fand in diesen Experimenten, daß die Form des gemessenen Wirkungsquerschnitts in z durch die QCD-Rechnungen im Colour-Singlet Modell gut beschrieben wird.
Die vorliegende Analyse untersucht die *inelastische* J/ψ-Produktion im Bereich der Elastizität $z < 0.9$ und bei Schwerpunktenergien von $30\,\mathrm{GeV} \leq W_{\gamma p} \leq 150\,\mathrm{GeV}$. Es liegen QCD-Vorhersagen in nächst führender Ordnung in α_s (NLO) vor, mit denen die experimentellen Resultate verglichen werden. Diese sind bei großen Werten von z bzw. kleinen Transversalimpulsen mit theoretischen Unsicherheiten behaftet. Daher wird die J/ψ-Produktion auch in einem eingeschränkten kinematischen Bereich $z < 0.8$ und $p_{t,\psi}^2 > 1\,\mathrm{GeV}^2$ untersucht.
Die bei HERA experimentell bestimmten Wirkungsquerschnitte als Funktion der Photon-Proton Schwerpunktenergie und die differentiellen Wirkungsquerschnitte in $p_{t,\psi}^2$ (Transversalimpulsverteilung) bzw. z (Elastizitätsverteilung) werden präsentiert und mit den QCD-Rechnungen für den Photon-Gluon Fusionsmechanismus im Colour Singlet bzw. Colour-Octet Modell verglichen. Weiterhin wird in dieser Arbeit eine Methode zur Messung der Gluondichte bis zu Werten von $x_g \approx 10^{-3}$ vorgestellt.

Weitere Prozesse bei HERA, die zur Untersuchung der Gluondichte geeignet sind, sind die Erzeugung leichter Quark-Antiquarkpaare bzw. ungebundener $c\bar{c}$-Zustände durch Photon-Gluon Fusion. Indirekt kann man die Gluondichte bestimmen aus der logarithmischen Ableitung $dF_2/d\ln(Q^2)$ der Strukturfunktion $F_2(x, Q^2)$ (scaling violation) [1, 2].
Die elastische J/ψ-Produktion im Elastizitätsbereich $z \approx 1$ kann als eine Wechselwirkung ohne Austausch von Farbladung zwischen Proton und Photon angesehen werden. In einem neueren störungstheoretischen Modell, welches von Ryskin vorgeschlagen wurde, wird diese Wechselwirkung in führender Ordnung durch einen Zwei-Gluon Austausch beschrieben. Der Wirkungsquerschnitt für diesen Prozeß ist demnach sensitiv auf das Quadrat der Gluondichte im Proton.

Die Untersuchung von J/ψ-Mesonen erfolgt in dieser Arbeit über ihren leptonischen Zerfall. Das Verzweigungsverhältnis für den Zerfall von J/ψ-Mesonen in Elektronen bzw. Myonen beträgt jeweils etwa 6%. Da die Zerfallsleptonen in der Regel mit kleinen Transversalimpulsen ($p_t \approx 1\,\mathrm{GeV}$) erzeugt werden, kommt der Untersuchung des Leptonnachweises und der verwendeten Trigger für die Analyse eine zentrale Bedeutung zu. Myonen und Elektronen werden im Flüssig-Argon Kalorimeter nachgewiesen. Myonen können ebenfalls im Myondetektor nachgewiesen werden.
Das gestreute Positron wird bei den Ereignissen der J/ψ-Produktion in der Regel nicht im Detektor nachgewiesen. Daher müssen Trigger konzipiert werden, die auf die Zerfallsleptonen sensitiv sind. Zur Selektion inelastisch erzeugter J/ψ-Mesonen mit myonischem Zerfall tragen fast ausschließlich solche Trigger bei, bei denen mindestens ein Zerfallsmyon im Myondetektor nachgewiesen wird. Hierfür ist allerdings ein Transversalimpuls von $p_{t,\mu} \gtrsim 1 - 2\,\mathrm{GeV}$ erforderlich.

Gliederung der Arbeit

Nach dieser Einleitung wird im **zweiten** Kapitel ein Überblick über den Speicherring HERA und den H1-Detektor gegeben.
Im **dritten** Kapitel werden verschiedene Modelle für die J/ψ-Erzeugung bei HERA mit Schwerpunkt auf dem Photon-Gluon Fusionsmechanismus vorgestellt.
Eine Beschreibung des H1-Triggers mit Schwerpunkt auf den für diese Analyse verwendeten Triggerkomponenten wird im **vierten** Kapitel gegeben.
Im **fünften** Kapitel werden die Nachweismethoden von Leptonen im Kalorimeter sowie von Myonen im H1-Myonsystem beschrieben.
Die H1-Datenselektion und die für diese Analyse verwendeten Selektionsschnitte werden im **sechsten** Kapitel vorgestellt.
Im **siebten** Kapitel wird die Rekonstruktion der für die J/ψ-Analyse verwendeten kinematischen Variablen aufgezeigt und ein Vergleich zwischen gemessenen Verteilungen und den Vorhersagen im Colour-Singlet Modell mit Hilfe von simulierten Ereignissen vorgenommen.
Die Bestimmung des Wirkungsquerschnittes im Positron-Proton System bzw. im Photon-Proton System und die Berechnung differentieller Wirkungsquerschnitte sind im **achten** Kapitel dargestellt, in dem auch die Ergebnisse diskutiert werden.

Kapitel 2

Das Experiment

In diesem Kapitel wird das Experiment beschrieben, an dem die Daten für die vorliegende Arbeit genommen wurden. Zunächst wird der Positron-Proton Speicherring[1] **HERA** vorgestellt. Danach werden der **H1**-Detektor und speziell die für die Analyse der (inelastischen) J/ψ-Produktion verwendeten Detektorteile beschrieben.

2.1 Der Speicherring HERA

Am Positron-Proton (ep) Speicherring HERA, dessen Umfang 6335 m beträgt, werden Protonen mit einer Energie von 820 GeV und Positronen mit 27.55 GeV an zwei Wechselwirkungspunkten zur Kollision gebracht. Die ep-Schwerpunktenergie

$$s = (P + k)^2 \tag{2.1}$$

ist somit $\sqrt{s} \approx 300\,\mathrm{GeV}$. P und k sind die Viererimpulse der einfallenden Protonen bzw. Positronen.
Ein schematisches Bild des Speicherrings HERA und seiner Vorbeschleuniger befindet sich in Abbildung 2.1. Die Protonen werden im Linac III, DESY III und PETRA auf 40 GeV vorbeschleunigt und anschließend in HERA injiziert, wo sie auf ihre Sollenergie beschleunigt werden. Die Positronen gelangen über LINAC II, DESY II und PETRA II mit 12 GeV in den HERA-Ring .
In Tabelle 2.1 sind einige wichtige Kenndaten von HERA für die Datennahmeperioden 1994 und 1995 dargestellt. Die an den Wechselwirkungspunkten plazierten Großdetektoren **H1** und **ZEUS** weisen die entstehenden Wechselwirkungsprodukte nach. Ein wesentliches Ziel ist die Entschlüsselung der Protonstruktur (siehe Einleitung).
Zwei weitere Experimente benutzen jeweils nur den Positron- bzw. Protonstrahl des HERA Speicherrings. Ziel des **HERMES** Experimentes, das seit 1994 Daten aufzeichnet, ist die Messung der Protonspinstruktur. Hierfür werden longitudinal polarisierte

[1] seit 1994 werden Positronen statt Elektronen verwendet, um die Strahllebensdauer zu erhöhen.

Parameter	1994		1995		Design	
	e^+	p	e^+	p	e^+	p
Anzahl der Teichenpakete	168	170	189	180	210	210
mittlerer Strahlstrom [mA]	17	42	18.4	54	58	163
maximaler Strahlstrom [mA]	30.9	53.8	36	73.3	58	163
spezifische Luminosität $[cm^{-2}s^{-1}mA^{-2}]$	3.62×10^{29}		4.06×10^{29}		4×10^{29}	
maximale Luminosität $[cm^{-2}s^{-1}]$	4.3×10^{30}		5.9×10^{30}		16×10^{30}	
integrierte Luminosität $[nb^{-1}]$	4977		11055		10^5	

Tabelle 2.1: *Ausgewählte Kenndaten von HERA aus den Jahren 1994 und 1995 [3] und die Design-Werte*



Abbildung 2.1: *Schaubild des Speicherrings HERA (rechts) und seiner Vorbeschleuniger (links)*

Positronen des HERA-Strahls auf polarisierte Gastargets geschossen. Mit dem **HERA-B** Experiment, das sich in der Aufbauphase befindet, soll die der CP-Verletzung in B-Zerfällen gemessen werden. Zur Erzeugung von B-Mesonen werden Kupfer- bzw. Aluminiumdrähte an den äußeren Rand des Protonstrahls gefahren.

2.2 Der H1-Detektor

Ein Gesamtbild des H1-Detektors [5] ist in Abbildung 2.3 abgebildet. Charakteristisch ist der asymmetrische Aufbau des Detektors. In Richtung des Protonstrahls ist der Detektor aufwendiger instrumentiert als in Positronflugrichtung. Hiermit wird der Tatsache Rechnung getragen, daß der überwiegende Anteil der bei ep-Wechselwirkungen entstehenden Teilchen aufgrund der hohen Protonenergien in Richtung des Protonstrahls erzeugt wird.
Die meisten Detektorkomponenten sind radialsymmetrisch bezüglich der Strahlachse aufgebaut. Die wesentlichen Komponenten des H1-Detektors sind das Spurkammersystem $\boxed{2}$ $\boxed{3}$, radial daran anschließend das Flüssig-Argon Kalorimeter $\boxed{4}$ $\boxed{5}$. Diese Detektoren sind umgeben von einer supraleitenden Spule $\boxed{6}$, die ein Magnetfeld von 1.2 T erzeugt. Außerhalb der Spule befindet sich das instrumentierte Eisen $\boxed{10}$, welches einerseits als Rückflußjoch für den magnetischen Fluß dient und andererseits zum Myonnachweis verwendet wird. Zum Myonnachweis in Vorwärtsrichtung dient das Vorwärtsmyonspektrometer $\boxed{11}$.
In Rückwärtsrichtung befindet sich zwischen Spurkammersystem und instrumentierten Eisen das rückwärtige elektromagnetische Kalorimeter BEMC [2] $\boxed{12}$ (ab 1995 ersetzt durch das SPACAL [3]).

2.2.1 Das H1-Koordinatensystem



Abbildung 2.2: *Das H1-Koordinatensystem*

[2]BEMC: Backward Electromagnetic Calorimeter
[3]SPACAL: Spagetti Calorimeter

Das H1-Koordinatensystem ist ein rechtshändiges kartesisches Koordinatensystem (siehe Abbildung 2.2). Die Protonflugrichtung definiert die positive z-Achse. Die x-Achse ist die horizontale Achse in der Ebene senkrecht zur Strahlachse, die y-Achse entsprechend die vertikale Achse in dieser Ebene.
Der Koordinatenursprung liegt am Punkt der nominellen ep-Wechselwirkung. Dieser Punkt ist der Mittelpunkt der zylindrisch aufgebauten zentralen Driftkammer.
In Polarkoordinaten, die aufgrund der Radialsymmetrie des Detektors häufig verwendet werden, ist R der Abstand vom Koordinatenursprung, θ der Winkel zwischen dem Ortsvektor eines Punktes und der z-Achse und ϕ der Winkel der Projektion des Ortsvektors in die x-y-Ebene relativ zur x-Achse.
Der Transversalimpuls p_t eines Teilches ist der Betrag der Projektion des Impulsvektors auf die x-y-Ebene.
Als *Vorwärtsrichtung* wird die Richtung der auslaufendenen Protonen bezeichnet (z-Achse).

2.2.2 Das Spurkammersystem

Das Spurkammersystem des H1-Detektors dient zur Bestimmung der Impulse geladener Teilchen und besteht aus den zylindrisch aufgebauten zentralen Driftkammern CJC1 und CJC2, den z-Kammern CIZ und COZ – Driftkammern zur Messung der z-Koordinate von Teilchen – und den Proportionalkammern CIP und COP. In Vorwärtsrichtung schließt sich das Vorwärtsspurkammersystem an, welches aus drei sogenannten Supermodulen aufgebaut ist. Zwischen der zentralen Spurkammer und dem rückwärtigen Kalorimeter befindet sich die Rückwärtsproportionalkammer, die 1995 durch eine Driftkammer ersetzt wurde. Eine schematische Übersicht über das Spurkammersystem in der Seitenansicht ist in Abbildung 2.4 gegeben.

Im zentralen Spurkammersystem werden die Vierervektoren der Zerfallsleptonen des J/ψ-Mesons bestimmt im Polarwinkelbereich $20° \leq \theta \leq 160°$. Der Untergrundanteil in diesem Bereich ist niedrig und die Qualität der Spurrekonstruktion gut.
Zur Rekonstruktion kinematischer Variablen werden Spuren aus dem zentralen und dem Vorwärtsspurkammersystem verwendet ($8° \leq \theta \leq 170°$).

Zentrale Spurkammern

Die zentralen Driftkammern **CJC1** und **CJC2** [7] (central jet chamber) stellen den wichtigsten Teil der zentralen Spurkammern dar. Ihr Aufbau folgt dem der Jetkammern am JADE-Detektor [8] am Speicherring PETRA.
Die Driftkammern sind in Abbildung 2.5 im radialen Querschnitt abgebildet. Es gibt 30 Driftzellen in CJC1 und 60 in CJC2 mit insgesamt 56 Drahtlagen in radialer Richtung. Die Zellen sind um 30° zur Radialen verkippt. Hierdurch kann man den Teilchendurchgang mit einer hohen Zeitauflösung bestimmen (≤ 1 ns), da jede Spur die Drahtebene mindestens einmal kreuzt. Auf diese Weise können beispielsweise Myonen der kos-



Abbildung 2.3: *Der H1-Detektor*



Abbildung 2.4: *Seitenansicht des H1-Spurkammersystems (1994)*

mischen Höhenstrahlung erkannt werden, die zwischen zwei Wechselwirkungen den Detektor durchqueren. Der Polarwinkelbereich, in dem vom Wechselwirkungspunkt kommende Teilchen sowohl CJC1 als auch CJC2 durchqueren, ist $25° \leq \theta \leq 155°$.

Die Ortsauflösung beträgt in der x-y-Ebene, der Driftebene, $\sigma_{xy} = 145\,\mu m$. Für den Transversalimpuls der Teilchen (Impuls in x-y-Ebene) ergibt sich eine Auflösung von $\sigma_{p_t}/p_t^2 \approx 0.01$ GeV^{-1}. Der spezifische Energieverlust dE/dx kann auf 10% genau bestimmt werden. Die Bestimmung der z-Koordinate erfolgt durch Messung der Ladungsteilung. Die mit dieser Methode erzielte Auflösung in z ist $\sigma_z = 2.2\,\text{cm}$.
Zur Verbesserung der z-Auflösung dienen die Driftkammern **CIZ** (central inner z-chamber) und **COZ** (central outer z-chamber). In ihnen kann die z-Position einer Teilchenspur mit einer Genauigkeit von $\sigma_z \approx 300\ \mu m$ bestimmt werden.

Die Jetkammern dienen nicht nur zur Spurerkennung sondern werden auch zum Triggern von Ereignissen verwendet (DC-Rϕ Trigger).
Die Vieldrahtproportionalkammern **CIP** (central inner proportional chamber) und **COP** (cental outer proportional chamber) werden ausschließlich zum Triggern verwendet (z-Vertex-Trigger). Eine ausführliche Beschreibung des H1-Triggersystems erfolgt in Kapitel 4.



Abbildung 2.5: *Radiale Ansicht der zentralen Spurkammer*

Vorwärtsspurkammersystem und rückwärtige Proportionalkammer

- Das Vorwärtsspurkammersystem besteht aus drei sogenannten Supermodulen. Jedes dieser Module enthält jeweils eine **radiale** und **planare** Driftkammer, ferner Vorwärtsproportionalkammern **FPC** (forward proportional chamber) und Übergangsstrahlungsdetektoren zur Trennung von hochenergetischen Pionen und Elektronen. Im Vorwärtsspurkammersystem können geladene Teilchen nachgewiesen werden, die im Polarwinkelbereich von $5° \leq \theta \leq 25°$ den H1-Detektor durchqueren.
  Die **radialen** Driftkammern bestehen jeweils aus 48 Zellen, die **planaren** aus 32. Die Impulsauflösung beträgt $\sigma_p/p^2 < 0.003$ GeV^{-1}, die Auflösung in θ und ϕ ist $\sigma_{\theta,\phi} < 1$ mrad.
  Die Vorwärtsproportionalkammern werden zu Triggerzwecken benutzt.

- Die rückwärtige Proportionalkammer deckt den Winkelbereich $155° \leq \theta \leq 175°$ ab. Sie besteht aus insgesamt vier Anodendrahtebenen. Sie dient vor allem zur Rekonstruktion von Teilchenspuren, die im hinter ihr liegenden Kalorimeter (BEMC) nachgewiesen werden.

2.3 Kalorimeter

Das H1-Kalorimeter hat die Aufgabe, Elektronen, Myonen, neutrale Teilchen sowie Teilchenjets mit hoher Teilchendichte nachzuweisen. Es besteht aus dem **Flüssig-Argon** Kalorimeter, welches die Spurkammern im vorderen und zentralen Bereich umschließt, dem rückwärtigen Kalorimeter **BEMC** bzw. **SPACAL**, dem **PLUG** Kalorimeter, welches Teilchen in extremer Vorwärtsrichtung nachweist sowie dem 'Tail Catcher', der Teil des instrumentierten Eisens ist und Schauerteilchen detektiert, die in den weiter innenliegenden Kalorimetern nicht absorbiert wurden. Dieser letztere Teil des Kalorimeters wird in Abschnitt 2.4 beschrieben.

2.3.1 Das Flüssig-Argon-Kalorimeter

Das Flüssig-Argon-Kalorimeter [9] (engl. Liquid Argon Calorimeter; Abkürzung: **LAr**) überdeckt einen Polarwinkelbereich von $4° \leq \theta \leq 153°$. Es liegt vollständig innerhalb der supraleitenden Magnetfeldspule. Es zeichnet sich aus durch hohe Stabilität, einfache Kalibration, und eine feine Granularität zur Elektron-Pion Separation.
Es ist unterteilt in einen inneren elektromagnetischen Teil und einen äußeren hadronischen Teil. Längs der Strahlachse ist es unterteilt in acht Module. Die beiden vorderen bilden den Vorwärtsbereich, daran schließen sich fünf Module im Zentralbereich an. Das hinterste Modul (BBE) hat nur eine elektromagnetische Komponente. Schematisch ist der beschriebene Aufbau in Abbildung 2.6 dargestellt.

- **Elektromagnetischer Teil**: Der elektromagnetische Teil des LAr-Kalorimeters ist aufgebaut aus 2.4 cm dicken Absorberplatten aus Blei. In den 2.35 cm dicken Spalten zwischen zwei Bleiplatten befindet sich flüssiges Argon. In Vorwärtsrichtung hat das elektromagnetische Kalorimeter eine Dicke von 30, im Zentralbereich von 20 Strahlungslängen. Um eine feine Segmentierung für einen genauen Elektronnachweis zu erreichen, werden insgesamt 31000 Kanäle ausgelesen. Die Energieauflösung wurde am Teststrahl bestimmt zu: $\sigma_E/E = (10\% - 13\%)/\sqrt{E} \oplus 1\%$.

- **Hadronischer Teil**: Im hadronischen Teil werden 1.9 cm dicke Absorberplatten aus Edelstahl verwendet. Zwischen je zwei Absorberplatten befinden sich flüssiges Argon. Die Anzahl der hadronischen Wechselwirkungslängen variiert zwischen vier im Zentralbereich und bis zu acht in Vorwärtsrichtung. In Abbildung 2.7 sind die Isolinien gleicher Wechselwirkungslängen im LAr-Kalorimeter dargestellt. Die Auslese erfogt in ca. 13000 Kanälen. Die Energieauflösung beträgt: $\sigma_E/E = 50\%/\sqrt{E} \oplus 2\%$.

Im Rahmen dieser Analyse dient das LAr-Kalorimeter zum Leptonnachweis und wird zur Bestimmung kinematischer Variablen eingesetzt.