Photoproduktion bei HERA unter Nachweis eines gestreuten Protons im H1-Vorwärtsprotonspektrometer

Dissertation

zur Erlangung des Doktorgrades
des Fachbereichs Physik
der Universität Hamburg

vorgelegt von

Carsten Wittek

aus Hamburg

Hamburg

1997

Gutachter der Dissertation:	Prof. Dr. F.-W. Büßer
	Prof. Dr. W. Schmidt-Parzefall
Gutachter der Disputation:	Prof. Dr. F.-W. Büßer
	Prof. Dr. G. Heinzelmann
Datum der Disputation:	02.02.1998
Dekan des Fachbereichs Physik und Vorsitzender des Promotionsausschusses:	Prof. Dr. G. Kramer

Abstract

Photoproduction at HERA detecting a scattered proton with the H1 Forward Proton Spectrometer

In this thesis the measurement of the differential semi-inclusive cross section in Photoproduction with a leading proton is presented. The data were taken 1995 using the H1 detector at the HERA ep storage ring, the corresponding integrated Luminosity is $\mathcal{L} = 2.05\,\mathrm{pb}^{-1}$. Protons were measured in the energy range of $580\,\mathrm{GeV} < E_{p'} < 740\,\mathrm{GeV}$ having a transverse momentum of $p_\perp < 200\,\mathrm{MeV/c}$. The cross section $\mathrm{d}\sigma(\gamma p \to X p')/\mathrm{d}E_{p'}$ was calculated at $<W> \; = <\sqrt{s_{\gamma p}}> = 90$, 187 and 231 GeV.

The detection of leading protons with the H1 Forward Proton Spectometer (FPS) was possible for the first time in 1995. The FPS consists of two detector stations at 81 and 90 m and the proton magnets located between these stations and the interaction vertex. Using the measured proton track and the known beam optics, the proton energy $E_{p'}$ and the scattering angle $\vartheta_{p'}$ at vertex position are reconstructed. The resolution is $\Delta E_{p'} = 2 - 6\,\mathrm{GeV}$, $\Delta\vartheta_x = 5 - 10\,\mu\mathrm{rad}$ and $\Delta\vartheta_y = 5 - 100\,\mu\mathrm{rad}$ depending on the other quantities at a time. These values meet the design requirements.

The selection efficiency and acceptance as well as corrections used for the cross section measurement are calculated. The differential cross section is of the order of 7 nb/GeV and does within errors not depend on $E_{p'}$ and $<W>$. A Regge fit shows the data to be compatible with π° exchange. To get information about the contribution from hard Photoproduction 2-jet events have been selected using a cone algorithm. The 2-jet cross section is of the order of 140 pb/GeV. A comparison with predictions of the POMPYT model shows that the jet data can be described by Pion and Pomeron exchange within the Regge picture.

Kurzfassung

Gegenstand dieser Arbeit ist die Bestimmung des differentiellen, semi-inklusiven Wirkungsquerschnitts für Photoproduktionsereignisse mit einem unter kleinem Winkel in Vorwärtsrichtung gestreuten Proton. Die untersuchten Daten wurden 1995 am HERA-Speicherring mit dem H1-Detektor aufgezeichnet und entsprechen einer integrierten Luminosität von $\mathcal{L} = 2.05\,\mathrm{pb}^{-1}$. Es wurden Protonen im Energiebereich von $580\,\mathrm{GeV} < E_{p'} < 740\,\mathrm{GeV}$ mit einem Transversalimpuls von $p_\perp < 200\,\mathrm{MeV/c}$ gemessen. Der Wirkungsquerschnitt $\mathrm{d}\sigma(\gamma p \to X p')/\mathrm{d}E_{p'}$ wurde für $<W> \; = <\sqrt{s_{\gamma p}}> = 90$, 187 und 231 GeV bestimmt.

Zum Nachweis der unter kleinem Winkel in Vorwärtsrichtung gestreuten Protonen, wurde erstmals das H1-Vorwärtsprotonspektrometer benutzt. Das Vorwärtsprotonspektrometer besteht aus zwei Detektorstationen bei 81 und 90 m, sowie aus den Magneten des Protonstrahlrohrs, die sich zwischen den Stationen und dem Wechselwirkungspunkt befinden. Mit der gemessenen Protonspur und der bekannten Dispersion der Magnetstrecke werden die Energie $E_{p'}$ und der Streuwinkel $\vartheta_{p'}$ des Protons am Wechselwirkungspunkt rekonstruiert. Die erreichte Auflösung beträgt $\Delta E_{p'} = 2 - 6\,\mathrm{GeV}$, $\Delta\vartheta_x = 5 - 10\,\mu\mathrm{rad}$ und $\Delta\vartheta_y = 5 - 100\,\mu\mathrm{rad}$ in Abhängigkeit von den jeweils anderen Größen. Diese Werte sind in Übereinstimmung mit den Konstruktionsvorgaben für das Vorwärtsprotonspektrometer.

Die Selektionseffizienz und die Akzeptanz, sowie Korrekturen zur Bestimmung des Wirkungsquerschnitts wurden ermittelt. Der differentielle Wirkungsquerschnitt liegt in der Größenordnung von 7 nb/GeV und zeigt im Rahmen der Fehler keine Abhängigkeit von $E_{p'}$ und $<W>$. Eine Anpassung mit den Vorhersagen der Regge-Theorie zeigt, daß die betrachteten Daten mit der Annahme von π°-Austausch verträglich sind. Um Informationen über den Anteil harter Photoproduktionsprozesse zu gewinnen, wurde mit Hilfe eines sogenannten Kegel-Algorithmus eine Selektion von 2-jet Ereignissen durchgeführt. Der 2-jet Wirkungsquerschnitt ist in der Größenordnung von 140 pb/GeV. Ein Vergleich mit den Vorhersagen des POMPYT Modells zeigt, daß eine Beschreibung der Jetdaten im Regge-Bild mit Anteilen des Pion- und des Pomeron-Austauschs möglich ist.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Streuexperimente hochenergetischer Leptonen an Hadronen haben in den letzten 30 Jahren wesentlich zum Verständnis über den Aufbau der Materie beigetragen. So wurde in den späten sechziger Jahren die Substruktur des Protons am SLAC entdeckt und mit den von Gell-Mann postulierten Quarks identifiziert.

Der Speicherring HERA ermöglicht Kollisionen von Positronen (Elektronen) mit einer Energie von 27.6 GeV und Protonen mit einer Energie von 820 GeV. Die erreichbare Schwerpunktsenergie beträgt $\sqrt{s} \approx 300\,\mathrm{GeV}$, was etwa eine Größenordnung mehr als bei Experimenten mit stationärem Target ist. Damit lassen sich Untersuchungen tiefunelastischer Streuprozesse bei großen Impulsüberträgen bis $Q^2 \approx 10^5\,\mathrm{GeV}^2$ als auch bei sehr kleinen Impulsbruchteilen $x \approx 5 \cdot 10^{-6}$ des gestreuten Quarks durchführen. Es ist möglich, Strukturen im Proton bis zu einer Größe von etwa 10^{-18} m aufzulösen.

Die Wechselwirkung bei Positron-Proton-Reaktionen[1] wird durch ein virtuelles Austauschboson (γ, Z°, oder $W^\pm$) vermittelt. Aufgrund der $1/Q^4$-Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts von Photonaustausch, spielen die Beiträge der Eichbosonen der schwachen Wechselwirkung erst bei hohen $Q^2 \approx 10^4\,\mathrm{GeV}^2$ eine nicht vernachlässigbare Rolle.

Reaktionen mit Photonaustausch bei $Q^2 \gtrsim 4\,\mathrm{GeV}^2$ werden als tiefunelastische Streuung (DIS) bezeichnet. Die tiefunelastische Streuung wird mittels störungstheoretischer Quantenchromodynamik als Streuung eines punktförmigen, virtuellen Photons an einem Parton des Protons betrachtet, da die Wellenlänge des Photons ($\sim 1/Q$) sehr viel kleiner als der Protonradius ist. Ist die Virtualität des Photons (Q^2) klein und die Streuung erfolgt durch (quasi-)reelle Photonen, spricht man von Photoproduktion. Photoproduktion zeigt Merkmale von Hadron-Hadron-Reaktionen, was in Vektormeson-Dominanz-Modellen durch Fluktuation des Photons in ein virtuelles Vektormeson erklärt wird. Photoproduktionsereignisse können bei HERA bis zu einer Schwerpunktsenergie im Photon-Proton-System von $W_{\gamma p} \approx 250\,\mathrm{GeV}$ durchgeführt werden.

Ein wesentliches Merkmal von Hadron-Hadron-Reaktionen ist der hohe Anteil diffraktiver Prozesse, deren Kennzeichen ein exponentieller Abfall der Verteilung des Impulsübertrags t, ein sich mit der Schwerpunktsenergie nur schwach ändernder Wirkungsquerschnitt und im Falle der Dissoziation eines der Streupartner ein zu $\exp(bt)/M^2$ proportionales Massespektrum sind. Unter diffraktiver Streuung versteht man einen Prozeß, bei dem die Stoßpartner peripher kollidieren. Dabei ist die Kopplungskonstante der starken Wechselwirkung groß und Störungsrechnung daher zur Berechnung der Wirkungsquerschnitte im all-

[1] 1995 wurde HERA mit Positronen betrieben. Wenn nicht anders angegeben, wird im folgenden nicht zwischen Elektronen und Positronen unterschieden.

gemeinen nicht anwendbar. Eine erfolgreiche Beschreibung ermöglicht die Regge-Theorie, welche die Wechselwirkung durch Austausch sogenannter Regge-Trajektorien beschreibt. Die diffraktive Streuung wird von einer farbneutralen Trajektorie mit den Quantenzahlen des Vakuums, der Pomeron-Trajektorie, vermittelt. In bestimmten kinematischen Bereichen, z.B. bei einem relativen Energieverlust des Protons größer als 5 – 10 %, tragen weitere Trajektorien, besonders die f- und π-Trajektorie zum Wirkungsquerschnitt bei.

Diffraktive Prozesse spielen bei HERA eine große Rolle, so wurde 1993 bei etwa 10 % der tiefunelastischen Ereignisse die Abwesenheit von Teilchen im Winkelbereich gefunden, der zwischen Protonrest und der Richtung des gestreuten Partons liegt [52, 53]. Diese Lücke in der Pseudorapidität $\eta = -\ln\tan\vartheta/2$ wird nicht erwartet, wenn man annimmt, daß zwischen dem gestreuten Quark und dem Protonrest ein Farbfeld besteht. Ein Farbfeld führt bei der Fragmentation zur Produktion von Hadronen, die diese Lücke auffüllen würden. Streuprozesse mit einer Rapiditätslücke lassen sich durch ein Modell der Streuung an einem farbneutralen Bestandteil des Protons erklären, welcher mit dem Pomeron identifiziert wird.

Es gibt eine Klasse von Ereignissen unter Austausch von Regge-Trajektorien, die sich durch ein hochenergetisches Proton (oder Neutron beim π^+-Austausch) im Endzustand auszeichnen, welches unter kleinem Winkel ($\vartheta \lesssim 1\,\mathrm{mrad}$) gestreut wird. Diese können im zentralen H1-Detektor nicht nachgewiesen werden, da sie ihn durch das Strahlrohr verlassen. Ihr Nachweis ist aber zur Prozeßidentifizierung und zur Messung aller kinematischen Größen des Endzustands unabdingbar, weshalb man spezialisierte Detektoren in einer Entfernung von ca. 50 – 100 m vom Zentraldetektor aufgebaut hat.

Am H1-Detektor werden seit 1995 zwei Detektorstationen in 81 und 90 m Entfernung vom Wechselwirkungspunkt betrieben. Sie sind ausgestattet mit Spurdetektoren aus szintillierenden Fasern, die mit positionsempfindlichen Vielkanalphotomultipliern ausgelesen werden. Zusammen mit den Magneten des Protonstrahlrohrs bilden die Detektorstationen das H1-Vorwärtsprotonspektrometer. Zur Messung des Protonimpulses und des Streuwinkels am Wechselwirkungspunkt nutzt man die bekannte Ablenkung des gestreuten Protons im Feld der Fokussiermagneten der Protonmaschine.

Ziel dieser Arbeit ist es, unter Nachweis hochenergetischer Protonen mit dem Vorwärtsprotonspektrometer, den differentiellen Wirkungsquerschnitt $\mathrm{d}\sigma(\gamma p \to X p')/\mathrm{d}E_{p'}$ für Photoproduktionsprozesse zu messen. Die Analyse erfolgt für Protonen mit einem Transversalimpuls von $p_\perp < 200\,\mathrm{MeV/c}$ und Energien von $580\,\mathrm{GeV} < E_{p'} < 740\,\mathrm{GeV}$.

Kapitel 1

Physik hochenergetischer Positron-Proton-Streuung

In diesem Kapitel werden zunächst die kinematischen Größen zur Beschreibung von ep-Streuung und die der diffraktiven Streuung definiert. Es folgt eine Einführung in die Theorie hochenergetischer ep-Streuung mit dem Schwerpunkt auf den Bereichen, die für diese Analyse benutzt werden. Es wird die Darstellung des Streuwirkungsquerschnitts mit Strukturfunktionen vorgestellt. Besonders die Photon-Proton-Streuung und die Photoproduktion sind für diese Arbeit von Bedeutung. Für das Verständnis der Photon-Proton-Streuung widmet sich ein Abschnitt der Struktur des Photons im Rahmen von Vektor-Meson-Dominanz-Modellen. Die Regge-Theorie wird eingeführt, da sie speziell für diffraktive Streuung von Bedeutung ist. Auf den Pion-Austausch wird in einem eigenen Abschnitt eingegangen, er trägt in dem kinematischen Bereich dieser Messung wesentlich zum Wirkungsquerschnitt bei. Weitere Abschnitte behandeln den Strukturfunktionsformalismus, sowie alternative Modelle zur Beschreibung diffraktiver Prozesse. Der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit der Implementierung der Modelle in den für diese Arbeit verwendeten Monte-Carlo-Simulationsprogrammen.

1.1 Kinematik

Abbildung 1.1 zeigt schematisch die Reaktion $e + p \to l + X$ im Quark-Parton-Modell für Photonaustausch. Das einlaufende Positron e wechselwirkt mit dem einlaufenden Proton p über den Austausch eines virtuellen Photons (γ^*). Im Ausgangszustand befindet sich ein auslaufendes Lepton (hier: ein Positron) l und der hadronische Endzustand X. Die Reaktion kann auch durch ein virtuelles Z° oder $W^\pm$, den Austauschbosonen der schwachen Wechselwirkung vermittelt werden. Im Falle des W-Austausches findet sich im Endzustand ein (Anti-)Neutrino anstelle des Positrons, man spricht von Reaktionen des geladenen Stroms (CC). Analog werden γ-, und Z°-Austausch als neutraler Strom (NC) bezeichnet. Im Quark-Parton-Modell streut das Austauschboson an einem Parton des Protons.

Im folgenden bezeichnen k und k' die Vierervektoren des einlaufenden und des auslaufenden Positrons; der Viererimpuls des einlaufenden Protons sei P. Ferner bezeichnen E_e,



Abbildung 1.1: *ep-Streuung unter Austausch eines virtuellen Photons im Quark-Parton-Modell.*

E_p und E'_e die Energien von einlaufendem Positron e und Proton p, sowie auslaufendem Positron e' im Laborsystem; der Streuwinkel des Positrons sei ϑ_e. Die quadrierte Schwerpunktsenergie s ist gegeben durch:

$$s = (k+P)^2 \approx 4E_eE_p \tag{1.1}$$

Die Näherung erhält man nach Vernachlässigung der Teilchenmassen, welches bei HERA-Energien eine gute Näherung ist. Falls nicht anders angegeben, werden die Teilchenmassen auch im folgenden vernachlässigt. Der Viererimpulsübertrag

$$Q^2 = -q^2 = -(k-k')^2 = 4E_eE'_e\cos^2\frac{\vartheta_e}{2} \tag{1.2}$$

ist ein Maß für die Virtualität des ausgetauschten Photons. Er bestimmt ferner das Auflösungsvermögen für Strukturen im Proton bei der Streuung, dieses beträgt etwa $\lambda = 1/Q$. Die Inelastizität

$$y = \frac{q\cdot P}{k\cdot P} = 1 - \frac{E'_e}{E_e}\sin^2\frac{\vartheta_e}{2} \tag{1.3}$$

entspricht im Quark-Parton-Modell dem relativen Energieverlust des Elektrons im Ruhesystem des Protons. Die Bjorken-Skalenvariable x ist definiert als:

$$x = \frac{Q^2}{2q\cdot P} = \frac{E_eE'_e\cos^2\frac{\vartheta_e}{2}}{E_p(E_e - E'_e\sin^2\frac{\vartheta_e}{2})} \tag{1.4}$$

Sie ist im Quark-Parton-Modell der Impulsbruchteil des Protons, den das Parton trägt. Aus der Energieerhaltung folgt:

$$Q^2 = xys \tag{1.5}$$

Die Variablen sind somit nicht unabhängig voneinander.

Eine weitere wichtige Größe ist die invariante Masse des hadronischen Endzustandes, bzw. der Schwerpunktsenergie im Photon-Proton-System:

$$W^2 = (q+P)^2 = ys - Q^2 = Q^2\frac{1-x}{x} = 4\cdot\left[E_pE_e - E_pE'_e\sin^2\frac{\vartheta_e}{2} - E_eE'_e\cos^2\frac{\vartheta_e}{2}\right] \tag{1.6}$$

1.1.1 Kinematik diffraktiver ep-Streuung



Abbildung 1.2: *Diffraktive ep-Streuung.*

Die diffraktive ep-Streuung ist in Abbildung 1.2 dargestellt, die Gegebenheiten am leptonischen Vertex sind unverändert. Das virtuelle Photon wechselwirkt bei der diffraktiven Streuung mit einem farbneutralen Bestandteil des Protons. Im Bild der Regge-Theorie (siehe Abschnitt 1.4) wird diffraktive Streuung durch Pomeron-Austausch ($\mathbb{P}$) beschrieben. Weitere sogenannte Trajektorien, wie ω-, f-, a- und die Pion-Trajektorie können ausgetauscht werden. Die Kinematik ist in allen Fällen die gleiche, daher kann „Pomeron" hier durch jede andere Trajektorie ersetzt werden.

Im folgenden wird auf die kinematischen Größen eingegangen, die bei den diffraktiven Streuprozessen eine Rolle spielen. Neben x, y und Q^2 werden weitere kinematische Größen verwendet. Im folgenden bezeichnen P' den Viererimpuls, $E_{p'}$ die Energie und $p_{\perp,p'}$ den Transversalimpuls des auslaufenden Protons, sowie m_p dessen Ruhemasse. Dann ist $p_{\mathbb{P}} = P - P'$ der Viererimpuls des Pomerons ($\mathbb{P}$). Die Größe $x_{\mathbb{P}}$ bezeichnet den Bruchteil des Protonimpulses, den das Proton bei der Streuung verliert:

$$x_{\mathbb{P}} = \frac{p_{\mathbb{P}} \cdot q}{P \cdot q} = \frac{M_X^2 + Q^2 - t}{W^2 + Q^2 - m_p^2} \tag{1.7}$$

$$= 1 - \frac{E_{p'}}{E_p} \tag{1.8}$$

Mit dieser Beziehung läßt sich auch das Quadrat der invarianten Masse des hadronischen Endzustands X berechnen. Für den Viererimpulsübertrag am Protonvertex gilt

$$\begin{aligned} t &= p_{\mathbb{P}}^2 = (P - P')^2 \\ &\approx t_{\min} - \frac{p_{\perp,p'}^2}{1 - x_{\mathbb{P}}} \end{aligned} \tag{1.9}$$

wobei $t_{\min}$ der minimale Impulsübertrag ist, der für die Reaktion notwendig ist:

$$t_{\min} = -\frac{x_{\mathbb{P}}^2 m_p^2}{1 - x_{\mathbb{P}}} \tag{1.10}$$

Nimmt man an, das Pomeron besäße eine Substruktur, ist es zweckmäßig β als Impulsbruchteil des gestreuten Partons am Pomeron zu definieren:

$$x = \beta \cdot x_{\mathbb{P}} \tag{1.11}$$

1.2 Streuwirkungsquerschnitt und Strukturfunktionen

Der totale differentielle Wirkungsquerschnitt für tiefunelastische Reaktionen des neutralen Stromes kann mit drei Strukturfunktionen $F_{1,2,3}$ in Abhängigkeit von x und Q^2 folgendermaßen ausgedrückt werden [51]:

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma(e^{\pm}p)}{\mathrm{d}x\mathrm{d}Q^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{xQ^4}\left[y^2 x F_1(x,Q^2) + (1-y)F_2(x,Q^2) \mp \left(y - \frac{y^2}{2}\right) x F_3(x,Q^2)\right] \tag{1.12}$$

Dieser sogenannte Born-Wirkungsquerschnitt berücksichtigt nur die störungstheoretisch niedrigste Ordnung der elektroschwachen Wechselwirkung ohne QED.

Über die Einführung der longitudinalen Strukturfunktion F_L, wird eine Beziehung zwischen F_1 und F_2 hergestellt:

$$F_L \equiv F_2 - 2xF_1 \tag{1.13}$$

In der Näherung des Quark-Parton-Modells, welches die Konstituenten des Protons als nicht wechselwirkende, punktförmige Teilchen mit Spin $\frac{1}{2}$ behandelt, wird $F_L = 0$, und man erhält die Callan-Gross-Beziehung $F_2 = 2xF_1$. Terme höherer Ordnung der störungstheoretischen Quantenchromodynamik bewirken eine Proportionalität von F_L zur Kopplungskonstanten der starken Wechselwirkung α_s.

Im Quark-Parton-Modell lassen sich die Strukturfunktionen folgendermaßen berechnen:

$$F_2^{\mathrm{L,R}}(x,Q^2) = \sum_f [xq_f(x,Q^2) + x\bar{q}_f(x,Q^2)] A_f^{\mathrm{L,R}}(Q^2) \tag{1.14}$$

$$xF_3^{\mathrm{L,R}}(x,Q^2) = \sum_f [xq_f(x,Q^2) - x\bar{q}_f(x,Q^2)] B_f^{\mathrm{L,R}}(Q^2) \tag{1.15}$$

Dabei sind $xq_f(x,Q^2)$ und $x\bar{q}_f(x,Q^2)$ die Wahrscheinlichkeiten ein Quark, bzw. ein Antiquark der Sorte f mit dem Impulsbruchteil x im Proton zu treffen, A_f und B_f sind die Kopplungskonstanten an das Austauschboson.

Die Kopplungskoeffizienten A_f und B_f sind unterschiedlich für links- (L) und rechtshändige (R) Elektronen, bzw. Positronen, sie können folgendermaßen geschrieben werden:

$$A_f^{\mathrm{L,R}}(Q^2) = e_f^2 - 2e_f(v_e \pm a_e)v_f P_Z + (v_e \pm a_e)^2(v_f^2 + a_f^2)P_Z^2 \tag{1.16}$$

$$B_f^{\mathrm{L,R}}(Q^2) = \mp 2e_f(v_e \pm a_e)a_f P_Z + (v_e \pm a_e)^2 v_f a_f P_Z^2 \tag{1.17}$$

Wobei e_f die elektrische Ladung eines Partons der Sorte f in Einheiten der Elementarladung ist, $v_f = [T_{3f} - 2e_f \sin^2\theta_W]/\sin^2\theta_W$ und $a_f = T_{3f}/\sin^2\theta_W$ sind die Standardmodell-Größen Vektor- und Axialkopplung ausgedrückt durch die dritte Komponente des schwachen Isospins. Es gilt $T_3 = -\frac{1}{2}$ für linkshändige Elektronen und d-Quarks, $T_3 = \frac{1}{2}$ für linkshändige Positronen und u-Quarks und $T_3 = 0$ für rechtshändige Elektronen und

Quarks. $P_Z = Q^2/(Q^2 + M_z^2)$ schließlich ist das Verhältnis von Z°- und γ-Propagator. In den obigen Ausdrücken gilt das $(-)$ für linkshändige Elektronen und rechtshändige Positronen. Für einen unpolarisierten Positronstrahl ergibt sich der Wirkungsquerschnitt als der Mittelwert von links- und rechtshändigem Querschnitt.

Ist Q^2 klein ($Q^2 \ll M_Z^2$), können alle Terme mit P_Z vernachlässigt werden und nur Photonaustausch spielt eine Rolle. Für die Koeffizienten A_f und B_f gilt dann

$$A_f = e_f^2, \quad B_f = 0$$

und somit

$$F_2(x, Q^2) = \sum_f [xq_f(x, Q^2) + x\bar{q}_f(x, Q^2)]e_f^2 \tag{1.18}$$

$$F_3(x, Q^2) = 0 \tag{1.19}$$

Damit und unter Verwendung von F_L vereinfacht sich der totale differentielle Wirkungsquerschnitt zu:

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma(e^\pm p)}{\mathrm{d}x\mathrm{d}Q^2} = \frac{2\pi\alpha^2}{xQ^4}\left[(1 + (1-y)^2)F_2(x, Q^2) - y^2 F_L(x, Q^2)\right] \tag{1.20}$$

1.2.1 Photon-Proton-Streuung

Die Formel (1.20) beschreibt die Positron-Proton-Streuung neutralen Stroms in dem Bereich wo nur der Photonaustausch eine Rolle spielt und Beiträge des Z°-, bzw. W-Austausches vernachlässigt werden können ($Q^2 \ll M_Z^2$). Das Positron kann als Quelle virtueller Photonen betrachtet werden, die mit dem Proton wechselwirken. Es ist daher möglich, die ep-Streuung als Photon-Proton-Streuung anzusehen und den Wirkungsquerschnitt dieser Reaktion für Photonen der Energie ν und der Virtualität q^2 folgendermaßen zu schreiben:

$$\sigma_T(\nu, q^2) = \frac{4\pi^2\alpha}{\nu} W_1(\nu, q^2) \tag{1.21}$$

$$\sigma_L(\nu, q^2) = \frac{4\pi^2\alpha}{\nu}\left[\left(1 - \frac{\nu^2}{q^2}\right) W_2(\nu, q^2) - W_1(\nu, q^2)\right] \tag{1.22}$$

wobei σ_T und σ_L die Wirkungsquerschnitte für transversal und longitudinal polarisierte Photonen bezeichnen und W_1 und W_2 die zwei unabhängigen Terme der allgemeinsten Form des hadronischen Tensors $W^{\mu\nu}$ sind, der die Wechselwirkung am hadronischen Vertex beschreibt.

Um diesen Ausdruck mit dem Wirkungsquerschnitt tiefunelastischer ep-Streuung (Gleichung (1.20)) in Beziehung zu setzen, müssen die $W_i(\nu, q^2)$ mittels einer Variablentransformation in die $F_i(x, Q^2)$ überführt werden, wobei $x = Q^2/(2P \cdot q) = Q^2/(2m_p\nu)$ und $Q^2 = -q^2$ ist. Dann erhält man:

$$F_1(x, Q^2) = \frac{Q^2}{4\pi^2\alpha}\frac{1}{2x}\sigma_T(x, Q^2) \tag{1.23}$$

$$F_2(x, Q^2) = \frac{Q^2}{4\pi^2\alpha}\left(1 - \frac{4m_p^2x^2}{ys}\right)(\sigma_T(x, Q^2) + \sigma_L(x, Q^2)) \tag{1.24}$$

Mit der Gleichung (1.13) ergibt sich für F_L:

$$F_L(x, Q^2) = \frac{Q^2}{4\pi^2\alpha}\sigma_L(x, Q^2) \tag{1.25}$$

Man erkennt, daß xF_1 den Teil des Wirkungsquerschnitts beschreibt, der durch den Austausch transversal polarisierter Photonen vermittelt wird, F_2 die Summe von transversalem und longitudinalem und F_L nur den longitudinalen Anteil.

Mit einer Variablentransformation und unter Vernachlässigung der Protonmasse, kann der totale differentielle Wirkungsquerschnitt für Photonaustausch in Abhängigkeit von y und Q^2 geschrieben werden als:

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma(e^{\pm}p)}{\mathrm{d}y\mathrm{d}Q^2} = \frac{\alpha}{2\pi}\frac{1}{yQ^2}[(1+(1-y)^2)\sigma_T(y, Q^2) + 2(1-y)\sigma_L(y, Q^2)] \tag{1.26}$$

Führt man nun das Verhältnis R von longitudinalem zu transversalem Wirkungsquerschnitt ein:

$$R(x, Q^2) \equiv \frac{\sigma_L}{\sigma_T} = \frac{F_L(x, Q^2)}{2xF_1(x, Q^2)} \tag{1.27}$$

ergibt sich die Beziehung zwischen den totalen Wirkungsquerschnitten transversal und longitudinal polarisierter virtueller Photonen und der Strukturfunktion F_2:

$$\sigma_T(x, Q^2) = \frac{4\pi^2\alpha}{Q^2}\left(1 + \frac{4m_p^2x^2}{Q^2}\right)\frac{1}{1+R(x, Q^2)} \cdot F_2(x, Q^2) \tag{1.28}$$

Mit dieser Relation kann der totale Photoproduktionswirkungsquerschnitt parametrisiert werden, wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird.

1.2.2 Photoproduktion

Von Photoproduktion spricht man im Grenzfall $Q^2 \to 0$, die Wechselwirkung wird durch quasi-reelle Photonen vermittelt. In diesem Fall kann der Beitrag von longitudinal polarisierten Photonen vernachlässigt werden:

$$Q^2 \approx 0 \quad \Rightarrow \quad \sigma_L = 0, \quad R = 0 \quad \text{und} \quad F_L = 0$$

Die Bjorken-Skalenvariable wird dann Null (mit 1.6) und hat keine physikalische Bedeutung mehr:

$$x = \frac{Q^2}{Q^2 + W^2 - m_p^2} \approx \frac{Q^2}{W^2} \approx 0$$

Mit Gleichung 1.2 folgt, daß der Streuwinkel des Positrons fast 180° beträgt, die Variable y vereinfacht sich daher zu:

$$y \approx 1 - \frac{E'_e}{E_e} \tag{1.29}$$

Die invariante Masse des gesamten hadronischen Endzustandes, bzw. die Schwerpunktsenergie im Photon-Protonsystem läßt sich nähern durch:

$$W_{\gamma p}^2 = W^2 = ys(1-x) \approx ys \tag{1.30}$$

Die invarianten Masse des hadronischen Endzustands X bei der diffraktiven Streuung läßt sich nähern zu:

$$M_X^2 = x_{\mathbb{P}} ys + t \approx x_{\mathbb{P}} W^2 \tag{1.31}$$

Bei Vernachlässigung des Beitrages longitudinal polarisierter Photonen zum Wirkungsquerschnitt, kann $\sigma_T(x, Q^2)$ mit dem totalen Photoproduktionsquerschnitt $\sigma_{\text{tot}}^{\gamma p}$ gleichgesetzt werden. Mit Gleichung 1.28 folgt für den totalen Wirkungsquerschnitt *reeller* Photon-Proton-Streuung, der nur von einer kinematischen Variable (hier wurde $W_{\gamma p}$ gewählt) abhängt:

$$\sigma_{\text{tot}}^{\gamma p}(W_{\gamma p}) = \frac{4\pi^2\alpha}{Q^2} F_2(x, Q^2)\bigg|_{Q^2=0} \tag{1.32}$$

Daraus folgt, daß $F_2 \propto Q^2$ für $Q^2 \to 0$, da der Wirkungsquerschnitt eine endliche Größe ist.

Die Messung des totalen Photoproduktionswirkungsquerschnitts über eine Messung von F_2 bei $Q^2 = 0$ ist praktisch nicht möglich, daher geht man vom differentiellen Wirkungsquerschnitt in Formel (1.26) aus. Schreibt man die Formel für den Grenzfall reeller Photoproduktion, so erhält man:

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma(ep)}{\mathrm{d}y\mathrm{d}Q^2} = \frac{\alpha}{2\pi Q^2}\left(\frac{(1+(1-y)^2)}{y}\right) \cdot \sigma_{\text{tot}}^{\gamma p}(ys) \tag{1.33}$$

Eine verbesserte Beschreibung ergibt sich, wenn man die erweiterte Weizsäcker-Williams-Näherung [6, 7, 8] für den Photonfluß verwendet:

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma(ep)}{\mathrm{d}y\mathrm{d}Q^2} = \mathcal{F}_{\gamma/e}(y, Q^2) \cdot \sigma_{\text{tot}}^{\gamma p}(ys) \tag{1.34}$$

Dabei ist

$$\mathcal{F}_{\gamma/e}(y, Q^2) = \frac{\alpha}{2\pi Q^2}\left(\frac{(1+(1-y)^2)}{y} - \frac{2(1-y)}{y}\frac{Q^2_{\text{min}}}{Q^2}\right) \tag{1.35}$$

und $Q^2_{\text{min}} = m_e^2 y^2/(1-y)$ ist die minimale Virtualität des Photons bei festem y. Die erweiterte Weizsäcker-Williams-Näherung für den Photonfluß $\mathcal{F}_{\gamma/e}$ gibt die Wahrscheinlichkeit an, daß ein Photon mit dem Energieanteil y und der Virtualität Q^2 vom Positron abgestrahlt wird. In dieser Betrachtungsweise wird die Positron-Proton-Streuung in zwei Schritte unterteilt: die Abstrahlung des Photons ist unabhängig von der anschließenden Wechselwirkung.

1.3 Die Struktur des Photons

Für das Verständnis der Photon-Proton-Streuung wird in diesem Abschnitt auf die Struktur des Photons und den Zusammenhang von Photon-Hadron- und Hadron-Hadron-Reaktionen eingegangen.

In der Klassifizierung der Elementarteilchen spielt das Photon die Rolle des Eichbosons und punktförmigen Teilchens, welches die elektromagnetische Wechselwirkung vermittelt. Es gibt weiterhin Gemeinsamkeiten von Reaktionen mit Photonaustausch mit hadronischen Wechselwirkungen, die darauf hindeuten, daß Photon-Proton-Wechselwirkungen gut im

Rahmen von Hadron-Hadron-Wechselwirkungen verstanden werden können. Die auffälligste Ähnlichkeit zwischen diesen Reaktionstypen ist die Abhängigkeit des totalen Wirkungsquerschnitts von der Schwerpunktsenergie (Abbildung 1.3). Sowohl Hadron-Proton-, als auch Photon-Proton-Reaktionen haben eine Resonanzregion bei kleinen Energien. Zu höheren Energien, ab einigen GeV, wird die Abhängigkeit strukturlos und flach und zeigt einen universellen, leichten Anstieg bei hohen Energien. Der totale Photon-Proton-Wirkungsquerschnitt ist etwa um den Faktor der Feinstrukturkonstanten kleiner als der Hadronische.



Abbildung 1.3: *Totale Wirkungsquerschnitte für Hadron-Hadron- und Photon-Hadron-Prozesse. (Aus [12])*

Ein weiterer Hinweis auf die hadronische Natur von Photon-Hadron-Wechselwirkungen ergibt sich aus dem Vergleich des Verhältnisses des elastischen Wirkungsquerschnitts zum totalen Wirkungsquerschnitt von Hadron-Hadron-Reaktionen mit Photon-Reaktionen (Abbildung 1.4). Für hadronische Reaktionen beträgt das Verhältnis etwa 10 – 20 %. Für den rein elektromagnetischen Prozeß der Proton-Compton-Streuung liegt es in der Größenordnung von α. Es erreicht aber für den totalen elastischen Querschnitt von Photon-Hadron-Reaktionen dasselbe Verhältnis wie bei Hadron-Hadron-Reaktionen. Dies wird durch den Beitrag von diffraktiver Photoproduktion neutraler Vektormesonen ($\gamma p \to V p'$) erklärt.

Desweiteren ist die Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts von der Masse M_X^2 von diffraktiven Prozessen, bei denen einer der Streupartner dissoziiert im Rahmen der Meßgenauigkeit gleich für elastische Hadron-Proton-Streuung und elastische Photoproduktion von Vektormesonen.



Abbildung 1.4: *Relativer Anteil des elastischen (a) und einfach diffraktiv-dissoziativen (b) Prozesses am totalen Wirkungsquerschnitt von Hadron-Hadron- und Photon-Hadron-Reaktionen. (Aus [14])*

1.3.1 Das Vektor-Meson-Dominanz-Modell

Die geschilderten Beobachtungen führten zur Formulierung des *Vektor-Meson-Dominanz-Modells* (VMD) [13], in welchem das Photon in ein hadronisches System mit den Quantenzahlen eines Vektormesons V fluktuieren kann und dann mit dem Proton wechselwirkt. Eine Bestätigung für diesen Ansatz erhält man aus dem Vergleich der Zeit t_f für die Fluktuation eines Photons in ein $q\bar{q}$-Paar (mit der Unschärferelation ergibt sich $t_f \approx 2E_\gamma/(Q^2 + m_V^2)$) und der Wechselwirkungszeit t_{int}. Für reelle und quasi-reelle Photonen läßt sich zeigen, daß $t_f \gg t_{\text{int}}$ gilt [14] und dieser Reaktionstyp mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

Das VMD-Modell beschreibt das Photon als die Superposition eines „reinen" Photons $|\gamma_{\rm b}>$, welches in der einfachsten Form des Modells überhaupt nicht mit Hadronen wechselwirkt, und eines hadronischen Anteils $\sqrt{\alpha}\,|h>$:

$$|\gamma>= \sqrt{Z_3}\,|\gamma_{\rm b}> +c\sqrt{\alpha}\,|h> \tag{1.36}$$

Dabei ist $Z_3 = 1 - c^2\alpha$ notwendig für die Normierung von $|\gamma>$ und $c = \mathcal{O}(1)$. Der Zustand $|h>$ muß dieselben Quantenzahlen wie das Photon haben ($J^{PC} = 1^{--}$, $Q = B = S = 0$), was für neutrale Vektormesonen im Grundzustand der Fall ist. Im einfachsten VMD-Modell ist die hadronische Komponente eine Superposition der drei Vektormesonen ρ^0, ω und ϕ:

$$c\sqrt{\alpha}\,|h>= \sum_{V=\rho^0,\omega,\phi} \frac{e}{f_V}\,|V>\,. \tag{1.37}$$

Der Faktor $(e/f_V)^2 = 4\pi\alpha/f_V^2$ ist die Wahrscheinlichkeit für den Übergang $\gamma \to V$. Anpassungen an Niederenergiemeßwerte ergeben für diese Faktoren 2.20 für das ρ^0, 23.6 für das ω und 18.4 für das ϕ [9]. Daraus ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, das Photon im VMD-Zustand vorzufinden zu 0.4 %. Der γp-Wirkungsquerschnitt ist nur deshalb von

VMD-Reaktionen dominiert, weil der hadronische $\rho^0 p$-Wirkungsquerschnitt viel größer als der punktförmige γp-Wirkungsquerschnitt ist.

Die elastische Photoproduktion von Vektormesonen ist in Abbildung 1.5a) gezeigt. Damit sich im Endzustand ein reelles Vektormeson befinden kann, muß die Wechselwirkung durch einen farbneutralen Zustand, das Pomeron ($\mathbb{P}$), vermittelt werden (siehe Abschnitt 1.4). Bei dieser Reaktion können das Vektormeson (Abbildung 1.5b), das Proton, oder beide dissoziieren, man spricht von einfach (SD) oder zweifach (DD) dissoziativer, diffraktiver Photoproduktion. Abbildungsteil (c) steht für nicht diffraktive unelastische Streuung, die nur mit phänomenologischen Modellen beschrieben werden kann.



Abbildung 1.5: *Beispiele für weiche Photoproduktion: a) diffraktiv elastisch, b) diffraktive Photondissoziation und c) nicht diffraktiv, unelastisch.*

Während diese Form des VMD-Modells Photoproduktionsexperimente mit einem stationärem Target gut beschreibt, ergeben sich Abweichungen bei hohen Energien, bzw. bei hohem Transveralimpuls im Endzustand (harte Photoproduktion). Diese werden in erweiterten VMD-Modellen berücksichtigt.

Eine Erweiterungsmöglichkeit sind sogenannte direkte Ereignisse, bei denen das reine Photon $|\gamma_b>$ mit einem Parton des Protons wechselwirkt (siehe Abbildung 1.6).



Abbildung 1.6: *Beispiele für harte, direkte Photoproduktion: a) QCD-Compton und b) Boson-Gluon-Fusion.*

Weiterhin kann man Fluktuationen in schwerere, bzw. nicht gebundene $q\bar{q}$-Zustände und mittels QCD-Strahlung Zustände mit zusätzlichen Quarks und Gluonen erlauben, also $|q\bar{q}q\bar{q}>$, $|q\bar{q}gg>$, usw. Diese Zustände wechselwirken nicht mehr als ein Teilchen, sondern die Partonen tragen einzeln zur Wechselwirkung bei, was zu Ereignistopologien mit hohem Transversalimpuls führen kann. Diese Art von Prozessen nennt man aufgelöste Photoproduktionsereignisse (Abbildung 1.7).

Zuletzt könnte man Fluktuationen in Leptonpaare berücksichtigen, da diese aber nicht



Abbildung 1.7: *Beispiele für harte, aufgelöste Photoproduktion: a) harter VMD-Prozeß und b) anomaler Prozeß.*

stark wechselwirken, ist ihr Beitrag vernachlässigbar gering.

1.3.2 Photonstrukturfunktionen

Die Beschreibung des Photons im Partonbild erlaubt es, den Formalismus der Strukturfunktionen analog zum Proton zu verwenden. Die Photonstrukturfunktionen lassen sich folgendermaßen schreiben:

$$F_1^\gamma \equiv \frac{Q^2}{4\pi^2\alpha}\frac{1}{2x}\sigma_{\mathrm{tt}} \tag{1.38}$$

$$F_2^\gamma \equiv \frac{Q^2}{4\pi^2\alpha}(\sigma_{tt} + \sigma_{\mathrm{tl}}) \tag{1.39}$$

Dabei bezeichnen σ_{tt} und σ_{tl} die einzigen zwei unabhängigen Komponenten des Matrixelementes der Reaktion $e^+e^- \to e^+e^-X$, bei der ein Elektron ein quasi-reelles Photon abstrahlt, welches durch ein virtuelles Austauschphoton mit dem anderen Elektron wechselwirkt. Es steht t für transversal und l für longitudinal polarisierte Photonzustände und x ist die Bjorken-Skalenvariable, die für ein masseloses Target die Form

$$x = \frac{Q^2}{Q^2 + W^2} \tag{1.40}$$

hat. Ist bei obiger e^+e^--Reaktion eines der Photonen quasi-reell, kann die Reaktion als tiefunelastische $e\gamma$-Streuung aufgefaßt werden (Vergleiche auch Abschnitt 1.2.2). Mit den Strukturfunktionen F_1^γ und F_2^γ kann der Wirkungsquerschnitt für tiefunelastische $e\gamma$-Streuung als

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma(e\gamma \to eX)}{\mathrm{d}x\mathrm{d}y} = \frac{4\pi\alpha^2 s}{Q^4}[(1-y)F_2^\gamma + xy^2F_1^\gamma] \tag{1.41}$$

– in Analogie zur ep-Streuung – geschrieben werden.

Wie bei den Protonstrukturfunktionen können die Photonstrukturfunktionen in Beziehung zu den Partonverteilungen im Photon gesetzt werden.

Die Photonstrukturfunktion F_2^γ wurde bei den Experimenten TPC/2γ, PLUTO, TOPAZ, OPAL, DELPHI, TASSO, JADE und AMY gemessen [15], die Partonverteilungen des Photons unter anderem bei H1 [16, 17, 18].

1.4 Regge Theorie

Photon-Hadron-Prozesse können gut im Rahmen von Hadron-Hadron-Reaktionen verstanden werden. Zur Beschreibung der Dynamik hadronischer Reaktionen hat sich die Regge-Theorie [19, 20, 29] bewährt, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden soll. Die Regge-Theorie wurde in den späten 50er Jahren, vor der Quantenchromodynamik, entwickelt. In früheren Modellen wurden Hadron-Hadron-Reaktion der Art $A + B \to C + D$ durch den Austausch eines virtuellen Teilchens mit den passenden Quantenzahlen - analog zum Photon in der QED - beschrieben, dies war z.B. ein Pion oder ein Rho. In der Regge-Theorie ist dieser Ansatz verallgemeinert zum Austausch von *Regge-Trajektorien*. Bevor darauf näher eingegangen wird, sollen noch die Begriffe s- und t-Kanal erläutert werden.

1.4.1 Der s- und der t-Kanal



Abbildung 1.8: *Zur Erläuterung der Begriffe s- und t-Kanal*

Die Reaktion $A + B \to C + D$ kann im s- oder im t-Kanal betrachtet werden (Abbildung 1.8).

Sei p_i der Viererimpuls des Teilchens i, so ist der Viererimpulsübertrag zum Quadrat t zwischen A und C (oder äquivalent zwischen B und D) definiert als:

$$t = (p_C - p_A)^2 = (p_B - p_D)^2$$

Es kann allerdings t auch als die quadrierte Schwerpunktsenergie der Reaktion $B + \bar{D} \to \bar{A} + C$[1] aufgefaßt werden:

$$t = (p_{\bar{A}} + p_C)^2 = (p_B + p_{\bar{D}})^2$$

Die quadrierte Schwerpunktsenergie s im System $A+B$ (oder äquivalent im System $C+D$) ist gegeben durch:

$$s = (p_A + p_B)^2 = (p_B - p_{\bar{A}})^2 = (p_C + p_D)^2 = (p_C - p_{\bar{D}})^2$$

Also kann s auch als quadrierter Viererimpulsübertrag der Reaktion $B + \bar{D} \to \bar{A} + C$ interpretiert werden.

[1] $\bar{A}$ bezeichnet das Antiteilchen von A.

1.4.2 Regge-Trajektorien

Gibt es einen Bindungszustand bei der t-Kanal-Reaktion mit Drehimpuls $l = L$ und der Masse M_B, so hat die t-Kanal Partialwellenamplitude $f_L(t)$ eine Polstelle bei $t = M_B^2$. Gibt es eine Resonanz im t-Kanal mit Drehimpuls $l = L$, der Masse M_R und der Breite Γ, so erhält man eine komplexe Polstelle bei $t = M_R^2 - \mathrm{i}M_R\Gamma$. Die Folge $f_l(t)$, $l = 0, 1, 2, \ldots$ kann durch eine Funktion $f(l,t)$ verallgemeinert werden, die an den Stellen $l = 0, 1, 2, \ldots$ mit $f_l(t)$ übereinstimmt und auch für komplexe l definiert ist. Die Folge von Polen für $l = L_1, L_2, \ldots$ für jeweils $t = t_1, t_2, \ldots$ wird als fortschreitender Regge-Pol bei $l = \alpha(t)$ interpretiert. Die Funktion $\alpha(t)$ ist eine Trajektorienfunktion, so daß $\alpha(t_1) = L_1, \ldots$.

Diese Regge-Trajektorien sind Funktionen von t, folgender Form:

$$\alpha(t) = \alpha_0 + \alpha' t$$

Dabei heißen α_0 Achsenabschnitt und α' Steigung der Trajektorie. Im Fall der t-Kanal-Reaktion, entsprechen ganzzahlige Werte von α dem Spin J eines reellen Teilchens der Masse $\sqrt{t}$. Dieser Zusammenhang ist in der Chew-Frautschi-Darstellung [21] zu erkennen, der die Trajektorien und Teilchen in der (t, J)-Ebene zeigt (Abbildung 1.9). Abgesehen vom Spin sind die Quantenzahlen der Teilchen einer Trajektorie identisch. Bei der s-Kanal-Reaktion ist t der Viererimpulsübertrag zum Quadrat und negativ.



Abbildung 1.9: *Chew-Frautschi-Darstellung.*

Die wichtigsten Trajektorien sind:

Pomeron	$\alpha_{\mathbb{P}}(t) = \alpha_{\mathbb{P}}(0) + \alpha'_{\mathbb{P}} \cdot t$	$I = 0,\ P = C = +1$
Reggeon	$\alpha_{\mathbb{R}}(t) \approx 0.55 + 0.86\,\mathrm{GeV}^{-2} \cdot t$	siehe Text
Pion	$\alpha_\pi(t) \approx 0 + 0.8\,\mathrm{GeV}^{-2} \cdot t$	$I = 1,\ P = -1,\ C_{\pi_0} = +1$

Die Pomeron-Trajektorie hat die Quantenzahlen des Vakuums, sie beschreibt diffraktive Streuung (s.u.). Die Reggeon-Trajektorie ist eine effektive Trajektorie aus einer gemeinsamen Anpassung an die vier Trajektorien $\rho - \rho_3 - \rho_5$, $\omega - \omega_3$, $f_2 - f_4 - f_6$ und $a_2 - a_4 - a_6$. Diese vier liegen sehr dicht beieinander und daher läßt sich der Formalismus durch Einführung der Reggeon-Trajektorie vereinfachen. Alle Trajektorien haben Achsenabschnitte $\alpha_0 \equiv \alpha(0) < 1$, bis auf das Pomeron. Eine Anpassung der Regge-Vorhersagen für den Austausch von Reggeon- und Pomeron-Trajektorie an die totalen Wirkungsquerschnitte von Hadron-Hadron- und Photon-Hadron-Streuung durch Donnachie und Landshoff [25] ergab für den Achsenabschnitt der Pomeron-Trajektorie $\alpha_{\mathbb{P}}(0) = 1 + \epsilon = 1.0808$ und für $\alpha'_{\mathbb{P}} = 0.25\,\mathrm{GeV}^{-2}$

1.4.3 Wirkungsquerschnitte

Ausgehend von der Streuamplitude in der Regge-Formulierung können Wirkungsquerschnitte mit Hilfe des optischen Theorems vorhergesagt werden, welches den totalen Wirkungsquerschnitt mit dem Imaginärteil der Streuamplitude bei $t = 0$ in Beziehung setzt. Für den totalen Wirkungsquerschnitt der Reaktion $A + B \to X$ ergibt sich danach:

$$\sigma_{\mathrm{tot}}^{AB} = \sum_k \beta_{Ak}(0)\beta_{Bk}(0) \left(\frac{s}{s_0}\right)^{[\alpha_k(0)-1]} \tag{1.42}$$

Für den differentiellen elastisch-diffraktiven Wirkungsquerschnitt der Reaktion $A + B \to C + D$ erhält man:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{el}}^{AB}}{\mathrm{d}t} = \sum_k \frac{\beta_{Ak}^2(t)\beta_{Bk}^2(t)}{16\pi} \left(\frac{s}{s_0}\right)^{2[\alpha_k(t)-1]} \tag{1.43}$$

Schließlich für den einfach-diffraktiven Fall (SD), bei dem Teilchen A diffraktiv dissoziiert ($A + B \to X + B$), ergibt sich folgender Wirkungsquerschnitt:

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma_{\mathrm{SD}}^{AB}}{\mathrm{d}t\mathrm{d}M_X^2} = \sum_{k,l} \frac{\beta_{Ak}(0)\beta_{Bl}^2(t)g_{kll}(t)}{16\pi} \left(\frac{s}{s_0}\right)^{2[\alpha_l(t)-1]} \left(\frac{M_X^2}{M_0^2}\right)^{\alpha_k(0)-2\alpha_l(t)} \tag{1.44}$$

Dabei laufen k und l über alle beteiligten Regge-Trajektorien, s_0 und M_0^2 sind Normierungsskalen und werden häufig gleich $1\,\mathrm{GeV}^2$ gesetzt, die Funktionen $\beta_{ik}(t)$ sind Residuenfunktionen der Integralform der Streuamplitude für die Polstellen bei $l = \alpha_k(t)$, sie können als Kopplungskonstanten für die Kopplung des Streupartners i an die Trajektorie k aufgefaßt werden. Die Funktion $g_{kll}(t)$ beschreibt in diesem Bild die Kopplung dreier Trajektorien. Der Zusammenhang wird in Abbildung 1.10 illustriert.

Der Wirkungsquerschnitt für doppelt-diffraktive Dissoziation (DD) $A+B \to X_1+X_2$ kann mittels eines Faktorisierungsansatzes beschrieben werden [26]. Er wird als das Produkt der einfach-diffraktiven Wirkungsquerschnitte je eines der Streupartner A und B, normiert auf den elastischen Wirkungsquerschnitt ausgedrückt:

$$\frac{\mathrm{d}^3\sigma_{\mathrm{DD}}^{AB\to X_1X_2}}{\mathrm{d}t\mathrm{d}M_{X_1}^2\mathrm{d}M_{X_2}^2} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}^2\sigma_{\mathrm{SD}}^{AB\to X_1B}}{\mathrm{d}t\mathrm{d}M_{X_1}^2} \cdot \dfrac{\mathrm{d}^2\sigma_{\mathrm{SD}}^{AB\to AX_2}}{\mathrm{d}t\mathrm{d}M_{X_2}^2}}{\dfrac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{el}}^{AB}}{\mathrm{d}t}} \tag{1.45}$$



Abbildung 1.10: *Berechnung der Wirkungsquerschnitte im Regge-Bild. Die s-Kanal-Reaktion $A + B \to A + B$ mit einem intermediären Zustand X wird in eine äquivalente t-Kanal-Reaktion transformiert, bei der eine Regge-Trajektorie α ausgetauscht wird (oben). Analog wird die Reaktion $A + B \to X + B$ behandelt.*

1.4.4 Eigenschaften der diffraktiven Wirkungsquerschnitte

Die totalen Wirkungsquerschnitte von Hadron-Hadron- und Photon-Hadron-Reaktionen weisen einen moderaten Anstieg bei großen s auf (Abbildung 1.3 in Abschnitt 1.3). Dies zeigt, daß Pomeronaustausch bei hohen Energien die Wirkungsquerschnitte dominiert, denn nur die Pomeron-Trajektorie mit $\alpha_0 = 1 + \epsilon$ kann aufgrund der $s^{\alpha_0 - 1}$-Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts einen Anstieg mit s bewirken. Die im letzten Abschnitt erwähnte Anpassung durch Donnachie und Landshoff ergab, daß die Summe der Beiträge anderer Trajektorien mit steigender Energie proportional zu $s^{-0.4525}$ abfällt. Der totale Wirkungsquerschnitt erhält im Grenzfall großer s daher folgende Form:

$$\sigma_{\mathrm{tot}}^{AB}(s) = \beta_{A\mathbb{P}}(0)\beta_{B\mathbb{P}}(0)\left(\frac{s}{s_0}\right)^{\epsilon} = \mathrm{const}\cdot s^{\epsilon} \tag{1.46}$$

Der Wirkungsquerschnitt ist also ein Produkt von Faktoren, die nur von der Kopplung β der Streupartner an die Trajektorie $\mathbb{P}$ abhängen, dies wird als Faktorisierung bezeichnet.

Für den elastischen Wirkungsquerschnitt ergibt sich unter diesen Voraussetzungen:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{el}}^{AB}(s,t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\beta_{A\mathbb{P}}^2(t)\beta_{B\mathbb{P}}^2(t)}{16\pi}\left(\frac{s}{s_0}\right)^{2\alpha'_{\mathbb{P}}(t)t}\left(\frac{s}{s_0}\right)^{2\epsilon} \tag{1.47}$$

und für kleine $|t|$:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{el}}^{AB}(s,t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\sigma_{\mathrm{tot}}^2}{16\pi}e^{b(s,t)t} \tag{1.48}$$

Der Steigungsparameter b ist dabei $b(s,t) = b(s_0,t) + 2\alpha'_{\mathrm{I\!P}}(t)\ln(s/s_0)$. Es zeigt sich für kleine $|t|$ ein starker Anstieg des elastischen Wirkungsquerschnitts, welcher als *Elastischer-Vorwärts-Peak* bezeichnet wird. Mit wachsender Schwerpunktsenergie wird die t-Verteilung durch das Anwachsen von b immer schmaler. Dies wird als *Shrinkage* bezeichnet. Siehe dazu auch Abbildung 1.11.



Abbildung 1.11: *Differentieller elastischer Wirkungsquerschnitt von Proton-Proton-Streuung* $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}t$ *gegen* $|t|$*, aufgetragen für unterschiedliche Protonimpulse. Der Wirkungsquerschnitt zeigt einen exponentiellen Anstieg zu kleinen* $|t|$ *(Elastischer-Vorwärts-Peak), der mit wachsender Schwerpunktsenergie* s *schmaler wird (Shrinkage). (Aus [29])*

Der differentielle Wirkungsquerschnitt für die einfach-diffraktive Dissoziation wird im Grenzfall großer s:

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma^{AB}_{\mathrm{SD}}(s,M_X^2,t)}{\mathrm{d}t\,\mathrm{d}M_X^2} = \frac{\beta_{A\mathrm{I\!P}}(0)\beta^2_{B\mathrm{I\!P}}(t)g_{\mathrm{I\!P}\mathrm{I\!P}\mathrm{I\!P}}(t)}{16\pi}\left(\frac{s}{s_0}\right)^{2\epsilon}\left(\frac{M_X^2}{M_0^2}\right)^{-(1+\epsilon)} e^{(b_D(s,M_X^2,t)t)} \qquad (1.49)$$

Dabei ist

$$b_D(s,M_X^2,t) = b_D(s_0,M_0^2,t) + 2\alpha'_{\mathrm{I\!P}}(t)\ln\left(\frac{s}{s_0}\frac{M_0^2}{M_X^2}\right) \qquad (1.50)$$

Die Drei-Pomeron-Kopplung $g_{\mathrm{I\!P}\mathrm{I\!P}\mathrm{I\!P}}(t)$ ist in guter Näherung unabhängig von t. Ihr Wert wurde zu $0.364\ \mathrm{mb}^{\frac{1}{2}}$ bestimmt [27].

Für kleine $|t|$ und da $\epsilon \approx 0$, kann man nähern:

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma^{AB}_{\mathrm{SD}}(s,M_X^2,t)}{\mathrm{d}t\,\mathrm{d}M_X^2} \approx \frac{A}{M_X^2}e^{b_D(s,M_X^2,t)t} \qquad (1.51)$$

Die Parametrisierung (1.49) gibt das t- und M_X-Spektrum der diffraktiven Protondissoziation im Bereich $4\,\mathrm{GeV}^2 \lesssim M_X^2 \lesssim 0.1s$ gut wieder. Bei kleineren Massen variiert b stark mit M_X^2, so daß sich resonanzartige Erhöhungen im M_X-Spektrum bei festem t ergeben. Diese Erhöhungen finden sich bei den Massen der Nukleonresonanzen, die durch Pomeronaustausch angeregt werden können. Für große Massen zeigt sich das $\exp(bt)/M_X^2 \approx 1/M_X^2$-Verhalten des Wirkungsquerschnitts, gemäß der Näherung (1.51) (Siehe Abbildung 1.12).



Abbildung 1.12: *Zweifach differentieller Wirkungsquerschnitt für unelastisch-diffraktive Streuung, Aufgetragen gegen M_X^2/s. (Aus [29])*

Für den doppelt-diffraktiven Wirkungsquerschnitt erhält man unter Benutzung der $\exp(bt)$-Abhängigkeit für die einfach-diffraktive Dissoziation und die elastische Streuung, nach Integration über t:

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma_{\mathrm{DD}}^{AB\to X_1X_2}}{\mathrm{d}M_{X_1}^2\mathrm{d}M_{X_2}^2} = k\frac{1}{\sigma_{\mathrm{el}}^{AB}}\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{SD}}^{AB\to X_1B}}{\mathrm{d}M_{X_1}^2}\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{SD}}^{AB\to AX_2}}{\mathrm{d}M_{X_2}^2} \tag{1.52}$$

mit $k = \frac{r^2}{2r-1}$; $r = \frac{b_d}{b}$.

Die Integration über die M^2 ergibt den totalen Wirkungsquerschnitt der doppelt-diffraktiven Dissoziation:

$$\sigma_{\mathrm{DD}} = k\frac{\sigma_{\mathrm{SD}}^2}{\sigma_{\mathrm{el}}} \tag{1.53}$$

Da k unabhängig von s und t ist, ist dies eine universelle Relation und der Anteil der doppelt-diffraktiven Dissoziation ist mit k bestimmt. Für Proton-Proton-Reaktion wurde $r \approx 2/3$ gemessen, woraus $k \approx 4/3$ folgt [42].

1.4.5 Grenzen des Wirkunsquerschnittsanstiegs

Nach Gleichung (1.46) wächst der totale Wirkungsquerschnitt mit steigender Schwerpunktsenergie s bis unendlich. Die Unitaritätsbedingung, die aus der Wahrscheinlichkeitserhaltung folgt, beschränkt den totalen Wirkungsquerschnitt. Sie besagt, daß für jede Partialwelle der Streuamplitude zu einem festen Drehimpuls l die auslaufende Intensität nicht größer als die zugehörige Einlaufende sein kann.

Eine spezifischere Grenze ist die Froissart-, oder auch Martin-Froissart-Schranke [22, 23]. Durch eine Partialwellenanalyse der Streuamplituden konnte Froissart zeigen, daß alle Partialwellen mit $l \geq l_{\max} = c\sqrt{s}\ln s$ (wobei c eine Konstante ist) vernachlässigbar sind. Durch Aufsummieren der Partialwellenserie unter Annahme maximaler Streuung für jede Partialwelle erhielt er als asymptotische Grenze für den totalen Wirkungsquerschnitt:

$$\sigma \leq c \ln^2 s \tag{1.54}$$

wobei sich für c eine obere Schranke zu $\pi/m_\pi^2 \approx 60$mb bestimmen läßt. Der totale Regge-Wirkungsquerschnitt verletzt diese Schranke erst bei Energien von etwa $\sqrt{s} = 10^{29}\,$GeV, bzw $\sqrt{s} = 10^{47}\,$GeV für pp-, bzw. γp-Streuung.

Eine stärkere Grenze ist die Pumplin-Schranke [28, 30]. Aus der Eikonalnäherung der Streuamplitude und mit Hilfe des optischen Theorems kann man den diffraktiven Beitrag zum totalen Wirkungsquerschnitt einschränken:

$$\sigma_{\text{el}} + \sigma_{\text{diffraktiv}} \leq \frac{1}{2}\sigma_{\text{tot}} \tag{1.55}$$

woraus folgt:

$$\frac{\sigma_{\text{el}}}{\sigma_{\text{tot}}} \leq \frac{1}{2} \tag{1.56}$$

Benutzt man die Gleichungen (1.46) und (1.47) und integriert über t, erhält man die folgende Grenze für den totalen Wirkungsquerschnitt [12]:

$$\sigma_{\text{tot}} = const \cdot s^{\epsilon} \leq \frac{1}{2} 16\pi b \tag{1.57}$$

Diese Ungleichung wird schon bei etwa $\sqrt{s} = 6 \cdot 10^6\,$GeV für pp-Streuung und bei etwa $\sqrt{s} = 10^{24}\,$GeV für γp-Streuung verletzt.

Der Wert von ϵ kann daher nicht als fester Wert angesehen werden, ein leichter Abfall mit steigender Energie ist notwendig, um den totalen Wirkungsquerschnitt unterhalb obiger Grenzen zu halten. Für heutzutage erreichte Energien ist das s^ϵ-Verhalten des Wirkungsquerschnitts bisher ohne Einschränkung bestätigt. Da der Wert von ϵ aus Daten gewonnen wurde und nicht aus der Regge-Theorie folgt, erhofft man sich Fortschritte auf diesem Gebiet von der Quantenchromodynamik.

1.4.6 Das Pomeron

Die Regge-Theorie macht keine Aussage darüber, was das Pomeron ist. Da es farbneutral ist und die Quantenzahlen des Vakuums trägt, ist es naheliegend, das Pomeron im Rahmen der QCD als Mehrfach-Gluonaustausch zu beschreiben, ein einfaches Modell dafür kann der Austausch von zwei Gluonen sein. Dieses Modell [24] sagt allerdings nicht den leichten Anstieg des Wirkungsquerschnitts mit der Schwerpunktsenergie vorher.

Die Verallgemeinerung des Zwei-Gluonaustauschs ist die Einführung von Leitergraphen (Abbildung 1.13b), bei welchen Gluon-Gluon-Wechselwirkungen zwischen den beiden Austauschgluonen erlaubt werden. Führt man die Reihensummation über alle Leitersegmente durch, erhält man das sogenannte BFKL-Pomeron[2] [39, 40, 41], dessen Trajektorienfunktion $\alpha(t)$ den folgenden Achsenabschnitt hat:

$$\alpha_{\mathbb{P}}^{\mathrm{BFKL}}(0) = 1 + \frac{12\alpha_s}{\pi} \ln 2 \tag{1.58}$$

Setzt man $\alpha_s \approx 0.2$, erhält man $\alpha_{\mathbb{P}}^{\mathrm{BFKL}}(0) \approx 1.5$ und damit einen deutlich höheren Wert als 1.0808, wie er sich aus der Datenanpassung von Donnachie und Landshoff ergab. Dieses Pomeron wird daher auch das „harte" Pomeron genannt, es führt zu einem deutlich stärkeren Anstieg der Wirkungsquerschnitte mit der Schwerpunktsenergie ($s^{0.5}$) als das Pomeron in der Regge-Theorie.



Abbildung 1.13: *QCD-Modelle des Pomeron, Zwei-Gluon-Austausch (a) und Gluonleiter (b).*

1.4.7 Harte und weiche Prozesse

Im letzten Abschnitt wurde gezeigt, daß ein Modell der Quantenchromodynamik für das Pomeron einen stärkeren Anstieg von Wirkungsquerschnitten vorhersagt, als das Pomeron der Regge-Theorie nach Donnachie und Landshoff. Bisher ist nicht bekannt, ob beide Theorien unterschiedliche Ausprägungen derselben zugrundeliegenden Physik beschreiben, aber man erhofft sich durch die Erforschung der Übergangsregion zwischen weichen und harten Prozessen hier neue Erkenntnisse.

Abbildung 1.14 zeigt den totalen Wirkungsquerschnitt von Photoproduktion in Abhängigkeit von W, zusätzlich sind die Wirkungsquerschnitte der elastischen Vektormeson-Produktion für ρ, ω, ϕ und J/Ψ eingetragen. Während die Messungen des totalen Wirkungsquerschnitts und derjenigen für ρ- [43, 44], ω- [44] und ϕ-Photoproduktion [45] den Erwartungen der Regge-Theorie folgen, steigt der Wirkungsquerschnitt für die Produktion von J/Ψ-Mesonen [46] deutlich stärker an ($\propto W^{0.8}$). Dieses von dem phänomenologischen

[2] Balitski, Fadin, Kuraev, Lipatov

Ansatz von Donnachie und Landshoff abweichende Verhalten wird immer dann beobachtet, wenn große Massen oder Transversalimpulse involviert sind. Bei der Photoproduktion von J/Ψ-Mesonen ist das die große Masse des Charm-Quarks, bei anderen Reaktionstypen sind es großes Q^2 oder große Transversalimpulse von Teilchen im Endzustand.



Abbildung 1.14: *Totaler und elastischer Vektormeson-Wirkungsquerschnitt in Photoproduktion in Abhängigkeit von W, für die Vektormesonen ρ, ω ϕ und J/Ψ. Die Anpassung an den totalen Wirkungsquerschnitt ist die von Donnachie und Landshoff ($W^{0.16}$), die anderen sind Funktionen der Form $W^{0.22}$ und $W^{0.8}$.*

1.5 Diffraktion und Strukturfunktionen

In Analogie zur Protonstrukturfunktion wurde 1985 das Konzept einer Pomeronstrukturfunktion vorgeschlagen [32]. Unter Berücksichtigung der Faktorisierung, der Regge-Theorie, wird der Hadron-Hadron-Wirkungsquerschnitt in ein Produkt aus einem Pomeron-Flußfaktor und dem Pomeron-Hadron-Wirkungsquerschnitt aufgeteilt.

$$\frac{\mathrm{d}\sigma^{AB\to XB}}{\mathrm{d}t\mathrm{d}M_X^2} = \mathcal{F}_{\mathbb{P}/B}(x_{\mathbb{P}}, t) \cdot \sigma^{A\mathbb{P}\to X}(x_{\mathbb{P}} s) \tag{1.59}$$

Dies ist analog zum Photonfluß $\mathcal{F}_{\gamma/e}$, der den ep- mit dem γp-Wirkungsquerschnitt verbindet (Gleichung (1.34), Abschnitt 1.2.2). Im Unterschied zur Photoproduktion handelt es sich beim Pomeron-Austausch nicht um den Austausch eines virtuellen Teilchens mit einer einzigen Polstelle bei $t = M^2$, bzw. $t = 0$ für Photoproduktion. Es gibt keinen Wirkungsquerschnitt für reelle Pomeron-Hadron-Streuung, daher ist die Normierung beider Faktoren willkürlich, nur das Produkt ist meßbar.

Im Fall harter, diffraktiver Prozesse, kann der Pomeron-Hadron-Wirkungsquerschnitt durch Partondichten und Parton-Parton-Wirkungsquerschnitte ausgedrückt werden:

$$\sigma^{A\mathbb{P}\to jj} = \sum_{i,k} \int_{x_{i/\mathbb{P}}} \int_{x_{k/A}} i_{\mathbb{P}}(x_{i/\mathbb{P}}) k_A(x_{k/A}) \hat{\sigma}(ik \to jj) \tag{1.60}$$

wobei $i_{\mathbb{P}}$ die Partondichten der Partonen i im Pomeron, k_A die Partondichten im Hadron A sind. Damit ergibt sich für die diffraktive ep-Streuung:

$$\frac{\mathrm{d}^4\sigma^D}{\mathrm{d}\beta \mathrm{d}Q^2 \mathrm{d}x_{\mathbb{P}} \mathrm{d}t} = \mathcal{F}_{\mathbb{P}/p}(x_{\mathbb{P}}, t) \frac{\mathrm{d}^2\sigma^{e\mathbb{P}}}{\mathrm{d}\beta \mathrm{d}Q^2} \tag{1.61}$$

$$= \mathcal{F}_{\mathbb{P}/p}(x_{\mathbb{P}}, t) \frac{4\pi\alpha^2}{\beta Q^2} \left[1 - \tilde{y} + \frac{\tilde{y}^2}{2(1+R^{\mathbb{P}})}\right] F_2^{\mathbb{P}}(\beta, Q^2) \tag{1.62}$$

mit $\tilde{y} = (q \cdot p_{\mathbb{P}})/(k \cdot p_{\mathbb{P}})$. Wegen $p_{\mathbb{P}} \approx x_{\mathbb{P}} P$ gilt auch $\tilde{y} \approx y$.

Zur Bestimmung des Flußfaktors $\mathcal{F}_{\mathbb{P}/p}(x_{\mathbb{P}}, t)$ betrachtet man die Reaktion $Ap \to Xp$. Mit der Definition

$$x_{\mathbb{P}} = \frac{p_A \cdot p_{\mathbb{P}}}{p_A \cdot p_B} \approx \frac{M_X^2}{s} \tag{1.63}$$

erhält man aus (siehe Gleichung 1.44):

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}t \mathrm{d}M_X^2} = \frac{\beta_{A\mathbb{P}}(0)\beta_{p\mathbb{P}}^2(t) g_{\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}}(t)}{16\pi} \left(\frac{s}{s_0}\right)^{2[\alpha_{\mathbb{P}}(t)-1]} \left(\frac{M_X^2}{M_0^2}\right)^{\alpha_{\mathbb{P}}(0)-2\alpha_{\mathbb{P}}(t)} \tag{1.64}$$

den Ausdruck

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}t \mathrm{d}x_{\mathbb{P}}} = s \frac{\beta_{A\mathbb{P}}(0)\beta_{p\mathbb{P}}^2(t) g_{\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}}(t)}{16\pi} \left(\frac{s}{s_0}\right)^{2[\alpha_{\mathbb{P}}(t)-1]} \left(\frac{x_{\mathbb{P}} s}{M_0^2}\right)^{\alpha_{\mathbb{P}}(0)-2\alpha_{\mathbb{P}}(t)} \tag{1.65}$$

$$= \frac{\beta_{A\mathbb{P}}(0)\beta_{p\mathbb{P}}^2(t) g_{\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}}(t)}{16\pi s_0^2} \left(\frac{x_{\mathbb{P}} s}{s_0}\right)^{\alpha_{\mathbb{P}}(0)-1} \left(\frac{s_0}{M_0^2}\right)^{\alpha_{\mathbb{P}}(0)-2\alpha_{\mathbb{P}}(t)} x_{\mathbb{P}}^{1-2\alpha_{\mathbb{P}}(t)}$$

Das kann man aufspalten in den Pomeron-Fluß (Gleichung (1.66) und den $A\mathbb{P}$-Wirkungsquerschnitt (Gleichung 1.67).

$$\mathcal{F}_{\mathbb{P}/p}(x_{\mathbb{P}}, t) = \frac{\beta_{p\mathbb{P}}^2(t)}{4\pi^2} x_{\mathbb{P}}^{1-2\alpha_{\mathbb{P}}(t)} \approx \frac{\beta_{p\mathbb{P}}^2(0)}{4\pi^2} x_{\mathbb{P}}^{-(1+2\epsilon)} \exp(bt) \tag{1.66}$$

(wobei $b(s,t) = b(s_0,t) + 2\alpha'_{\mathbb{P}} \ln x_{\mathbb{P}}$ ist)

$$\sigma^{\mathbb{P}A}(x_{\mathbb{P}} s, t) = \frac{\pi \beta_{A\mathbb{P}}(0) g_{\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}}(t)}{4 s_0^2} \left(\frac{x_{\mathbb{P}} s}{s_0}\right)^{\alpha_{\mathbb{P}}(0)-1} \left(\frac{s_0}{M_0^2}\right)^{\alpha_{\mathbb{P}}(0)-2\alpha_{\mathbb{P}}(t)} \tag{1.67}$$

$\sigma^{A\mathbb{P}}(x_{\mathbb{P}} s, t)$ ist dabei näherungsweise unabhängig von t. Die verwendete Normierung ist die von Donnachie und Landshoff.

1.6 Pion-Austausch

Bei hohen Energien dominiert der Pomeronaustausch den totalen Wirkungsquerschnitt, es gibt aber kinematische Bereiche in denen andere Regge-Trajektorien einen wesentlichen Beitrag dazu liefern. Bei hohem $x_{\mathbb{P}} \gtrsim 0.1$ ist besonders die Pion-Trajektorie

$\alpha_\pi(t) \approx 0 + 0.8\,\mathrm{GeV}^{-2} \cdot t$ wichtig [35]. In diesem kinematischen Bereich wurden 1995 die Daten für diese Arbeit mit dem H1-Vorwärtsprotonspektrometer gemessen.

Zu reeller Pion-Hadron-Streuung gibt es – anders als beim Pomeron – Daten, daher läßt sich der Pion-Flußfaktor $\mathcal{F}_{\pi/p}$ absolut normieren [79]:

$$\mathcal{F}_{\pi/p}(x_{\mathbb{P}}, t) = \frac{\beta^2_{p\pi}(t)}{4\pi^2} x_{\mathbb{P}}^{1-2\alpha_\pi(t)} \approx \frac{\beta^2_{p\pi}(0)}{4\pi^2} x_{\mathbb{P}}^{-[1-2\alpha_\pi(t)]} \exp(bt) \tag{1.68}$$

hier bezeichnet die Variable $x_{\mathbb{P}}$ den Impulsbruchteil des virtuellen Pions.

Der Wirkungsquerschnitt ist

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}t\mathrm{d}x_{\mathbb{P}}} = s\frac{\beta_{A\mathbb{P}}(0)\beta^2_{p\pi}(t) g_{\mathbb{P}\pi\pi}}{16\pi} \left(\frac{s}{s_0}\right)^{\alpha_{\mathbb{P}}(t)-1} x_{\mathbb{P}}^{\alpha_{\mathbb{P}}(0)-2\alpha_\pi(t)} \tag{1.69}$$

skaliert also mit s und steigt bei kleinem $|t|$ etwa linear mit $x_{\mathbb{P}}$ an, da $\alpha_{\mathbb{P}}(0) - 2\alpha_\pi(t) \approx 1$.

Das Pion ist ein isovektorielles Teilchen, neben der Streuung am π° gibt es auch die Streuung am π^+, wobei im Endzustand Neutronen entstehen, die mit Vorwärts-Neutron-Kalorimetern nachgewiesen werden können.

1.7 Andere Modelle für diffraktive ep-Streuung

In diesem Abschnitt sollen zwei alternative Modelle zur Beschreibung diffraktiver Streuung erwähnt werden. Im Modell der „Wee-Partonen“ [37] wird angenommen, daß sich Partonen im Proton zu Gruppen *(Clustern)* mit Spin 0 und den Quantenzahlen des Vakuums zusammenfinden. Durch die Streuung des Elektrons an diesen Clustern lassen sich Ereignisse mit einer Rapiditätslücke auch erklären. Ein anderes Modell ist das des weichen Farbaustausches [38]. Hier wird davon ausgegangen, daß der Wirkungsquerschnitt von Positron-Proton-Streuung im Bereich $x < 10^{-3}$ von Photon-Gluon-Fusion (Abbildung 1.6b) dominiert wird. Das dabei entstehende $q\bar{q}$-Paar übernimmt die Farbladung des Gluons. Es kann allerdings noch weitere Gluonen mit dem Protonrest austauschen, da es sich in dessen Farbfeld befindet. Dies führt zu einer Rotation des Farbspins, der anschließend statistisch verteilt ist. Es wird daher erwartet, daß das Quark-Antiquark-Paar mit einer Wahrscheinlichkeit von 8/9 im Oktett-Zustand und mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/9 im Singlett-Zustand ist. Diese Vorhersage paßt gut zu dem experimentellen Ergebnis, daß etwa 10 % aller tiefunelastischen ep-Ereignisse eine Rapiditätslücke aufweisen.

1.8 Monte-Carlo-Modelle

Im folgenden Abschnitt wird auf die Implementierung der theoretischen Modelle in den für diese Arbeit verwendeten Monte-Carlo-Simulationsprogrammen eingegangen.

1.8.1 PHOJET

Das Monte-Carlo-Programm PHOJET [73] wurde entwickelt um alle Prozesse, die zum totalen Wirkungsquerschnitt von Photoproduktion beitragen, zu simulieren. Insbesondere müssen dabei die Anteile harter und weicher Prozesse vereinheitlicht werden, was mit einem Unitarisierungsverfahren bewerkstelligt wird. PHOJET basiert auf dem Dualen-Parton-Modell (DPM) in einer Formulierung für weiche und harte Beiträge (zweikomponentiges DPM) [11], welches erfolgreich die meisten Eigenschaften hochenergetischer hadronischer Prozesse beschreibt.

Die Kinematik der Ereignisse wird mittels eines speziellen Programms für die Abstrahlung quasi-reeller Photonen gemäß dem Photonfluß (IJRAY) simuliert.

Harte Streuungen werden für $\hat{p}_\perp > 3\,\mathrm{GeV/c}$ mittels störungstheoretischer Quantenchromodynamik zusammen mit dem Quark-Parton-Modell generiert. Dabei werden die Matrixelemente in niedrigster Ordnung der QCD benutzt.

Weiche Prozesse werden im Rahmen der Regge-Phänomenologie modelliert, eine explizite Simulation von Pion-, und Reggeon-Austausch ist dabei nicht enthalten. Das Spektrum der Transversalimpulse von Partonen, die zu weichen Prozessen gehören, hat dabei die Form:

$$\frac{\mathrm{d}N_{\mathrm{weich}}}{\mathrm{d}p_\perp} \approx \exp(-\beta \cdot p_\perp) \tag{1.70}$$

Um einen fließenden Übergang von weichen zu harten Streuungen zu erreichen, wird der Steigungsparameter β mit folgender Bedingung angepaßt:

$$\left.\frac{\mathrm{d}N_{\mathrm{weich}}}{\mathrm{d}p_\perp}\right|_{p_\perp=3\,\mathrm{GeV/c}} = \left.\frac{\mathrm{d}N_{\mathrm{hart}}}{\mathrm{d}p_\perp}\right|_{p_\perp=3\,\mathrm{GeV/c}} \tag{1.71}$$

Dieses Verfahren führt zu einer reduzierten Abhängigkeit der Ergebnisse von dem gewählten Abschneideparameter $\hat{p}_\perp^{\mathrm{min}} \geq 3\,\mathrm{GeV}$

Der Übergang von Partonen mit Farbladung zu farbneutralen Hadronen *(Fragmentation)*, wird gemäß dem Lund-String-Modell durchgeführt, wie es in dem Programm JETSET [75] implementiert ist.

1.8.2 POMPYT

POMPYT [74] ist ein Programm zur Simulation harter diffraktiver Prozesse in pp-, ep- und γp-Streuung. Auch Prozesse, die auf Pion-Austausch basieren sind implementiert. Für diese Analyse wurden in POMPYT der Kanal des Pomeron- und des π°-Austauschs für Photoproduktion verwendet.

Für den Pomeron-Austausch wird ein phänomenologischer Ansatz zur Parametrisierung des Pomeron-Fluß verwendet [80]:

$$\mathcal{F}_{\mathbb{P}/p}(x_{\mathbb{P}}, t) = \frac{\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}x_{\mathbb{P}}\mathrm{d}t}{\sigma(\mathbb{P}p \to X)} = \frac{1}{\sigma(\mathbb{P}p \to X)} \frac{1}{x_{\mathbb{P}}^p} \sum_1^3 a_i e^{b_i t} \tag{1.72}$$

Dieser Fluß wird aus dem Verhältnis des einfach-diffraktiven Wirkungsquerschnitts und dem totalen Pomeron-Proton-Wirkungsquerschnitt gewonnen. Die Parameter b_i und p werden durch Anpassung an einfach-diffraktive Wirkungsquerschnitte bestimmt. Die verwendete Pomeron-Strukturfunktion ist aus einer Anpassung an tiefunelastische diffraktive

Ereignisse durch die H1-Kollaboration gewonnen [77]. Eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens findet sich in [78].

Der Pion-Fluß ist gemäß dem Pion-Wolken-Modell [33] parametrisiert:

$$\mathcal{F}_{\pi/p}(x_{\mathbb{P}}, t) = 3.257 x_{\mathbb{P}} \frac{-t}{(m_\pi^2 - t)^2} \exp\left(-\frac{m_\pi^2 - t}{1.21 x_\pi}\right) \tag{1.73}$$

wobei $x_{\mathbb{P}}$ hier den Impulsbruchteil des Pions bezeichnet. Als Partondichten des ausgetauschten Pions werden die Partondichten des reellen Pions verwendet. In dieser Arbeit werden die Parametrisierungen von Glück, Reya und Vogt in niedrigster (LO) und erster (NLO) Ordnung benutzt [76, 79].

Auch POMPYT benutzt für die Fragmentation das Lund-String-Modell über das Programm JETSET [75].

Kapitel 2

Das Experiment

Die in dieser Analyse verwendeten Meßdaten wurden mit dem H1-Experiment aufgezeichnet. Das H1-Experiment befindet sich an einem Wechselwirkungspunkt der Proton-Elektron, bzw. Proton-Positron-Speicherringanlage HERA (Hadron-Elektron-Ring-Anlage). Die Anlage wird seit 1992 am Deutschen Elektronen Synchrotron (DESY) in Hamburg betrieben. In diesem Kapitel wird zunächst der HERA-Speicherring beschrieben, dann folgt eine Vorstellung des H1-Experiments. Dabei wird auf die einzelnen Detektorteile und den H1-Trigger eingegangen. Eine Beschreibung des für diese Analyse besonders wichtigen Vorwärtsprotonspektrometers erfolgt in einem extra Kapitel (3).

2.1 Der Speicherring HERA

Der Speicherring HERA ist ein Elektron-, bzw. Positron-Proton Speicherring, in dem Elektronen auf 30 GeV und Protonen auf 820 GeV beschleunigt und gespeichert werden können. Der Umfang des 1991 fertiggestellten Beschleunigers beträgt 6.3 km, er befindet sich in einem Tunnel 10 – 30 m unter der Erde. In zwei von vier Wechselwirkungszonen werden Teilchen, die in räumlich begrenzten „Paketen“ beschleunigt werden, alle 96 ns zur Kollision gebracht. In diesen Zonen sind die beiden Experimente H1 und ZEUS aufgebaut, die im Mai 1992 die ersten Ereignisse von Elektron-Proton-Kollisionen beobachtet haben. Weitere Experimente am HERA-Speicherring sind HERMES zur Untersuchung der Nukleon-Spinstruktur und HERA-B, das zur Untersuchung CP-verletzender Prozesse von B-Mesonen dienen soll.

Abbildung 2.1 zeigt eine schematische Ansicht des HERA-Speicherringes und seiner Vorbeschleuniger. Die Beschleunigung von Positronen und Protonen erfolgt bei HERA in unterschiedlichen Schritten. Positronen werden in dem Linearbeschleuniger LINAC II auf 500 MeV, anschließend in DESY II auf 7 GeV beschleunigt. In PETRA II erhalten die Positronen eine Energie von 12 GeV, mit der sie in HERA injiziert und auf ihre Endenergie beschleunigt werden. Protonen werden als H^--Ionen im LINAC III auf 50 MeV beschleunigt und nach Abstreifen der Elektronen in DESY III geführt, wo sie auf 7.5 GeV beschleunigt werden. In PETRA II erhalten die Protonen eine Injektionsenergie von 40 GeV und in HERA die endgültige Energie von 820 GeV. In HERA werden für die Positronen normalleitende, für die Protonen supraleitende Ablenkmagnete benutzt. Das Hoch-