Bestimmung des ep–Wirkungsquerschnittes von Beauty-Quarks durch ihren semileptonischen Zerfall in Myonen mit dem H1-Detektor bei HERA

Determination of the ep Cross Section for Beauty Quarks via their Semileptonic Decay in Muons within the H1 Detector at HERA

DISSERTATION
zur Erlangung des Doktorgrades
des Fachbereichs Physik
der Universität Hamburg

Vorgelegt von
Martin Kander
aus Lübeck

Hamburg
1998

Gutachter der Dissertation:	Prof. Dr. B. Naroska Prof. Dr. V. Blobel
Gutachter der Disputation:	Prof. Dr. B. Naroska Prof. Dr. G. Heinzelmann
Datum der Disputation:	22.06.1998
Sprecher des Fachbereichs Physik und Vorsitzender des Promotionsausschusses:	Prof. Dr. B. Kramer

Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit werden Wirkungsquerschnitte der Produktion schwerer Quarks in der Elektron-Proton-Streuung über deren semileptonischen Zerfall in Myonen bestimmt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bestimmung des Wirkungsquerschnittes von Beauty-Quarks. Ereignisse mit mindestens einem Myon im Polarwinkelbereich von $35° < \Theta < 130°$ und mit einem Impuls $p_\mu > 2.5\,\mathrm{GeV}$ werden mit dem H1-Detektor identifiziert. Aus den Daten des Jahres 1995 sind 820 Ereignisse aus einer integrierten Luminosität von $\int \mathcal{L} = 2.6\,\mathrm{pb}^{-1}$ selektiert worden. Zur Bestimmung der Wirkungsquerschnitte ist es notwendig, die Anteile von Charm-Quarks, Beauty-Quarks und Untergrund zu unterscheiden. Dieses erfolgt mittels einer Korrelationsverteilung zweier Variablen, die sowohl auf dem Impuls des Myonkandidaten als auch auf dem Energiefluß in der Umgebung des Myonkandidaten (*Aktivität*) beruhen.

Aus einer Anpassung werden die sichtbaren ep-Wirkungsquerschnitte für schwere Quarks in dem kinematischen Bereich $Q^2 < 1\,\mathrm{GeV}^2$ und $0.07 < y < 0.93$ bestimmt zu: $\sigma_{vis}(ep \to c\bar{c}X) = (1.24 \pm 0.28^{+0.32}_{-0.25})\,\mathrm{nb}$ und $\sigma_{vis}(ep \to b\bar{b}X) = (1.02 \pm 0.09^{+0.10}_{-0.16})\,\mathrm{nb}$. Die Extrapolation auf den gesamten kinematischen Bereich ergibt die totalen ep-Wirkungsquerschnitte schwerer Quarks: $\sigma_{tot}(ep \to c\bar{c}X) = (976.8 \pm 218.4^{+251.0+324.5}_{-193.4-399.6})\,\mathrm{nb}$ und $\sigma_{tot}(ep \to b\bar{b}X) = (18.59 \pm 1.69^{+1.86+0.92}_{-2.92-0.92})\,\mathrm{nb}$. Die daraus ermittlelten Photoproduktionswirkungsquerschnitte sind: $\sigma(\gamma p \to c\bar{c}X) = (12.9 \pm 2.9^{+3.3+4.3}_{-2.5-5.3})\,\mathrm{nb}$ bei $\langle W_{\gamma p}\rangle = 174\,\mathrm{GeV}$ und $\sigma(\gamma p \to b\bar{b}X) = (0.245 \pm 0.022^{+0.025+0.012}_{-0.038-0.012})\,\mathrm{nb}$ bei $\langle W_{\gamma p}\rangle = 182\,\mathrm{GeV}$. Die ersten Fehler stehen für statistische Unsicherheiten und die zweiten für experimentelle systematische Unsicherheiten. Die dritten Fehler stehen für theoretische Unsicherheiten aufgrund der Wahl der Gluondichte-Parametrisierung im Proton und der Wahl des Fragmentationsmodells, und sie berücksichtigen einen möglichen Anteil von Charm-Quarks aus Prozessen mit aufgelösten Photonen.

Die gemessenen Charm-Wirkungsquerschnitte stimmen im Rahmen der Fehler mit bereits gemessenen Werten und der theoretischen Vorhersage überein. Die gemessenen Beauty-Wirkungsquerschnitte sind einen Faktor ~ 5 über den QCD-Vorhersagen in *Next to Leading Order* (NLO).

Abstract

In this thesis the cross sections of the production of heavy quarks in ep collisions are measured via their semileptonic decay into muons. Events with at least one muon in the polar angle range $35° < \Theta < 130°$ and a momentum $p_\mu > 2.5\,\mathrm{GeV}$ are identified with the H1 detector. The analysis is based on a selection of 820 events corresponding to an integrated luminosity of $\int \mathcal{L} = 2.6\,\mathrm{pb}^{-1}$ of the data taken in the year 1995. To determine the cross sections it is necessary to distinguish the contributions of charm quarks, beauty quarks and background. This is done using the correlation distribution of two variables, which rely on the momentum of the myon and the energy flow surrounding the myon (*activity*).

The result of a fit yields the visible ep cross sections within the kinematical range $Q^2 < 1\,\mathrm{GeV}^2$ and $0.07 < y < 0.93$: $\sigma_{vis}(ep \to c\bar{c}X) = (1.24 \pm 0.28^{+0.32}_{-0.25})\,\mathrm{nb}$ and $\sigma_{vis}(ep \to b\bar{b}X) = (1.02 \pm 0.09^{+0.10}_{-0.16})\,\mathrm{nb}$. The total ep cross sections are obtained extrapolating to the total kinematic range: $\sigma_{tot}(ep \to c\bar{c}X) = (976.8 \pm 218.4^{+251.0+324.5}_{-193.4-399.6})\,\mathrm{nb}$ and $\sigma_{tot}(ep \to b\bar{b}X) = (18.59 \pm 1.69^{+1.86+0.92}_{-2.92-0.92})\,\mathrm{nb}$. This results in photoproduction cross sections of: $\sigma(\gamma p \to c\bar{c}X) = (12.9 \pm 2.9^{+3.3+4.3}_{-2.5-5.3})\,\mathrm{nb}$ at $\langle W_{\gamma p}\rangle = 174\,\mathrm{GeV}$ and $\sigma(\gamma p \to b\bar{b}X) = (0.245 \pm 0.022^{+0.025+0.012}_{-0.038-0.012})\,\mathrm{nb}$ at $\langle W_{\gamma p}\rangle = 182\,\mathrm{GeV}$. The first errors are statistical errors and the second errors represent experimental systematic uncertainties. The third errors represent uncertainties due to the choice of parametrisation of the gluon density in the proton, the choice of the fragmentation model and a possible contribution of resolved photons to charm production.

The measured charm cross sections are within the errors in good agreement with values previously measured and also with the theoretical prediction of next to leading order calculations. But the measured beauty cross section is about five times higher than the next to leading order QCD predictions.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

Im *Standardmodell der Elementarteilchenphysik* ist die Materie aus zwölf Fermionen zusammengesetzt. Die Fermionen sind sechs Quarks (u, d, s, c, b, t) und sechs Leptonen (e, ν_e, μ, ν_μ, τ, ν_τ), die über den Austausch von Eichbosonen wechselwirken. Die elektroschwache Wechselwirkung wird durch drei massive Eichbosonen (Z^0, $\mathrm{W}^\pm$) und ein masseloses Eichboson (γ) beschrieben. Die starke Wechselwirkung erfolgt im Rahmen der Quanten-Chromo-Dynamik durch Austausch von Gluonen zwischen den Quarks und den Gluonen selbst. Die Vorhersagen der QCD sind für Beauty-Quarks aufgrund der größeren Masse zuverlässiger als für Charm-Quarks.

Die Entdeckung der Charm-Quarks erfolgte im Jahr 1974. Den ersten Hinweis auf die Existenz von Beauty-Quarks vor ihrer Entdeckung im Jahr 1977 ergab eine Messung von zehn Ereignissen mit jeweils zwei Elektronen im Endzustand mit einer invarianten Masse von (9.5 ± 0.3) GeV gegenüber sieben Ereignissen dieser Art, die nicht innerhalb dieses Massenbereiches lagen. Diese Messung erfolgte im November 1976 durch die *Columbia-Fermilab-Stony Brook Collaboration* am Fermilab [Yoh98] und wurde im darauffolgenden Jahr mit Myonen gefestigt. Die Resonanz wurde Υ getauft und als gebundener $b\bar{b}$-Zustand interpretiert.

Bei den Experimenten H1 und ZEUS am Elektron-Proton-Speicherring HERA, dessen Betrieb im Jahr 1992 aufgenommen wurde, werden Elektronen und Protonen bei einer Schwerpunktenergie von $\sqrt{s} \approx 300\,\mathrm{GeV}$ zur Kollision gebracht. Die Schwerpunktenergie liegt etwa eine Größenordnung über der vorheriger Experimente mit festem *Target* und man erhält deshalb Informationen aus einem zuvor unerschlossenen kinematischen Bereich.

Schwere Quarks werden in der Elektron-Proton-Streuung hauptsächlich durch den Prozeß der Photon-Gluon-Fusion produziert. Hierbei wechselwirkt ein vom Elektron ausgesandtes Photon mit einem Gluon aus dem Proton. Dabei erhält man Informationen über den Gluongehalt im Proton. Die Produktion schwerer Quarks kann in Form von Vektormesonen (J/ψ, Υ) oder als D- bzw. B-Mesonen erfolgen. Bei letzterem entsteht das Meson durch die Verbindung des schweren Quarks mit einem leichteren Quark.

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Messung des Wirkungsquerschnittes für Beauty-Quarks in der Photon-Gluon-Fusion mit Hilfe des H1-Detektors. Erkannt werden die Quarks durch ihren semileptonischen Zerfall in Myonen. Dazu ist es notwendig, Charm-Quarks, die ebenfalls semileptonisch in Myonen zerfallen können, deren Wirkungsquerschnitt jedoch etwa zwei Größenordnungen über dem der Beauty-Quarks liegt, abzutrennen. Neben den Myonen aus Zerfällen schwerer Quarks, ist Untergrund von Hadronen, die eine Myonsignatur im Detektor hinterlassen und Myonen aus den Zerfällen leichter Hadronen (π, K), zu berücksichtigen. Die Untersuchung dieses Untergrundes und die Beschreibung durch Monte-

Carlo-Simulationen ist ein wesentlicher Teil dieser Arbeit.

Kapitel 2 faßt die theoretischen Grundlagen der Elektron-Proton-Streuung und Photon-Proton-Streuung zusammen. Es wird dabei näher auf die Produktion und den Zerfall schwerer Quarks in der Boson-Gluon-Fusion und die Wirkungsquerschnittsberechnungen im Rahmen der QCD eingegangen.

Die zur Beschreibung der untersuchten Prozesse und des Untergrundes verwendeten Monte-Carlo-Simulationen werden in **Kapitel 3** vorgestellt. Dabei werden auch die Auswirkungen der bei der Selektion der Ereignisse angebrachten Schnitte untersucht.

Kapitel 4 und **Kapitel 5** beschreiben den HERA-Speicherring, den H1-Detektor und das Triggersystem beim H1-Detektor. Dabei wird auch die Güte der Triggersimulationen analysiert.

Die Rekonstruktion der vom H1-Detektor aufgezeichneten Ereignisse und die für diese Analyse relevante Selektionskette wird in **Kapitel 6** beschrieben.

Die Untersuchungen einiger Größen mit Hinblick auf die Unterscheidung von Ereignissen mit Beauty-Quarks, Charm-Quarks und Untergrundereignissen zu ermöglichen, sind in **Kapitel 7** beschrieben.

Eine eingehende Untersuchung der Untergrund-Monte-Carlo-Simulation bezüglich der Fähigkeit, den erwarteten Untergrund aus Hadronen und Zerfallsmyonen leichter Hadronen zu beschreiben, ist in **Kapitel 8** zusammengefaßt.

Schließlich ist in **Kapitel 9** die Methode zur Bestimmung der Wirkungsquerschnitte von Charm- und Beauty-Ereignissen beschrieben, die Ergebnisse werden vorgestellt und eine Diskussion der Ergebnisse wird im Vergleich mit bereits erfolgten Messungen an anderen Experimenten durchgeführt.

Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird zunächst ein Überblick über die tief-inelastische Elektron-Proton-Streuung bei HERA gegeben. Anschließend wird die Photon-Proton-Streuung mit quasi-reellen Photonen, die Photoproduktion, beschrieben. Diese ist die Hauptquelle der Produktion schwerer Quarks, auf die anschließend näher eingegangen wird. Schließlich wird kurz der semileptonische Zerfall schwerer Quarks erläutert.

2.1 Die Kinematik der Elektron-Proton-Streuung

Die Elektron-Proton-Streuung wird durch den Austausch eines virtuellen Eichbosons, das mit einem Parton des Protons wechselwirkt, beschrieben. Dabei wird je nach Ladung des ausgetauschten Bosons zwischen geladenen Strömen („Charged Current", CC) und neutralen Strömen („Neutral Current", NC) unterschieden (siehe Abbildung 2.1):

$$\begin{aligned} \mathrm{CC} &: \quad ep \rightarrow \nu_e' X \\ \mathrm{NC} &: \quad ep \rightarrow e' X \end{aligned}$$

Bei geladenen Strömen wird ein W-Boson ausgetauscht. Neutrale Ströme sind durch den Austausch eines virtuellen Photons γ oder Z^0 beschrieben. Aufgrund der großen W- bzw.



Abbildung 2.1: *Feynman-Graphen der Elektron-Proton-Streuung für Prozesse mit neutralem und geladenem Strom.*

Z^0-Masse ist der Prozeß des Photonaustausches bei den HERA-Energien der dominierende Prozeß.

Die Kinematik bei HERA wird bei fester Schwerpunktenergie $\sqrt{s}$ durch zwei unabhängige Variablen bestimmt. Üblicherweise verwendet man hierzu die Virtualität Q^2 und eine der beiden dimensionslosen Skalenvariablen x oder y. Unter Verwendung der in Abbildung 2.1 definierten Viererimpulse kann die Kinematik wie folgt bestimmt werden:

$$s = (p_e + P)^2, \tag{2.1}$$

$$Q^2 = -q^2 = -(p_e - p_{e'})^2 \tag{2.2}$$

und

$$x = \frac{Q^2}{2P \cdot q}, \tag{2.3}$$

$$y = \frac{P \cdot q}{P \cdot p_e}. \tag{2.4}$$

Die Vierervektoren P, p_e und p_e' bezeichnen die Impulse von Proton, Elektron und gestreutem Lepton. Anschaulich stellt die Skalenvariable y den relativen Energieverlust des Positrons im Ruhesystem des Protons dar. Die Bjorkensche Skalenvariable x erhält im Quark-Parton-Modell (QPM) die anschauliche Bedeutung des Impulsanteils des an der Wechselwirkung beteiligten Partons. Die Variablen sind unter Vernachlässigung der Massen durch

$$Q^2 \approx xys \tag{2.5}$$

miteinander verknüpft.

Unter Vernachlässigung der Elektron- und Protonmasse erhält man mit $E_e = 27.6\,\mathrm{GeV}$ und $E_p = 820\,\mathrm{GeV}$:

$$\sqrt{s} \approx \sqrt{4E_eE_p} \approx 300\,\mathrm{GeV}. \tag{2.6}$$

Die kinematischen Grössen lassen sich aus zwei Observablen bestimmen. In der Regel vewendet man die Energie $E_{e'}$ und den Streuwinkel[1] $\Theta_{e'}$ des gestreuten Leptons. Mit der Energie des einlaufenden Elektrons E_e ergeben sich:

$$Q_e^2 = 4E_eE_{e'}\cos^2(\frac{\Theta_{e'}}{2}) \tag{2.7}$$

und

$$y_e = 1 - \frac{E_{e'}}{E_e}\sin^2(\frac{\Theta_{e'}}{2}). \tag{2.8}$$

Bei Photoproduktion ($Q^2 \to 0$) wird das Elektron unter sehr kleinen Winkeln gestreut, d.h. $\Theta_{e'} \simeq 180°$, und Gleichung 2.8 vereinfacht sich unter Verwendung der Photonenergie E_γ zu:

[1] Der Streuwinkel wird relativ zur Richtung des einlaufenden Protonstrahls gemessen.

$$y \approx 1 - \frac{E_{e'}}{E_e} = \frac{E_e - E_{e'}}{E_e} = \frac{E_\gamma}{E_e}. \tag{2.9}$$

Für die Photon-Proton-Schwerpunktenergie $W_{\gamma p}$ ergibt sich:

$$W_{\gamma p} = \sqrt{ys - Q^2} \approx \sqrt{ys} = 2\sqrt{yE_eE_p}. \tag{2.10}$$

Wird das gestreute Lepton nicht im Detektor nachgewiesen, z.B. in der Photoproduktion ($Q^2 \to 0$) oder wenn im Prozeß des geladenen Stromes ein Neutrino im Endzustand erzeugt wird, kann die gesamte Kinematik auch durch den hadronischen Endzustand festgelegt werden. Nach der Methode von Jacquet-Blondel [JBl79] werden die Energien und Impulse aller im Endzustand auftretenden Hadronen H bestimmt und aufsummiert:

$$y_{JB} = \frac{\sum\limits_H E - p_z}{2 \cdot E_e}, \tag{2.11}$$

$$Q^2_{JB} = \frac{(\sum\limits_H p_x)^2 + (\sum\limits_H p_y)^2}{1 - y_{JB}}. \tag{2.12}$$

Zur Beschreibung des hadronischen Endzustandes führt man noch zwei weitere Variablen ein. Die Rapidität $\hat{y}$ ist definiert durch:

$$\hat{y} = \frac{1}{2} \ln \frac{E + p_z}{E - pz}. \tag{2.13}$$

Die Verteilung von $\hat{y}$ ist bis auf eine additive Konstante invariant unter Lorentztransformation entlang der Protonrichtung. Außerdem definiert man die Pseudorapidität:

$$\eta = \frac{1}{2} \ln \frac{p + p_z}{p - pz} = - \ln(\tan(\frac{\Theta}{2})), \tag{2.14}$$

die unter Vernachlässigung der Masse des Teilchens gegenüber seiner Energie ($m \ll E$) gleich der Rapidität ist.

2.1.1 Tief-inelastische Streuung

In der tief-inelastischen Streuung wird das Proton durch ein hochvirtuelles Photon abgetastet. Das Quark-Parton-Modell führt die inelastische Elektron-Proton-Streuung auf die inkohärente Summe aller elastischen Streuungen des Photons an einem Parton aus dem Proton zurück. Der doppelt differentielle Wirkungsquerschnitt des neutralen Stromes lautet [Ing87]:

$$\frac{d^2\sigma(e^\mp)}{dxdQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{xQ^4}\left[y^2 x\mathcal{F}_1(x,Q^2) + (1-y)\mathcal{F}_2(x,Q^2) \pm \left(y - \frac{y^2}{2}\right) x\mathcal{F}_3(x,Q^2)\right] \tag{2.15}$$

$\mathcal{F}_1$, $\mathcal{F}_2$ und $\mathcal{F}_3$ bezeichnet man als Strukturfunktionen des Protons und α ist die Feinstrukturkonstante. $\mathcal{F}_3$ ist bestimmt durch die Differenz zwischen Quark- und Antiquarkdichten im Proton und kann bei kleinen Q^2 vernachlässigt werden, da dieser Term nur beim Z^0-Austausch auftritt. Die Strukturfunktion $\mathcal{F}_1$ beschreibt die Summe der Quarkdichten im Proton für Partonen mit Spin $\frac{1}{2}$ und die Strukturfunktion $\mathcal{F}_2$ beschreibt die Summe der Quarkdichten für

Partonen mit Spin $\frac{1}{2}$ und Spin 0. Partonen mit Spin 0 sind im Quark-Parton-Modell nicht im Proton vorhanden und $\mathcal{F}_1$ und $\mathcal{F}_2$ lauten:

$$\mathcal{F}_1(x) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n_q} e_i^2(q_i(x)+\bar{q}_i(x)) \tag{2.16}$$

$$\mathcal{F}_2(x) = x\sum_{i=1}^{n_q} e_i^2(q_i(x)+\bar{q}_i(x)). \tag{2.17}$$

Die Summe geht dabei über die Anzahl der verschiedenen Quarksorten n_q mit den Ladungen e_i im Proton. Die $q_i(x)$ geben die Wahrscheinlichkeit an, ein Quark der Sorte i mit dem Impulsanteil x am Protonimpuls zu finden. Mit der Callan-Gross-Relation [CGr69]:

$$\mathcal{F}_2(x,Q^2) = 2x\mathcal{F}_1(x,Q^2) \tag{2.18}$$

erhält man:

$$\frac{d^2\sigma}{dx\,dQ^2} = \frac{2\pi\alpha^2}{xQ^4}\left[2(1-y)+y^2\right]\mathcal{F}_2. \tag{2.19}$$

Geht man vom naiven statischen Quark-Parton-Modell zu einem dynamischen Modell über, das die starke Wechselwirkung zwischen den Quarks berücksichtigt, so können Quarks Gluonen abstrahlen, die wiederum Quark-Antiquark-Paare bilden können. Dadurch werden die Partondichten zusätzlich von Q^2 abhängig. Dieses nennt man *Skalenverletzung*.

Altarelli und Parisi [APi77] haben das dynamische Verhalten der Quark- und Gluondichten durch störungstheoretische Näherungsrechnungen für die Entwicklung in $\ln(Q^2)$ beschrieben. In führender Ordnung lauten die Entwicklungsgleichungen für die Quarkdichten $q_i(x,Q^2)$ *masseloser* Quarks:

$$\frac{dq_i(x,Q^2)}{d(\ln(Q^2))} = \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi}\int_x^1 \frac{dz}{z}\left[q_i(z,Q^2)P_{qq}\left(\frac{x}{z}\right) + g(z,Q^2)P_{qg}\left(\frac{x}{z}\right)\right] \tag{2.20}$$

und für die Gluondichte $g(x,Q^2)$:

$$\frac{dg(x,Q^2)}{d(\ln(Q^2))} = \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi}\int_x^1 \frac{dz}{z}\left[\sum_{i=u,d,\bar{u},\bar{d},\ldots} q_i(z,Q^2)P_{gq}\left(\frac{x}{z}\right) + g(z,Q^2)P_{gg}\left(\frac{x}{z}\right)\right] \tag{2.21}$$

Die sogenannten *Splitting*-Funktionen P_{qq}, P_{qg}, P_{gq} und P_{gg} geben die Wahrscheinlichkeiten der in Abbildung 2.2 aufgeführten Prozesse als Funktion des Anteils z am Impuls des einlaufenden Partons an.

Voraussetzung der Anwendbarkeit der Störungstheorie ist, daß die Kopplungskonstante der starken Wechselwirkung α_s klein gegen eins ist. Die Kopplungskonstante hängt von der Renormierungsskala μ_r ab und lautet in führender Ordnung:

$$\alpha_s(Q^2) = \frac{4\pi}{\beta_0\ln(Q^2/\Lambda^2)}, \tag{2.22}$$

wobei $\beta_0 = 11 - \frac{2}{3}n_q$ von der Zahl der beteiligten Quarksorten abhängt. Der Parameter Λ läßt sich nicht innerhalb der QCD berechnen.



Abbildung 2.2: *Splitting-Funktionen P_{ij}: z und $(1-z)$ geben die Impulsanteile am Impuls p des einlaufenden Partons an.*

Die Q^2-Abhängigkeit der Partondichten kann ausgehend von einer bestimmten Skala Q_0^2, bei der die Partondichten gemessen werden, zu einer beliebigen Skala Q^2 entwickelt werden, während die x-Abhängigkeit in den Anfangsparametrisierungen $q_i(x, Q_0^2)$ und $g(x, Q_0^2)$ der Partondichten festgelegt wird.

In Abbildung 2.3 sind einige Beispiele von Parametrisierungen der Gluondichte $(x_g \cdot g(x_g, Q_0^2))$ als Funktion des Impulsanteils des Gluons am Gesamtimpuls des Protons x_g dargestellt. Im Bereich kleiner x_g, der erst durch HERA zugänglich wurde, treten Unterschiede bis zu einem Faktor 3 auf. Die Parametrisierung MRS(A′) [MRS94] beschreibt ein langsames Ansteigen, während die Parametrisierung GRV_LO [GRV95] einen starken Anstieg der Gluondichte zu kleinen Werten von x_g zeigt. Die zur Zeit beste Beschreibung der $\mathcal{F}_2$-Messungen bei HERA ist durch die neuere Parametrisierung MRS(R2) gegeben [Leh98]. Diese zeigt eine ähnliche x_g-Abhängigkeit der Gluondichte wie MRS(A′) und ist deshalb nicht extra gezeigt.

2.1.2 Photoproduktion

Bei kleinem Q^2 spricht man von Photoproduktion. Der Prozeß der Elektron-Proton-Streuung wird dann durch einen Fluß von quasireellen Photonen, der von den Elektronen ausgeht, und den Subprozeß der Photon-Proton-Streuung beschrieben.

Totaler Photoproduktions-Wirkungsquerschnitt

Der differentielle Elektron-Proton-Wirkungsquerschnitt bei einer festen Schwerpunktenergie $\sqrt{s}$ setzt sich aus einem Anteil für transversal polarisierte Photonen und einem Anteil für longitudinal polarisierte Photonen zusammen:



Abbildung 2.3: *Die Gluondichte im Proton als Funktion von x_g. Gezeigt sind die Parametrisierungen MRS(A'), MRS(G), GRV94_LO und CTEQ_4M bei einer Skala von $Q_0^2 = 10\ GeV^2$.*

$$\frac{d^2\sigma_{ep}}{dydQ^2}(s) = \frac{\alpha}{2\pi Q^2}\left(A(y,Q^2)\cdot\sigma^T_{\gamma^*p}(y,Q^2) + B(y,Q^2)\cdot\sigma^L_{\gamma^*p}(y,Q^2)\right) \tag{2.23}$$

$A(y,Q^2)$ und $B(y,Q^2)$ sind kinematische Faktoren. Für kleine Q^2 ist die longitudinale Komponente vernachlässigbar, d.h. $\sigma^T_{\gamma^*p} \to \sigma^{tot}_{\gamma p}$, und man erhält unter Verwendung der Weizsäcker-Williams-Näherung [WWA34]:

$$\frac{d^2\sigma_{ep}}{dydQ^2} = \frac{d^2\mathcal{F}^T_\gamma}{dydQ^2}\cdot\sigma^{tot}_{\gamma p} \tag{2.24}$$

mit dem Fluß transversal polarisierter Photonen:

$$\frac{d^2\mathcal{F}^T_\gamma}{dydQ^2} = \frac{\alpha}{2\pi Q^2}\frac{1}{y}\left(1+(1-y)^2 - 2\frac{m_e^2 y^2}{Q^2}\right) = f_{\gamma/e}(y,Q^2) \tag{2.25}$$

Durch Integration über einen festen Bereich von Q^2 und y kann man den Elektron-Proton-Wirkungsquerschnitt durch den Photoproduktions-Wirkungsquerschnitt bei einem mittleren $\langle W_{\gamma p}\rangle$ und einem Photonfluß-Faktor darstellen:

$$\sigma_{ep} = \int\limits_{y_{min}}^{y_{max}} dy \int\limits_{Q^2_{min}(y)}^{Q^2_{max}} dQ^2 f_{\gamma/e}(y,Q^2)\cdot\sigma^{tot}_{\gamma p} = \mathcal{F}_{\gamma/e}\cdot\sigma^{tot}_{\gamma p}(\langle W_{\gamma p}\rangle) \tag{2.26}$$

Für Ereignisse, die in dem kinematischen Bereich

$$Q^2 < 0.01\,\mathrm{GeV}^2 \quad \text{und} \quad 0.3 < y < 0.7$$

liegen, wurde der totale Photoproduktions-Wirkungsquerschnitt bei einer mittleren Photon-Proton-Schwerpunktenergie $\langle W_{\gamma p} \rangle = 200\,\mathrm{GeV}$ von H1 gemessen [H1-95]:

$$\sigma_{\gamma p}^{tot} = (165.3 \pm 2.3 \pm 10.9)\,\mu\mathrm{b}.$$

Die Fehler repräsentieren die statistischen bzw. systematischen Unsicherheiten.

Die Photonstruktur

Das Photon zeigt neben der Rolle des elementaren Eichbosons der elektroschwachen Wechselwirkung, welches an geladene Materie koppelt, Eigenschaften eines stark wechselwirkenden Teilchens. Man unterscheidet in führender Ordnung der QCD folgende Beiträge:

- **Direkte Prozesse:** Das Photon koppelt direkt als punktförmiges Teilchen an ein Parton. In niedrigster Ordnung sind dieses der QCD-Compton-Prozeß und die Boson-Gluon-Fusion (siehe Abbildung 2.4 und Abbildung 2.7).
- **Hadronische Prozesse:** Aufgrund der Partonstruktur des Photons koppelt ein Parton aus dem Photon an ein Parton aus dem Proton. Man unterscheidet hier abhängig von der Virtuatität [SSj93]:
  - Vektormeson-Dominanz-Anteil (VDM): Bei kleinen Virtualitäten ist die Fluktuation in ein Quark-Antiquark-Paar langlebig und es kann sich eine Wolke von Gluonen um das Quark-Antiquark-Paar bilden. Man macht den Ansatz dieses durch eine Vektormeson-Wellenfunktion zu beschreiben. Dieser Anteil ist jedoch nicht in der perturbativen QCD berechenbar und benötigt einen phänomenologischen Ansatz.
  - Die anomale Komponente: Das Photon fluktuiert in ein Quark-Antiquark-Paar. Aufgrund höherer Virtualitäten entsteht dabei jedoch kein gebundener Zustand, sondern eines der entstandenen Quarks oder ein von diesen abgestrahltes Gluon wechselwirkt mit einem Parton aus dem Proton. Dieser Anteil liefert nur Beiträge bei hohen Transversalenergien und ist im Rahmen der perturbativen QCD berechenbar.

Der totale Photoproduktions-Wirkungsquerschnitt in führender Ordnung der QCD setzt sich somit aus einer direkten und einer hadronischen oder *aufgelösten* Komponente zusammen:

$$\sigma_{\gamma p}^{tot} = \sigma_{\gamma p}^{dir} + \sigma_{\gamma p}^{had} \tag{2.27}$$

Ein wichtiger Unterschied zwischen direkten und hadronischen Prozessen besteht darin, daß bei den hadronischen Prozessen nur noch ein Bruchteil x_γ der gesamten Photonenergie in den harten Subprozeß eingeht. Die nicht an der Wechselwirkung teilnehmenden Partonen fragmentieren zu einem hadronischen Photonrest, der etwa der Photonrichtung folgt.

Die hadronische Struktur des Photons wird analog zu den Altarelli-Parisi-Gleichungen [APi77] des Protons beschrieben. Die Gleichungen für die Gluondichte sind äquivalent zu denen



Abbildung 2.4: *Feynman-Graph des QCD-Compton-Prozesses.*



Abbildung 2.5: *Feynman-Graphen der Splitting-Funktion $P_{q\gamma}$ für die Kopplung eines Photons an ein Quark-Antiquark-Paar.*

des Protons. Bei den Gleichungen der Quarkdichten tritt allerdings zusätzlich zu den in Abbildung 2.2 aufgeführten Prozessen ein weiterer, der die Kopplung des Photons an ein Quark-Antiquark-Paar beschreibt (siehe Abbildung 2.5). Dieser muß in den Quarkdichten berücksichtigt werden [DeW79, FX97]:

$$\frac{dq_i(x,Q^2)}{d(\ln(Q^2))} = \frac{\alpha}{2\pi} P_{q\gamma}\left(\frac{x}{z}\right) + \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi} \int_x^1 \frac{dz}{z} \left[q_i(z,Q^2) \cdot P_{qq}\left(\frac{x}{z}\right) + g(z,Q^2) \cdot P_{qg}\left(\frac{x}{z}\right) \right] \quad (2.28)$$

$P_{q\gamma}$ ist die Splitting-Funktion der Kopplung eines Photons an ein Quark-Antiquarkpaar. Die Lösungen der durch den zusätzlichen Beitrag inhomogen gewordenen Altarelli-Parisi-Gleichungen setzen sich aus einer Überlagerung einer allgemeinen Lösung der homogenen (Gleichung 2.20) und der speziellen Lösung der inhomogenen Differentialgleichung zusammen. Die spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung wird als „anomaler“ Anteil und die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung als „VDM-Anteil“ interpretiert.

Wie beim Proton existieren eine Reihe von Parametrisierungen der Photon-Strukturfunktion. In Abbildung 2.6 ist die Gluondichte im Photon als Funktion von x_γ für zwei Parametrisierungen GRV-G_LO [GRV89] und LAC-G_Set1 [Che93] sowie die bei H1 erfolgten Messungen



Abbildung 2.6: *Gluondichte im Photon als Funktion von x_γ. Eingetragen sind die Parametrisierungen GRV-G_LO (durchgezogene Linie) [GRV89] und LAC-G_Set1 (gestrichelte Linie) [Che93] sowie die 1993 und 1994 erfolgten Messungen bei H1 (aus [Rck97]). Die Fehler der offenen Kreise [Huf94] repräsentieren die Gesamtfehler der Messung. Die Fehler der geschlossenen Kreise [Rck97] bestehen aus den statistischen Fehlern (innere Fehlerbalken) und der quadratischen Summe der statistischen und experimentellen systematischen Fehler.*

dargestellt [Huf94, Arp95, Rck97].

Man erkennt unter Berücksichtigung beider Messungen, daß die Parametrisierung GRV_LO die Daten besser beschreibt. Die Parametrisierung LAC_Set1 weist bei kleinen x_γ eine zu hohe Gluondichte auf.

2.2 Produktion schwerer Quarks

Der dominierende Prozess zur Produktion schwerer Quarks in der Elektron-Proton-Streuung ist die Photon-Gluon-Fusion (siehe Abbildung 2.7). Da der Wirkungsquerschnitt der Photon-Gluon-Fusion von der Gluondichte im Proton abhängt, können Messungen an schweren Quarks zur direkten Bestimmung der Gluondichte verwendet werden.

Zur vollständigen Beschreibung der Kinematik des harten Subprozesses sind neben den Größen der tief-inelastischen Streuung weitere Variablen notwendig. Dazu gehört die Schwerpunktenergie des Quark-Antiquark-Paares:

$$\hat{s} = (p_Q + p_{\bar{Q}})^2, \tag{2.29}$$

mit dem Quark- bzw. Antiquarkimpuls p_Q bzw. $p_{\bar{Q}}$. Weiterhin definiert man die Variable:

$$z = \frac{P \cdot p_Q}{P \cdot q}, \tag{2.30}$$



Abbildung 2.7: *Feynman-Graphen der Photon-Gluon-Fusion in niedrigster Ordnung.*

mit dem Impulsübertrag des Photons q. Der Winkel zwischen der Lepton- und der Hadronebene im Quark-Antiquark-Schwerpunktsystem ($\vec{p}_Q + \vec{p}_{\bar{Q}} = 0$) ist:

$$\cos\Phi = \frac{(\vec{p}_g \times \vec{l}_e) \cdot (\vec{p} \times \vec{p}_Q)}{|\vec{p}_g \times \vec{l}_e||\vec{p} \times \vec{p}_Q|} \tag{2.31}$$

mit dem Impuls $\vec{p}_g$ des am Prozeß beteiligten Gluons, der sich aus dem Impulsanteil x_g des Gluons am Gesamtimpuls des Protons ergibt:

$$\vec{p}_g = x_g \cdot \vec{P}. \tag{2.32}$$

Anschaulich ist die Variable z im Photon-Gluon-System eine Funktion des Winkels zwischen Photon-Gluon-Achse und Quark-Antiquark-Achse. Mit den eingeführten Variablen läßt sich das Quadrat des transversalen Quarkimpulses im Photon-Gluon-Schwerpunktsystem bestimmen:

$$p_t^2 = \hat{s}(1-z)z - m_Q^2. \tag{2.33}$$

Im folgenden werden zunächst die Produktionsmechanismen für schwere Quarks vorgestellt.

2.2.1 Prozesse in führender Ordnung

In niedrigster Ordnung der QCD, beschrieben durch die Photon-Gluon-Fusion, wechselwirkt ein vom Elektron ausgesandtes Photon mit einem Gluon vom Proton über ein Quark-Antiquark-Paar:

$$\gamma + g \to Q + \bar{Q}$$

Die Feynman-Graphen der Ordnung $\mathcal{O}(\alpha, \alpha_s)$ sind in Abbildung 2.7 dargestellt.

Neben den direkten Prozessen, die den Wirkungsquerschnitt bei der Produktion schwerer Quarks dominieren [Ali91], kann das Photon auch als Teilchen mit partonischer Struktur, die mit Partonen des Protons wechselwirken, betrachtet werden (siehe Abschnitt 2.1.2).



Abbildung 2.8: *Feynman-Graphen für a)Gluon-Gluon-Fusion und b) Quark-Antiquark-Annihilation.*

Direkte Prozesse

Nach Gleichung 2.26 ist der Elektron-Proton-Wirkungsquerschnitt in der Weizsäcker-Williams-Näherung durch den Photonfluß-Faktor mit dem Photon-Proton-Wirkungsquerschnitt verknüpft. Der Photon-Proton-Wirkungsquerschnitt kann in führender Ordnung für die direkte Komponente in einen Photon-Gluon-Wirkungsquerschnitt $\sigma_{\gamma g}$ und eine Gluondichte $g(x_g, \mu_f)$ faktorisiert werden [Fri78, Ell89]:

$$\sigma_{\gamma p} = \int dx_g g(x_g, \mu_f) \cdot \sigma_{\gamma g}(\hat{s}, m_Q, \mu_f, \mu_r). \tag{2.34}$$

Darin bedeuten μ_r die Renormierungskala, die bei der Berechnung der elementaren Photon-Parton-Wechselwirkung verwendet wird, und μ_f die Faktorisierungsskala, an der die Gluondichte im Proton ausgewertet wird. Die Skalen sind nicht festgelegt und nicht notwendigerweise gleich. Üblich sind in Photoproduktion die Verwendung von $\mu_r = \sqrt{m_Q^2 + p_t^2}$ oder $\mu_r = m_Q$ und $\mu_f = 2\mu_r$ bzw. $\mu_f = \mu_r$ für Charm- bzw. Beauty-Quarks mit der Quarkmasse m_Q und dem Transversalimpuls p_t des Quarks [FX94b].

Der Photon-Gluon-Wirkungsquerschnitt läßt sich in führender Ordnung wie folgt berechnen [Jon78]:

$$\sigma_{\gamma g} = \frac{\pi e_Q^2 \alpha \alpha_s}{\hat{s}} \left\{ \left[2 + 2\xi - \xi^2 \right] \ln \left(\frac{1+\chi}{1-\chi} \right) - 2\chi \left[1 + \xi \right] \right\}, \tag{2.35}$$

mit den Parametern $\chi = \sqrt{1-\xi}$ und $\xi = 4m_Q^2/\hat{s}$.

Aufgelöste Prozesse

Bei hohen Photon-Proton-Schwerpunktenergien, wie es bei HERA der Fall ist, werden Beiträge hadronischer Prozesse zur Produktion schwerer Quarks bis zu etwa 20% des Gesamtwirkungsquerschnittes erwartet. Bei der Produktion leichter Quarks dominiert die hadronische Komponente mit etwa 85% den Gesamtwirkungsquerschnitt.



Abbildung 2.9: *Beispiele für Feynman-Graphen von Prozessen höherer Ordnung im Vergleich zum Prozeß in führender Ordnung:*
a) $\mathcal{O}(\alpha\alpha_s) : \gamma g \to Q\bar{Q}$,
b) $\mathcal{O}(\alpha\alpha_s^3) : \gamma g \to Q\bar{Q}$,
c) $\mathcal{O}(\alpha\alpha_s^2) : \gamma g \to Q\bar{Q} + g$,
d) $\mathcal{O}(\alpha\alpha_s^2) : \gamma q \to Q\bar{Q} + q$.

In führender Ordnung werden schwere Quarks durch Gluon-Gluon-Fusion $g+g \to Q+\bar{Q}$ und Quark-Antiquark-Annihilation $q + \bar{q} \to Q + \bar{Q}$ erzeugt (siehe Abbildung 2.8). Die Quark-Antiquark-Annihilation beträgt allerdings nur etwa 10% der Gluon-Gluon-Fusion.

2.2.2 Prozesse höherer Ordnung

Basierend auf Ergebnissen von Ellis et al. [Ell89], die die Photoproduktion von Charm-Quarks bei Experimenten mit Schwerpunktenergien bis 20 GeV berechnet haben, wurden neuere Rechnungen von Frixione et al. [FX95] für die Photoproduktion schwerer Quarks bei HERA durchgeführt. Ergebnis dieser Rechnungen ist, daß die Korrekturen höherer Ordnung Beiträge der Größenordnung $\mathcal{O}(50\%)$ zu Charm-Wirkungsquerschnitten liefern [FX97].

Einige Feynman-Graphen der Prozesse höherer Ordnung sind in Abbildung 2.9 dargestellt. Der größte Beitrag der Ordnung $\mathcal{O}(\alpha, \alpha_s^2)$ (NLO[2]) stammt von der Gluonabstrahlung (Abb. 2.9c). Der Prozeß der Ordnung $\mathcal{O}(\alpha, \alpha_s^3)$ (Abb. 2.9b) interferiert mit dem Prozeß führender Ordnung, da beide Prozesse den gleichen Endzustand bilden, und trägt daher ebenfalls zur Ordnung $\mathcal{O}(\alpha, \alpha_s^2)$ bei. Der Prozeß der Quarkabstrahlung (Abb. 2.9d) trägt kaum zum

[2]Next to Leading Order

Gesamtwirkungsquerschnitt bei.

Bei der Berechnung der Wirkungsquerschnitte der Photon-Gluon-Fusion in perturbativer QCD sind, um Singularitäten zu vermeiden, Renormierungen notwendig. Hier gibt es hauptsächlich zwei Schemata, die 'DIS' bzw. '$\overline{\mathrm{MS}}$' bezeichnet werden und zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen führen [SvN92]. Hier soll dieses nicht weiter erläutert werden, jedoch ist die Angabe des Renormierungsschemas, in dem die Vorhersage gilt, notwendig. In den folgenden Abschnitten ist zur Berechnung der Vorhersagen, wenn es nicht explizit anders dargestellt ist, das Renormierungsschema 'DIS' verwendet worden. Dieses wird in der Programmbeschreibung zu [FMNR] in Verbindung mit Parametrisierungen der Photonstruktur nach GRV empfohlen.

2.2.3 NLO-Vorhersagen für Charm-Quarks

Die NLO-Vorhersagen für die Produktion von Charm-Quarks sind mit starken Unsicherheiten behaftet, die in Anlehnung an [FX95] zunächst kurz erläutert werden.

Unsicherheiten bei der Berechnung der NLO-Vorhersagen für direkte Prozesse sind proportional zu $\alpha\alpha_s^2 \ln(W_{\gamma p}^2/4m_c^2)$ und entstehen durch radiative Effekte, wie z.B. Gluonabstrahlung. Weitere Korrekturterme höherer Ordnungen der gleichen Art summieren sich zu Korrekturen proportional zu $\alpha\alpha_s^n \ln(W_{\gamma p}^2/4m_c^2)^n$ bei kleinen Werten von x_g. Abhängig von der gewählten Parametrisierung der Quark- und Gluondichten zeigen sich unterschiedlich ausgeprägte Beiträge der Korrekturen bis zur Größenordnung $\mathcal{O}(100\%)$ im Bereich der HERA-Schwerpunktenergien. Unsicherheiten der gleichen Art sind bei kleinen Werten von x_g auch in der hadronischen Komponente vorhanden und betragen zwischen 20% und 45%.

Weitere Unsicherheiten bei der Berechnung der Wirkungsquerschnitte ergeben sich aus der Wahl des Parameters Λ, welcher mit der starken Kopplungskonstanten gekoppelt ist (in führender Ordnung siehe Gleichung 2.22).

Die gewählte Parametrisierung der Gluondichte spielt eine Rolle bei kleinen Werten von x_g und hat somit auch großen Einfluß auf die Berechnung der Wirkungsquerschnitte, ebenso wie die Quarkmasse, die über die Wahl der Skalen in die Berechnung einfließt. Variationen der Quarkmasse um $m_c = (1.5 \pm 0.3)$ GeV bei fester Renormierungsskala bewirkt eine Änderung der direkten Komponente um einen Faktor 4, während die Wahl der Renormierungsskala bei fester Quarkmasse die direkte Komponente um einen Faktor 2 ändert.

Bei der hadronischen Komponente sind die Auswirkungen der Unsicherheiten der Quark-Masse und Renormierungskala noch dramatischer, wobei hier aber der Hauptbeitrag durch die Wahl der Parametrisierung der Photonstruktur gegeben ist.

In Tabelle 2.1 sind die Vorhersagen der Wirkungsquerschnitte der Charm-Photoproduktion bei $W_{\gamma p} = 174$ GeV getrennt nach direkter und hadronischer Komponente aufgeführt. Es wurden die Parametrisierungen MRS(G), MRS(A$'$) und GRV_LO für das Proton, sowie GRV-G_HO und LAC-G_Set 1 für das Photon untersucht.

Zur Berechnung[3] der Charm-Photoproduktions-Wirkungsquerschnitte wurden die üblichen QCD-Skalen $\mu_r = \mu_0$ und $\mu_f = 2\mu_0$ mit $\mu_0 = m_c = 1.5$ GeV gewählt [FX94a].

Die totalen Charm-Photoproduktions-Wirkungsquerschnitte hängen stark von der gewählten Parametrisierung der Photonstruktur ab. Der Anteil der hadronischen Komponente variiert zwischen etwa 15% und fast 70%. Jedoch nur die Summe aus direkter und hadronischer Komponente ist physikalisch sinnvoll.

[3] Die Berechnungen wurden mit dem von der Gruppe Frixione, Mangano, Nason und Ridolfi zur Verfügung gestellten Programmpaket [FMNR] durchgeführt.



Abbildung 2.10: *NLO-Vorhersagen der differentiellen Charm-Photon-Proton-Wirkungsquerschnitte als Funktion von p_t und η des Quarks jeweils für die Anteile der direkten Komponente mit der Parametrisierung der Proton-Struktur MRS(G) und der hadronischen Komponenten mit gleicher Proton-Struktur-Parametrisierung und den Parametrisierungen GRV-G_HO (GRV) bzw. LAC-G_SET1 (LAC) für die Photonstruktur. Unten sind die differentiellen Wirkungsqerschnitte jeweils nach einem Schnitt $|\eta| < 1.5$ bzw. $p_t > 2\,GeV$ dargestellt.*

Gluondichte		$\sigma_{dir}(\gamma p \to c\bar{c}X)$	$\sigma_{had}(\gamma p \to c\bar{c}X)$	$\sigma_{tot}(\gamma p \to c\bar{c}X)$
Proton	Photon	[μb]	[μb]	[μb]
MRS(G)	GRV-G_HO	6.97	1.27	8.24
	LAC-G_SET1		7.97	14.94
MRS(A′)	GRV-G_HO	4.01	1.21	5.22
	LAC-G_SET1		8.23	12.24
GRV_LO	GRV-G_HO	9.45	1.48	10.93
	LAC-G_SET1		8.68	18.13

Tabelle 2.1: *NLO-Vorhersagen der direkten und hadronischen Komponenten der Charm-Photoproduktions-Wirkungsquerschnitte bei einer Photon-Proton-Schwerpunktenergie von* $W_{\gamma p} = 174$ *GeV. Es wurden die QCD-Skalen* $\mu_r = \mu_0$ *und* $\mu_f = 2\mu_0$ *mit* $\mu_0 = m_c = 1.5$ *GeV gewählt.*

Abbildung 2.10 zeigt die differentiellen Charm-Photoproduktionswirkungsquerschnitte als Funktion des transversalen Impulses p_t und Pseudorapidität η der Quarks. Die p_t-Verteilung der hadronischen Komponenten zeigt ein weicheres Verhalten als das der direkten Komponente. Allerdings ist der hadronische Anteil der Photonstruktur nach LAC-G_SET1 bei kleinen Transversalimpulsen wesentlich größer als der direkte Anteil. Die Pseudorapidität η zeigt, daß bei Ereignissen mit hadronischer Photoproduktion der hadronische Endzustand sehr weit in Protonrichtung (große η) zu erwarten ist.

Der Meßbereich dieser Analyse liegt bei etwa $p_t > 3\,\mathrm{GeV}$ und $-1 < \eta < 1.4$. Aber schon bei Schnitten von $p_t > 2\,\mathrm{GeV}$ und $-1.5 < \eta < 1.5$ ist nur noch ein geringer Unterschied zwischen den beiden Annahmen der Parametrisierung der Photonstruktur zu erkennen (siehe Abbildung 2.10 unten). Der hadronische Anteil am totalen Charm-Photon-Protonwirkungsquerschnitt sinkt unter 10% (siehe Abbildung 2.11).

Abbildung 2.12 zeigt den totalen Charm-Photoproduktions-Wirkungsquerschnitt als Funktion der Photon-Proton-Schwerpunktenergie mit der Parametrisierung MRS(G) für das Proton und der Parametrisierung GRV-G_HO für das Photon. Es ist der Bereich gezeigt, der sich durch die Variation der QCD-Skalen $\mu_0 = 0.5m_c$ und $\mu_0 = 2m_c$ ergibt.

Außerdem sind die bereits erfolgten Messungen von Experimenten mit kleinen Schwerpunktenergien und Messungen von H1 und ZEUS bei HERA eingetragen [H1-96a]. Man erkennt gute Übereinstimmungen der Messungen mit der Vorhersage innerhalb der theoretischen Unsicherheiten.

2.2.4 NLO-Vorhersagen für Beauty-Quarks

Dank der größeren Masse der Beauty-Quarks, die in die Skala der perturbativen QCD eingeht, sind die Vorhersagen für Beauty-Quarks zuverlässiger als Charm-Vorhersagen [FX95]. Alle Unsicherheiten, die sich bei der Berechnung der Charm-Wirkungsquerschnitte ergeben, sind stark reduziert. Die Berücksichtigung der Korrekturen bei kleinen Werten von x_g Erhöhen die Resultate NLO-Vorhersagen um etwa 5% [FX97]. Die Variation *aller* weiterer bei Charm-Quarks diskutierter Unsicherheiten in jeweils die Richtung, die den gleichen Einfluß, steigend oder fallend, auf den direkten Photoproduktions-Wirkungsquerschnitt hat, bewirkt eine Unsicherheit von einem Faktor 2 [FX94b]. Die Unsicherheiten der hadronische Komponente sind wiederum größer (Faktor 3). Sie sind allerding im Vergleich zu den Unsicherheiten durch die





Abbildung 2.11: *NLO-Vorhersagen der gesamten differentiellen Charm-Photon-Proton-Wirkungsquerschnitte als Funktion von p_t und η des Quarks. Dargestellt sind jeweils die Summe aus direkter und hadronischer Komponente. Außerdem sind die Auswirkungen nach einem Schnitt $|\eta| < 1.5$ (links) bzw. $p_t > 2$ GeV (rechts) dargestellt.*



Abbildung 2.12: *Totale Charm-Photoproduktions-Wirkungsquerschnitte als Funktion der Photon-Proton-Schwerpunktenergie.*

Gluondichte		$\sigma_{dir}(\gamma p \to b\bar{b}X)$	$\sigma_{had}(\gamma p \to b\bar{b}X)$	$\sigma_{tot}(\gamma p \to b\bar{b}X)$
Proton	Photon	[nb]	[nb]	[nb]
MRS(G)	GRV-G_HO	42.41	9.29	51.70
	LAC-G_SET1		23.28	65.69
MRS(A′)	GRV-G_HO	38.19	9.83	48.02
	LAC-G_SET1		24.74	62.93
GRV_LO 94	GRV-G_HO	50.28	9.33	59.61
	LAC-G_SET1		21.38	71.66

Tabelle 2.2: *NLO-Vorhersagen der direkten und hadronischen Komponenten der Beauty-Photoproduktions-Wirkungsquerschnitte bei einer Photon-Proton-Schwerpunktenergie von* $W_{\gamma p} = 182$ *GeV. Es wurden die QCD-Skalen* $\mu_r = \mu_f = \mu_0 = m_b = 5.0$ *GeV gewählt.*

hadronische Komponente bei Charm-Quarks (Faktor 10) klein.

In Tabelle 2.2 sind die NLO-Vorhersagen der Beauty-Photoproduktions-Wirkungsquerschnitte angegeben. Die Werte sind ebenfalls getrennt für die direkte und hadronische Komponente angegeben. Es sind die gleichen Parametrisierungen für die Proton-Struktur und die Photonstruktur wie bei den Angaben der Charm-Wirkungsquerschnitte verwendet worden. Die Berechnungen wurden bei den QCD-Skalen $\mu_r = \mu_f = \mu_0 = m_b = 5.0\,\text{GeV}$ durchgeführt.

Der Anteil der hadronischen Komponente am totalen Photoproduktions-Wirkungsquerschnitt variiert hier nur zwischen 15% und etwa 40%.

In Abbildung 2.13 ist der differentielle Beauty-Photoproduktions-Wirkungsquerschnitt als Funktion des Transversalimpulses p_t und der Pseudorapidität η des Quarks dargestellt. Im Gegensatz zum Charm-Wirkungsquerschnitt wird die hadronische Komponente im von H1 meßbaren Bereich nie größer als die direkte. Allerdings sind die beiden Photonstruktur-Parametrisierungen nur bei kleinen Transversalimpulsen unterscheidbar.

Durch einen Schnitt in der Pseudorapidität von $|\eta| < 1.5$ wird der vorhergesagte hadronische Anteil mit Parametrisierung der Photonstruktur nach LAC-G_SET1 sogar kleiner als der Anteil nach GRV-G_HO Parametrisierung. Der Anteil am totalen Photoproduktions-Wirkungsquerschnitt sinkt unter 10%(siehe Abbildung 2.14).

In den Abbildungen 2.15 und 2.16 ist der Beauty-Photoproduktions-Wirkungsquerschnitt als Funktion der Photon-Proton-Schwerpunktenergie aufgetragen. Abbildung 2.15 beschreibt den Beauty-Photoproduktions-Wirkungsquerschnitt mit der Proton-Struktur-Parametrisierung MRS(R2), die am besten von $\mathcal{F}_2$-Messungen bestätigt werden kann, und der Parametrisierung der Photonstruktur GRV-G_HO mit der Unsicherheit, die sich aufgrund der Variation der Quarkmasse bzw. der Renormierungs- und Faktorisierungsskala ergibt. Die betrachteten Unsicherheiten sind einzeln betrachtet etwa gleich groß. In Abbildung 2.16 ist der Beauty-Photoproduktions-Wirkungsquerschnitt getrennt nach direkter und hadronischer Komponente für die Proton-Struktur mit MRS(G)-Parametrisierung und die Photonstruktur mit GRV-G_HO-Parametrisierung dargestellt. Außerdem sind die Kurven für die größtmögliche Variation der QCD-Skalen in die Richtung, die eine Erhöhung des Wirkungsquerschnittes bewirken ohne die Grenzen des Phasenraumes, in dem die Vorhersage gilt, zu überschreiten, eingetragen [FX94b]. Es wurden dazu folgende Parameter gewählt: $\mu_r = 0.5\mu_0$ und $\mu_f = 0.5\mu_0$ mit $\mu_0 = m_b = 4.5\,\text{GeV}$ und $\Lambda = 340\,\text{MeV}$.

Die ep-Wirkungquerschnitte für schwere Quarks sind außer von Frixione et al. auch von J. Smith und W.L van Neerven für unterschiedliche Renormierungsschemata berechnet worden



Abbildung 2.13: *NLO-Vorhersagen der differentiellen Beauty-Photon-Proton-Wirkungsquerschnitte als Funktion von p_t und η des Quarks jeweils für die Anteile direkter (MRS(G)) und hadronischer Komponenten (GRV-G_HO bzw. LAC-G_SET1). Unten sind die differentiellen Wirkungsquerschnitte jeweils nach einem Schnitt $|\eta| < 1.5$ bzw. $p_t > 2\,GeV$ dargestellt.*



Abbildung 2.14: *NLO-Vorhersagen der gesamten differentiellen Beauty-Photon-Proton-Wirkungsquerschnitte als Funktion von p_t und η des Quarks. Dargestellt sind jeweils die Summe aus direkter und hadronischer Komponente. Außerdem sind die Auswirkungen jeweils nach einem Schnitt $|\eta| < 1.5$ bzw. $p_t > 2$ GeV dargestellt.*



Abbildung 2.15: *Totale Beauty-Photoproduktions-Wirkungsquerschnitte als Funktion der Photon-Proton-Schwerpunktenergie.*



Abbildung 2.16: *Anteile von direkter (gestrichelt) und aufgelöster (punktiert) Komponente am totalen (durchgezogen) Beauty-Photoproduktions-Wirkungsquerschnitt als Funktion der Photon-Proton-Schwerpunktenergie für unterschiedliche Quarkmassen und QCD-Skalen.*

	DIS			$\overline{\text{MS}}$		
	$\mu_f = m_b/2$	$\mu_f = m_b$	$\mu_f = 2m_b$	$\mu_f = m_b/2$	$\mu_f = m_b$	$\mu_f = 2m_b$
$\sigma\mathcal{O}(\alpha_s)$	4.94	4.60	4.36	4.30	4.16	4.02
$\sigma\mathcal{O}(\alpha_s^2)$	3.83	2.53	2.15	3.57	2.43	2.10
σ_{tot}	8.77	7.13	6.51	7.87	6.59	6.12

Tabelle 2.3: Vorhersagen des ep-Wirkungsquerschnittes für Beauty-Quarks nach [SvN92] für die Parametrisierung der Gluondichte im Proton nach Morfin-Tung [MoT91].

[SvN92]. In Tabelle 2.3 sind die Ergebnisse für Beauty-Quarks der Masse $m_b = 4.75\,\text{GeV}$ zusammengefaßt.

2.3 Semileptonischer Zerfall schwerer Quarks

Der Zerfall schwerer Quarks wird im Standard-Modell durch die elektroschwache Wechselwirkung beschrieben. Die Zerfallsbreite Γ des Prozesses $q^a \to q^b X$ ist proportional zu den Elementen der Cabbibo-Kobayashi-Maskawa-Matrix (CKM) [Cab63], [KM73]:

$$\Gamma(q^a \to q^b X) \propto |V_{q^a q^b}|^2 \tag{2.36}$$



Abbildung 2.17: *Feynman-Graphen für semimyonische Zerfälle von Charm- und Beauty-Quarks.*

Quark	Masse [GeV]	$\mathrm{Br}(Q \to \mu)$	$\mathrm{Br}(Q \to e)$	$\mathrm{Br}(Q \to \tau)$
c	1.87	0.11	0.11	0
b	5.27	0.11	0.11	0.026

Tabelle 2.4: *Theoretisch berechnete Verzweigungsverhältnisse schwerer Quarks in Leptonen.*

Die dominierenden Zerfälle schwerer Quarks sind:

$$b \rightarrow c\mathrm{W}^- \quad (2.37)$$
$$c \rightarrow s\mathrm{W}^+ \quad (2.38)$$

Das bei dem Zerfall erzeugte W-Boson ist virtuell. Es kann entweder hadronisch in ein Quark-Antiquark-Paar oder semileptonisch in ein Lepton-Neutrino-Paar zerfallen. In Abbildung 2.17 sind die Feynman-Graphen für semimyonische Zerfälle schwerer Quarks dargestellt.

Zusätzlich zu diesen elementaren Graphen gibt es den Kaskadenzerfall, bei dem das aus einem Beauty-Zerfall stammende Charm-Quark ein Myon hervorbringt: $b \to W^-c \to W^-\mu X$. Aufgrund der höheren Masse der Beauty-Quarks ist der Zerfallskanal $\mathrm{W}^- \to c\bar{s}$ kinematisch erlaubt und es gibt einen weiteren Beitrag zum Kaskadenzerfall $b \to c\bar{s}c \to \mu^+X$. Zur Berechnung der Zerfallswahrscheinlichkeiten sind, neben den CKM-Matrixelementen, QCD-Korrekturen und Berücksichtigung von Phasenraumfaktoren noch leichte Quarks zu berücksichtigen, die beim Zerfall eines schweren Mesons an das schwere Quark gekoppelt sind. Beim *Zuschauermodell* werden die leichten Quarks vernachlässigt, und man erhält die in Tabelle 2.4 berechneten Werte der Zerfallswahrscheinlichkeiten schwerer Quarks [EKu88].

Einige experimentell bestimmte Verzweigungsverhältnisse sind in Tabelle 2.5 zusammengefaßt.

$\mathrm{Br}(c \to \mu)$ [%]		$\mathrm{Br}(b \to \mu)$ [%]	
$7.8 \pm 0.9 \pm 1.2$	[MAR88]	$11.4 \pm 0.3 \pm 0.4$	[ALE93]
$8.6 \pm 1.7^{+0.8}_{-0.7}$	[ARG92]	$10.2 \pm 0.5 \pm 0.2$	[ARG93]
9.6 ± 1.1	[OPA93]	10.5 ± 0.5	[OPA93]

Tabelle 2.5: *Experimentell bestimmte Verzweigungsverhältnisse schwerer Quarks in Myonen.*

Kapitel 3

Monte-Carlo-Simulationen

Um u.a. physikalische Prozesse statistisch nachvollziehen und Detektoreffekte studieren zu können, werden Monte-Carlo-Simulationen verwendet. Dabei handelt es sich um Programme, die z.B. die Vierer-Vektoren aller in einer Elektron-Proton-Streuung entstandenen Teilchen unter Verwendung theoretischer Modelle berechnen. Dieses gliedert sich in drei Schritte:

1. *Generierung der Ereignisse:*

   Die Elektron-Proton-Streuung wird in das theoretische Modell von drei Subprozessen eingeteilt:

   - Der harte Subprozeß der Parton-Parton-Wechselwirkung,
   - Kopplung eines Partons, welches in den harten Subprozeß eingeht, an das Elektron bzw. an ein Photon,
   - Kopplung des anderen Partons an das Proton.

   Die aus dem harten Prozeß entstandenen Partonen hadronisieren dann nach einem Fragmentationsmodell (siehe Abschnitt 3.3) zu stabilen Teilchen. Alle hierfür notwendigen Rechnungen erfolgen in Monte-Carlo-Generatoren.

2. *Simulation der Ereignisse:*

   Die aus der Generierung erhaltenen stabilen Teilchen werden einer vollständigen Simulation der Detektoreffekte unterzogen. Die Simulation erfolgt mit Hilfe des Programmpaketes *H1SIM*. Die Detektorantwort besteht aus allen Signalen der Detektorkomponenten, wie sie auch bei der Datennahme aufgezeichnet werden.

3. *Rekonstruktion der Ereignisse:*

   Die aus der Simulation erhaltenen Detektorsignale durchlaufen die komplette Rekonstruktions- und Klassifikationskette wie die Daten. Dabei werden die gleichen Programmpakete, wie zur Rekonstruktion der Ereignisse der Datennahme verwendet.

Nach der vollständigen Simulation und Rekonstruktion der Ereignisse können diese den gleichen Analysetechniken unterzogen werden, die für die Ereignisse der Datennahme angewendet werden. Im folgenden wird der Begriff „Simulation“ für beide Teile, Simulation und Rekonstruktion, verwendet.

Das Besondere bei der hier verwendeten Analyse ist die starke Einbindung der Monte-Carlo-Simulationen. Da sich der untersuchte Prozeß nicht durch Rekonstruktion z.B einer invarianten Masse separieren läßt, werden die Monte-Carlo-Simulationen nicht nur, wie bei „exklusiven" Analysen, zu Vergleichen und zur Verbesserung der statistischen Signifikanz, sondern auch direkt zur Separation der beteiligten Prozesse verwendet.

Zunächst erfolgt eine Beschreibung der in dieser Analyse verwendeten Monte-Carlo-Generatoren. Anschließend werden die Ergebnisse von Studien der generierten Ereignisse präsentiert.

3.1 Die Produktion schwerer Quarks mit dem Monte-Carlo-Generator AROMA

Der Monte-Carlo-Generator AROMA 2.1 [Aro95] simuliert schwere Quarks über den Prozeß der Boson-Gluon-Fusion in der Elektron-Proton-Streuung. Dabei werden alle elektroschwachen Prozesse sowie die Quarkmassen berücksichtigt. Der harte Subprozeß wird in führender Ordnung $\mathcal{O}(\alpha^2, \alpha_s)$ sowohl für Photoproduktion als auch für tief-inelastische Streuung berechnet. Korrekturen der Ordnung $\mathcal{O}(\alpha^2, \alpha_s^2)$ der inklusiven Quark-Verteilungen (p_t und *Rapidität*) werden durch einen Korrekturfaktor am differentiellen Wirkungsquerschnitt berücksichtigt, da die Verteilungen in beiden Ordnungen den gleichen Verlauf zeigen. Die absolute Vorhersage des Wirkungsquerschnittes wird unterschätzt [LRS93]. Weitere Effekte durch Gluon-Bremsstrahlung der erzeugten Quarks werden durch Parton-Schauer-Simulationen berücksichtigt. Dabei wurden die Ergebnisse von Jet-Analysen in e^+e^--Experimenten verwendet. Außerdem werden Abweichungen von der in führender Ordnung genau entgegengesetzten Flugrichtung der Quarks, die z.B. durch einen kleinen transversalen Impuls des Gluons oder durch Gluonabstrahlung hervorgerufen werden können, durch Generierung eines gaußverteilten transversalen Impulses des Quark-Antiquark-Paares relativ zur Photon-Proton-Achse simuliert.

Folgende Prozesse werden nicht im AROMA-Monte-Carlo-Generator berücksichtigt, da ihr Anteil am Gesamtwirkungsquerschnitt als vernachlässigbar betrachtet wird:

- Mischung mit Prozessen des geladenen Stromes,
- Intrinsischer Charm im Proton,
- Hadronische Prozesse mit aufgelösten Photonen und
- diffraktive Prozesse.

Die erzeugten Partonen werden anschließend der Fragmentation unterzogen. Diese erfolgt durch das Programmpaket JETSET [Pyt93]. Dabei bestehen unterschiedliche Wahlmöglichkeiten für Fragmentationsmodelle (siehe Abschnitt 3.3). Voreingestellt und verwendet worden ist die Fragmentation nach dem Lund-String-Modell. Die enthaltenen Verzweigungsverhältnisse in Myonen betragen für Beauty-Quarks $Br(b \to \mu X) = 10.5\%$ bzw. $Br(b \to c \to \mu X) = 8.5\%$ und für Charm-Quarks $Br(c \to \mu X) = 9.3\%$. Diese sind in guter Übereinstimmung mit den gemessenen Werten (siehe Tabelle 2.5).

Der Vergleich der LO-Rechnung mit den simulierten NLO-Korrekturen des AROMA-Monte-Carlo-Generators mit den NLO-Rechnungen von Frixione et al. ist in Abbildung 3.1 für

	Aroma-cc-MC	Aroma-bb-MC
σ_{ep} [nb]	606.68	3.13
$\int \mathcal{L}$ [pb^{-1}]	9.95	31.66
Generierte Ereignisse	6,100,000	100,000
Ereignisse nach Generatorschnitten: $p_{t\mu} > 1\,\mathrm{GeV}$, $5° < \Theta_\mu < 175°$	59,949	15,755
Ereignisse nach der Vorselektion (Abschnitt 6.1.5)	2292	3028

Tabelle 3.1: *Daten der in dieser Arbeit verwendeten* AROMA*-Monte-Carlo-Simulationen. Die Schnitte in $p_{t\mu}$ und Θ_μ beziehen auf mindestens ein Myon des semileptonischen Zerfalls der Quarks beim Generieren der Ereignisse. Nur Ereignisse, die diese Generator-Schnitten passiert haben, wurden simuliert.*

die differentiellen Wirkungsquerschnitte der direkten Photoproduktion dargestellt. In beiden Fällen ist als Proton-Strukturfunktion die MRS(G)-Parametrisierung verwendet worden. Zusätzlich zu den reinen NLO-Rechnungen ist eine weitere Kurve eingezeichnet, in der die Quarks einer Peterson-Fragmentation (siehe Abschnitt 3.3) unterzogen worden sind und das Quark-Antiquark-System einen transversalen Impuls erhielt, wobei die Verteilungen der p_x und p_y als gaußverteilt mit der Breite $\frac{\sigma_p}{p} = \sqrt{2}$ angenommen wurden. Die differentiellen Verteilungen des AROMA-Monte-Carlo-Generators sind jeweils auf den totalen Wirkungsquerschnitt der NLO-Rechnung normiert.

Zwischen den reinen NLO-Rechnungen und den Vorhersagen des AROMA-Monte-Carlo-Generators findet man sehr gute Übereinstimmung. Die Anwendung der Fragmentation und Korrekturen durch einen Transversalimpuls des Quark-Antiquark-Systems auf die NLO-Vorhersagen erzeugt ein weicheres p_t-Spektrum, und kleine Abweichungen von der Vorhersage des AROMA-Monte-Carlo-Generators werden sichtbar. Dieses ist verständlich, da die schweren Quarks im AROMA-Monte-Carlo-Generator erst später in JETSET der Fragmentation unterzogen werden.

Der AROMA-Monte-Carlo-Generator wird in Verbindung mit der Simulation und Rekonstruktion der generierten Ereignisse in dieser Analyse zur Beschreibung der erwarteten Verteilungen der Charm- und Beauty-Quarks aus dem Prozeß der Photon-Gluon-Fusion mit direkter Kopplung der Photonen an die Gluonen verwendet. Im folgenden werden die Bezeichnungen *Aroma-cc-MC-Simulation* bzw. *Aroma-bb-MC-Simulation* für Ereignisse, die mit Charm- bzw. Beauty-Quarks generiert, simuliert und rekonstruiert wurden, verwendet. In Tabelle 3.1 sind die in dieser Analyse verwendeten Ereigniszahlen der AROMA-Monte-Carlo-Simulation zusammen gefaßt.

3.2 Der erwartete Untergrund für Myonen

Neben kosmischen Myonen besteht der Untergrund zu Zerfallsmyonen schwerer Quarks hauptsächlich aus Hadronen, die eine Myonsignatur im Detektor hinterlassen, oder aus Zerfallsmyonen von Hadronen, welche in der vorliegenden Arbeit zusammenfassend als *Untergrund* bezeichnet werden.

Während kosmische Myonen durch geeignete Schnitte stark unterdrückt werden können, muß zur Beschreibung und genaueren Untersuchung des Untergrundes eine weitere Monte-Carlo-



Abbildung 3.1: *Vergleich der differentiellen NLO-Photoproduktions-Wirkungsquerschnitte für Charm- (oben) und Beauty-Quarks (unten) als Funktion des transversalen Impulses p_t und der Rapidität η mit den Vorhersagen des* AROMA*-Monte-Carlo-Generators. Die Verteilungen des* AROMA*-Monte-Carlo-Generators sind jeweils auf den totalen Wirkungsquerschnitt der NLO-Rechnung normiert. Die NLO-Vorhersagen für Charm-Quarks gelten für $W_{\gamma p} = 174$ GeV, die für Beauty-Quarks für $W_{\gamma p} = 182$ GeV. Die Werte der Photon-Proton-Schwerpunktenergie wurden in Anlehnung an die Werte der Messung in dieser Arbeit gewählt. Für die Vorhersage des* AROMA*-Monte-Carlo-Generators wurden Ereignisse aus dem jeweils angegebenen Bereich der Photon-Proton-Schwerpunktenergie verwendet. Die Bereiche wurden so gewählt, daß der Wert, an dem der Wirkungsquerschnitt berechnet wurde, etwa in der Mitte des Bereiches liegt.*

Simulation herangezogen werden. In Photoproduktion dominiert die Produktion leichter Quarks und diese werden zu etwa 85% von Prozessen mit aufgelöstem Photon erzeugt. Daher wird zur Beschreibung des Untergrundes ein Monte-Carlo-Generator gewählt, der Prozesse mit aufgelösten und direkten Prozessen des Photons generiert. Die Erzeugung des Photonenspektrums erfolgt mit dem Monte-Carlo-Generator IJRAY [Abt93]. Zur Beschreibung des harten Subprozesses wird der Monte-Carlo-Generator PYTHIA [Pyt93] verwendet. Ebenso wie im AROMA-Monte-Carlo-Generator wird die Fragmentation durch den Monte-Carlo-Generator JETSET beschrieben.

Beim Erzeugen der Ereignisse wurden nur solche zur Simulation und Rekonstruktion weiterverwendet, die schon auf Vierervektorniveau mindestens ein Teilchen mit einem Impuls $p > 2\,\mathrm{GeV}$ innerhalb des Polarwinkelbereiches von $35° < \Theta < 130°$ und mindestens Jet mit einer transversalen Energie $E_t > 6\,\mathrm{GeV}$ besaßen.

In Kapitel 8 wird eingehend untersucht, ob die so erzeugten Ereignisse die Untergrunddaten beschreiben.

3.2.1 Die Erzeugung des Photonenspektrums mit IJRAY

Mit dem Programm IJRAY wird der QED-Prozeß $e \rightarrow e'\gamma$ generiert. Hierbei wird das vollständige Spektrum des transversalen Flusses der vom Elektron abgestrahlten Photonen erzeugt. Es ist möglich, den gesamten kinematischen Bereich in Q^2 und y zu generieren. In dieser Arbeit wird aber nur der Photoproduktionsbereich $Q^2 < 4\,\mathrm{GeV}^2$ ausgenutzt.

3.2.2 Der Ereignisgenerator PYTHIA

Der Ereignisgenerator PYTHIA 5.7, ursprünglich für Hadron-Hadron-Streuung entwickelt und für e^+e^-- und ep-Streuung weiterentwickelt, wurde nur für die Simulation der Photon-Proton-Wechselwirkung verwendet. Der QED-Prozeß der Photonabstrahlung vom Elektron und die anschließende direkte und hadronische Behandlung des Photons wird von dem Programm IJRAY berechnet (siehe Abschnitt 3.2.1). Die Beschreibung der Wechselwirkung reduziert sich auf die Wechselwirkung eines Partons aus dem Photon mit einem Parton aus dem Proton. Die Berechnung erfolgt mit Matrixelementen in führender Ordnung der Störungstheorie. Bei den direkten Prozessen trägt nur die Photon-Gluon-Fusion bei, bei den aufgelösten Prozessen werden Gluon-Gluon- und Quark-Antiquark-Prozesse berücksichtigt. Außerdem wird das Aufschauern der erzeugten Quarks im Anfangs- und Endzustand nach dem Parton-Schauer-Modell generiert.

3.3 Die Fragmentation mit JETSET

Die Fragmentation der Quarks der in diesem Abschnitt beschriebenen Monte-Carlo-Generatoren, wird mit dem Programm JETSET durchgeführt. Da es sich bei der Fragmentation um langreichweitige Prozesse handelt, die nicht mehr störungstheoretisch im Rahmen der QCD behandelt werden können, sind phänomenologische Ansätze notwendig. Man unterscheidet zwischen unterschiedlichen Modellen. Hier sollen nur die zwei wichtigsten aufgezählt und kurz beschrieben werden:

- Lund-String-Fragmentation,
- unabhängige Fragmentation.

Allen Fragmentationsmodellen ist ein iteratives Vorgehen gemeinsam. Ausgehend von einem Anfangsquark q_0 wird ein neues $q_1\bar{q}_1$-Paar erzeugt, welches mit dem Anfangsquark ein Meson $q_0\bar{q}_1$ bildet. Das frei werdende Quark q_1 erzeugt durch Bildung eines weiteren $q_2\bar{q}_2$-Paares ein weiteres Meson, usw. Zu diesem Vorgang werden eine Wahrscheinlichkeitsdichte, daß ein $q_i\bar{q}_i$-Paar gebildet werden kann, und die Wahrscheinlichkeit, daß das $q_{(i-1)}\bar{q}_i$-Paar ein Meson bilden kann, benötigt. In JETSET werden die beiden Wahrscheinlichkeiten faktorisierend betrachtet.

Die Erzeugung des $q_1\bar{q}_1$-Paares erfolgt in den Modellen unterschiedlich.

3.3.1 Lund-String-Fragmentation

Im Lund-String-Fragmentationsmodell wird zur Erzeugung des $q_1\bar{q}_1$-Paares von dem auseinanderfliegenden $q_0\bar{q}_0$-Paar ausgegangen. Dieses spannt ein Farb-Dipolfeld auf. Je größer der Abstand zwischen den Quarks ist, desto größer wird die potentielle Energie zwischen den Farbladungen. Beim Lund-String-Modell wird das Farbfeld zwischen den Quarks als symmetrischer quantenmechanischer Flußschlauch oder *String* interpretiert, der für den Farbfluß sorgt. Je weiter die Quarks sich voneinander entfernen, desto größer wird die in dem String gespeicherte Energie. Beim Erreichen einer Schwelle bricht der String auf und es bildet sich ein neues Quark-Antiquark-Paar. Besitzen die Quarks keine Masse oder transversalen Impuls, kann dieses klassisch betrachtet in einem Punkt geschehen, bevor die Quarks auseinander gedrückt werden. Anderenfalls müssen die Quarks in einem gewissen Abstand erzeugt werden, so daß die Feldenergie zwischen ihnen in die Summe der transversalen Massen m_t „umgesetzt" werden kann. Im Lund-String-Modell kommt nun die Idee des quantenmechanischen Tunneleffekts zum tragen: Die Quarks werden in einem Punkt erzeugt und tunneln dann in den klassisch erlaubten Bereich. Die Wahrscheinlichkeit für das Tunneln wird wie folgt faktorisiert:

$$e^{-\left(\frac{\pi m_t^2}{\kappa}\right)} = e^{-\left(\frac{\pi m^2}{\kappa}\right)} e^{-\left(\frac{\pi p_t^2}{\kappa}\right)}. \tag{3.1}$$

κ entspricht hier der Energiedichte entlang des Strings. Dieses führt zu einem von den Quarksorten unabhängigen gaußverteilten Spektrum von p_x und p_y. Da ein String nicht transversal angeregt ist, entsteht ein Quark-Antiquark-Paar, deren Quarks im transversalen Impuls balanciert sind. Erst durch die Verbindung mit dem $q_{(i-1)}$-Quark erhält das entstehende Meson einen transversalen Impuls, der sich aus der Summe der p_t des $q_{(i-1)}$-Quarks und des $\bar{q}_i$-Quarks ergibt und in der Regel mit der Breite $\frac{\sigma_{p_t}}{p_t} = \sqrt{2}$ gaußverteilt ist. Die Faktorisierung enthält die Unterdrückung der Produktion schwerer Quarks in der Fragmentation mit den Verhältnissen:

$$u : d : s : c \approx 1 : 1 : 0.3 : 10^{-11}. \tag{3.2}$$

Beim Lund-String-Modell können sich auch Strings zwischen den erzeugten Quarks und den Partonen im Proton ausbilden.

Zur Bestimmung der Energie und des longitudinalen Impulses des entstandenen Mesons M bleibt nur noch eine unabhängige Variable. Man definiert wie folgt:

$$z = \frac{E_M + p_M^{||}}{E_q + p_q}. \tag{3.3}$$



Abbildung 3.2: *Fragmentationsfunktion der Lund-String-Fragmentation für Charm- und Beauty-Quarks.*

Diese Variable gibt den Anteil vom Quarkimpuls an, den der Mesonimpuls in Richtung des Quarks erhält. Eine *Fragmentationsfunktion* $f(z)$ beschreibt dann, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein z gewählt wird.

Verlangt man, daß der Fragmentationsprozeß unabhängig vom Anfangsquark (q_0 oder $\bar{q}_0$) gleich aussehen soll, führt dieses zur „symmetrischen Lund-Fragmentationsfunktion“:

$$f(z) \propto \frac{1}{z} z^{a_\alpha} \left(\frac{1-z}{z}\right)^{a_\beta} \exp\left(-\frac{b \cdot m_t^2}{z}\right). \tag{3.4}$$

Die Exponenten a_α, a_β und b sind experimentell zu bestimmende Faktoren. Die a-Parameter stehen für die fragmentierenden Quarksorten, der b-Parameter für die neu erzeugte Quarksorte.

In Abbildung 3.2 ist die Verteilung der Variablen z, wie sie vom AROMA-Monte-Carlo-Generator erzeugt wird, dargestellt. Sie zeigt einen weicheren Verlauf für Charm-Quarks als für Beauty-Quarks. Man findet keine sehr weiche Fragmentation, d.h. der Bereich $z < 0.3$ ist leer.

In Abbildung 3.3 sind die Verteilungen der Variablen z nochmals dargestellt und zusätzlich der Bereich, in dem Ereignisse mit mindestens einem Zerfallsmyon mit Impuls $p > 2.5\,\mathrm{GeV}$ im Polarwinkelbereich $35° < \Theta < 130°$ liegen. Die Forderung nach einem Myon mit diesen Kriterien zeigt, daß nur sehr hart fragmentierte Quarks selektiert werden. Dieses ist eine potentielle Quelle von Unsicherheiten im Vergleich der Messung mit der Vorhersage, denn im Bereich $z \to 1$ macht die Fragmentationfunktion große Änderungen, die sich stark in



Abbildung 3.3: *Fragmentationsfunktion der Lund-String-Fragmentation für Charm- und Beauty-Quarks (offen) und nach Forderung eines Zerfallsmyons mit den angegebenen Eigenschaften (schraffiert). Zu berücksichtigen ist die angegebene Skalierung des schattierten Bereiches.*

der Rate der produzierten Myonen bemerkbar machen kann. Außerdem kann man zeigen, daß die Messung eines totalen Wirkungsquerschnittes mit Myonen, deren differentieller Wirkungsquerschnitt einem p_t-Spektrum der $-n$-ten Potenz unterliegt ($\frac{d\sigma}{dp_t} \sim p_t^{-n}$), wie es bei HERA der Fall ist, sensitiv auf die z^{n+1}-te Potenz des differentiellen Quarkspektrums ist, wenn vereinfachend $p_{t\mu} = z \cdot p_{tq}$ angenommen wird. Man mißt also in einem noch härteren Quarkspektrum.

3.3.2 Unabhängige Fragmentation

Bei der unabhängigen Fragmentation wird davon ausgegangen, daß die Fragmentation eines Systems von Partonen für jedes Parton einzeln betrachtet werden kann. Es wird ein iterativer Prozeß angenommen, bei dem jedes Quark q_0 ein Hadron $q_0\bar{q}_1$ bildet und ein Quark $\bar{q}_1$ hinterläßt, welches ebenfalls ein Hadron produziert, usw. (siehe Abbildung 3.4).

Die Aufteilung von Impuls und Energie erfolgt hier durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung $f(z)$, die der Fragmentationsfunktion entspricht. z ist bereits in Gleichung 3.3 definiert. Die wichtigste Fragmentationsfunktion für schwere Quarks, die in diesem Modell eingesetzt wird und die Daten der e^+e^--Experimente sehr gut beschreibt, ist die *Peterson-Fragmentationsfunktion* [Pet83]:

$$f(z) \propto \frac{1}{z\left(1 - \frac{1}{z} - \frac{\varepsilon_Q}{1-z}\right)}. \tag{3.5}$$

Sie hängt im Gegensatz zur Lund-Fragmentationsfunktion nur von einem experimentell zu bestimmenden Parameter ε_Q für jede schwere Quarksorte Q ab und erzeugt ein härteres



Abbildung 3.4: *Schaubild der unabhängigen Fragmentation.*

Spektrum als die Lund-Fragmentationsfunktion.

In Abbildung 3.5 ist das Spektrum der Variablen z, welches vom AROMA-Monte-Carlo-Generator mit unabhängiger Fragmentation und Peterson-Fragmentationsfunktion erzeugt wurde, für zwei Beauty-Parameter ε_b und einen Charm-Parameter ε_c dargestellt. Man erkennt mit kleiner werdendem Parameter ein härteres Spektrum. Nahe bei eins fällt das Spektrum sehr schnell ab. Die Wahl der Parameter resultiert aus den Parametern, die in dieser Arbeit zur Untersuchung der systematischen Fehler durch Fragmentation verwendet wurden und richtet sich nach [Chr87]. Bei LEP werden folgende Werte vewendet [LEP96]:

$$0.025 < \varepsilon_c < 0.031 \tag{3.6}$$

$$0.0030 < \varepsilon_b < 0.0048 \tag{3.7}$$

Da in der ep-Streuung eine andere Skala vorliegt, sind die Werte nicht einfach übertragbar. Bei HERA wurden diese Werte noch nicht bestimmt.

Die Abbildung 3.6 zeigt wiederum die Verteilungen der Variablen z zusätzlich in dem Bereich, in dem Ereignisse mit mindestens einem Zerfallsmyon mit Impuls $p > 2.5\,\mathrm{GeV}$ im Polarwinkelbereich $35° < \Theta < 130°$ liegen. Das selektierte Spektrum ist noch härter als im Fall der Lund-Fragmentation, und die zu erwartenden Unsicherheiten werden aufgrund des noch steileren Abfalls der Fragmentationsfunktion bei $z \to 1$ noch größer sein.

3.4 Kinematik der generierten AROMA-Monte-Carlo-Ereignisse

Die Verteilungen der kinematischen Variablen $Q^2, x_g, W_{\gamma p}$ und $\hat{s}$ sind in Abbildung 3.7 für die mit dem AROMA-Monte-Carlo-Generator erzeugten Charm- und Beauty-Ereignisse dargestellt. Man findet nur leichte Unterschiede in der Q^2-Verteilung. In der Verteilung von $\hat{s}$ ist die Produktionsschwelle für Beauty-Quarks von $\hat{s}_{min} = 100\,\mathrm{GeV}^2$ klar zu erkennen. Beauty-Quarks werden im Mittel bei größeren x_g produziert und benötigen eine höhere Photon-Proton-Schwerpunktenergie.



Abbildung 3.5: *Fragmentationsfunktion der Peterson-Fragmentation für Charm- und Beauty-Quarks.*

In Abbildung 3.8 sind die Auswirkung der Selektions-Schnitte, wie sie in Kapitel 6 beschrieben sind, auf die kinematischen Verteilungen von $W_{\gamma p}$, $\hat{s}$ und x_g dargestellt. Durch den stark eingeschränkten Polarwinkelbereich, in dem die Myonen selektiert werden, werden keine Ereignisse mit kleiner Photon-Proton-Schwerpunktenergie selektiert. Die Verteilung der Quark-Antiquark-Schwerpunktenergie zeigt für Beauty-Quarks nahezu keine Änderung der Form der Verteilung, sondern nur eine Skalierung, während die Form der Verteilung bei Charm-Quarks stark zu hohen $\hat{s}$ verschoben wird. Außerdem werden durch die Selektion nur Ereignisse in einen Bereich von $10^{-3} < x_g < 10^{-1}$ selektiert. Die Messung des sichtbaren Wirkungsquerschnittes ist also auf einen Bereich eingschränkt, der nicht sehr sensitiv auf Parametrisierung der Proton-Strukturfunktion ist.

Die Verteilungen der erzeugten Myonen sind in Abbildung 3.9 dargestellt. Für die Verteilung des transversalen Impulses ist zusätzlich die Auswirkung des Schnittes auf die Myonen von $p > 2.5\,\mathrm{GeV}$ und $35° < \Theta < 130°$ aufgezeigt. Man erkennt, daß nur noch Myonen von sehr hart fragmentierenden Charm-Quarks selektiert werden. Das Spektrum der Myonen von Beauty-Quarks bleibt ab etwa $p_t > 2.5\,\mathrm{GeV}$ nahezu erhalten und wird nur skaliert.

Die Verteilung des Öffnungswinkels $\delta\omega$ zwischen Myonen (μ) und den schweren Quarks (Q_μ), die diese hervorgebracht haben, ist in Abbildung 3.10 (oben) als Punkte dargestellt. Man



Abbildung 3.6: *Fragmentationsfunktion der Peterson-Fragmentation für Charm- und Beauty-Quarks (offen) und nach Verlangen eines Zerfallsmyons (schraffiert). Zu berücksichtigen ist die angegebene Skalierung des schattierten Bereiches.*



Abbildung 3.7: *Kinematische Verteilungen der Ereignisse, die vom* AROMA-*Monte-Carlo-Generator erzeugt wurden. Jede Verteilung ist jeweils auf 1 normiert.*



Abbildung 3.8: *Kinematische Verteilungen der Ereignisse mit Myonen, die vom* AROMA-*Monte-Carlo-Generator erzeugt wurden. Links sind Ereignisse mit Charm-Quarks, rechts mit Beauty-Quarks. Zu beachten ist die angegebene Skalierung der Ereignisse nach den Schnitten.*



Abbildung 3.9: *Kinematische Verteilungen der Myonen, die vom* AROMA-*Monte-Carlo-Generator erzeugt wurden. Das Spektrum des Transversalimpulses enthält zusätzlich die Myonen nach Schnitten auf Impuls und Polarwinkel.*

findet einen mittleren Öffnungswinkel von etwa 10° bei Charm-Quarks und von etwa 30° bei Beauty-Quarks. Bei der getrennten Betrachtung der Abstände in Polar- und Azimutwinkel, $\delta\Theta$ bzw. $\delta\phi$ erkennt man, daß in keiner der beiden Richtungen die Quarkrichtung bevorzugt durch das Myon beschrieben wird.

Um eine weitere Bezugsachse, außer der Myonrichtung, zu erhalten, wird das Ereignis in zwei Hemisphären eingeteilt, die sich aus allen Energiedepositionen innerhalb eines Polarwinkelabstandes von $\Delta\phi < 90°$ bzw. $\Delta\phi > 90°$ zur Myonrichtung ergeben. Mit der erhaltenen Einteilung der Energiedepositionen wird für jede Hemisphäre eine Hemisphärenachse rekonstruiert (siehe Abschnitt 6.3.4). Die Hemisphärenachse, die sich aus den Energiedepositionen innerhalb der Myonhemisphäre ergeben, wird mit T_μ bezeichnet, die Hemiphärenachse der dem Myon gegenüberliegenden Hemisphäre wird T_{oppo} genannt. In Abbildung 3.10 sind ebenfalls die Verteilungen der Öffnungswinkel $\delta\omega$ und der Abstände in Polar- und Azimutalwinkel $\delta\Theta$ bzw. $\delta\phi$ zwischen den Hemisphärenachsen T_μ bzw. T_{oppo} und den der jeweiligen Hemisphäre zugehörigen Quarks Q_μ bzw. Q_{oppo} dargestellt.

Man findet für beide Quarksorten die beste Beschreibung der Quarkrichtung durch den Azimutalwinkel. Hier ist die Richtung der Charm-Quarks bis auf etwa 10° und die der Beauty-Quarks, ähnlich gut wie die Myonrichtung, bis auf etwa 20° wiedergegeben.

Die Ungenauigkeit der Quarkachsen-Rekonstruktion im Polarwinkel kommt daher, daß zur Definition der Hemisphärenachsen über alle Energiedepositionen im Polarwinkel gemittelt wird. Dieses erzeugt eine Verschiebung der Achsen in Protonrichtung.



Abbildung 3.10: *Verteilungen der Öffnungswinkel $\delta\omega$ und Abstände im Polarwinkel $\delta\Theta$ und Azimutalwinkel $\delta\phi$ zwischen den schweren Quarks Q_μ und den Myonen μ, in die die Quarks zerfallen sind (Punkte), bzw. zur rekonstruierten Hemisphärenachse T_μ (durchgezogen). Außerdem sind die entsprechenden Winkelverteilungen für die jeweils anderen schweren Quarks Q_{oppo} relativ zur Hemisphärenachse T_{oppo} der dem Myon gegenüberliegende Hemisphäre gezeigt (gestrichelt).*

Kapitel 4

Das Experiment

Dieses Kapitel beschreibt den Speicherring HERA und die in dieser Analyse verwendeten Komponenten des H1-Detektors.

4.1 Der Speicherring HERA

In der Speicherringanlage HERA (**H**adron-**E**lektron-**R**ing-**A**nlage, Abbildung 4.1) werden Protonen einer Energie von 820 GeV mit Positronen einer Energie von 27.5 GeV zur Kollision gebracht. Die Positron-Proton-Schwerpunktenergie (ep-Schwerpunktenergie)

$$s = (P + p_e)^2 \tag{4.1}$$

ist durch die Viererimpulse P und p_e des Protons bzw. Positrons bestimmt. Bei HERA erreicht man eine ep-Schwerpunktenergie von $\sqrt{s} \approx 300\,\text{GeV}$.



Abbildung 4.1: *Überblick über den Speicherring HERA: Links sind die Vorbeschleuniger dargestellt, rechts der Speicherring HERA mit den vier Experimentierhallen. Das H1-Experiment befindet sich in der Experimentierhalle Nord.*

Parameter	Design		1995		1996	
	e^+	p	e^+	p	e^+	p
Strahlenergie [GeV]	30	820	27.6	820	27.6	820
mittlerer Strahlstrom [mA]	58	163	18.4	54	20.6	60.3
max. Strahlstrom [mA]	58	163	36.1	73.3	43.3	77.9
spez. Luminosität [$cm^{-2}s^{-1}mA^{-2}$]	4×10^{29}		4.05×10^{29}		4.06×10^{29}	
max. Luminosität [$cm^{-2}s^{-1}$]	16×10^{30}		5.9×10^{30}		8.4×10^{30}	
integrierte Luminosität [nb^{-1}]	10^5		11055		14366	

Tabelle 4.1: *Parameter der Speicherringanlage HERA*

Vor der Injektion der Protonen in den HERA-Ring werden diese in den Vorbeschleunigern LINAC III (auf 50 MeV), DESY III (auf 7.5 GeV) und PETRA II auf 40 GeV beschleunigt. Die Positronen werden in LINAC II (auf 450 MeV), DESY II (auf 7.5 GeV) und PETRA II auf 12 GeV vorbeschleunigt und anschließend in HERA eingebracht. Anschließend werden die Strahlen in getrennten Ringen auf ihre endgültigen Energien beschleunigt. Pro Umlauf muß dabei ein mittlerer Energieverlust der Positronen von 127 MeV durch Synchrotonstrahlung ausgeglichen werden.

Positronen und Protonen werden in Paketen im Abstand von 96 ns gespeichert. Das entspricht einer möglichen Kollisionsfrequenz von 10.4 MHz. In Tabelle 4.1 sind die in den Jahren 1995 und 1996 gemessenen Parameter, sowie deren Designwerte zusammengefaßt.

Die Proton- und Positronpakete werden an zwei sich diametral gegenüberliegenden Wechselwirkungspunkten zur Kollision gebracht. Dort befinden sich die Kollisionsexperimente H1 und ZEUS. An den anderen beiden Wechselwirkungspunkten sind die Experimente HERMES und HERA-B mit jeweils einem festen *Target* aufgebaut bzw. im Aufbau. Ziel von HERMES ist die Untersuchung der Spinstruktur von Protonen und Neutronen. Dazu wird der longitudinal polarisierte Positronstrahl auf ein polarisiertes Gastarget geschossen. Bei HERA-B soll CP-Verletzung in B-Zerfällen gemessen werden. Die B-Mesonen werden durch ein an den Rand des Protonstrahls gefahrenes Kupfer- oder Aluminium-Drahttarget erzeugt.

4.2 Das H1-Experiment

Das H1-Experiment [H1-96] ist perspektivisch in Abbildung 4.2 dargestellt. Ein Schnitt durch den Detektor entlang der Strahlachse ist in Abbildung 4.3 aufgezeigt. Zusätzlich sind die wichtigsten Polarwinkelbereiche eingetragen. Die im Speicherring befindlichen Protonen laufen in diesen Darstellungen jeweils von rechts und die Positronen von links in den Detektor ein. Man erkennt, daß nahezu der gesamte Raumwinkel durch den Detektor abgedeckt wird. Aufgrund der hohen Impulse der Protonen und der daraus resultierenden asymetrischen Topologie der Ereignisse ist der Detektor in Protonrichtung aufwendiger instrumentiert.

Dieser Abschnitt beschreibt die in dieser Analyse benutzten Detektorkomponenten. Dabei handelt es sich um:

- das zentrale Spurkammersystem $\boxed{2}$[1] und das Vorwärtsspurkammersystem $\boxed{3}$, zur Rekonstruktion der Teilchenspuren und -impulse, sowie der Ereignisvertices,

[1]Zahlen in Kästchen beziehen sich auf Abbildung 4.2



Abbildung 4.2: *Der H1-Detektor. Die Zahlen in den Kästchen benennen die Detektorteile und sind Referenzen aus dem Text.*



Abbildung 4.3: **Polarwinkelbereiche des H1-Detektors:** *Eingezeichnet sind die Akzeptanzbereiche des zentralen Myonsystems, des Flüssig-Argon-Kalorimeters sowie der Akzeptanzbereich des zentralen Spurkammersystems. Rechts ist das H1-Koordinatensystem dargestellt.*

- das Flüssig-Argon (LAr) Kalorimeter zum Nachweis von Elektronen $\boxed{4}$, Myonen und Hadronen $\boxed{5}$,
- das zentrale Myonsystem $\boxed{9}$, $\boxed{10}$ zum Nachweis von Myonen,
- den Elektron-Tagger und das rückwärtige Spaghetti-Kalorimeter (*SpaCal*), zum Nachweis des gestreuten Positrons,
- das Luminositätssystem, zur Bestimmung der Luminosität.

Die zentralen Komponenten sind radialsymmetrisch um das Strahlrohr $\boxed{1}$ angeordnet. Zwischen dem LAr-Kalorimeter und dem zentralen Myonsystem befindet sich eine supraleitende Spule $\boxed{6}$, die ein Magnetfeld von 1.2 T erzeugt.

Das H1-Koordinatensystem

Das H1-Koordinatensystem (Abbildung 4.3 rechts) ist ein rechtshändiges kartesisches Koordinatensystem. Der Ursprung liegt am nominellen ep-Wechselwirkungspunkt. Die z-Achse wird in Richtung der auslaufenden Protonen gewählt. Die x-Achse zeigt horizontal in Richtung des HERA-Mittelpunktes. Häufig finden auch der Polarwinkel Θ in der rz-Ebene, mit $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ und der Azimutalwinkel ϕ in der xy-Ebene Anwendung. Der Polarwinkel liegt in dem Bereich von $0° \leq \Theta \leq 180°$ und der Azimutalwinkel ϕ von $-180° \leq \phi \leq 180°$. Die Vorwärtsrichtung ist durch $\Theta < 90°$ festgelegt.



Abbildung 4.4: *Das H1-Spurkammersystem in einem Schnitt in einer Ebene transversal zur Strahlachse. Seit dem Jahr 1995 ist das rückwärtige Kalorimeter BEMC durch das SpaCal und die hintere Proportionalkammer MWPC durch die hintere Driftkammer BDC ersetzt worden.*

4.2.1 Das Spurkammersystem

Das Spurkammersystem ($\boxed{2}$, $\boxed{3}$ und Abbildung 4.4) von H1 befindet sich in einem nahezu homogenen Magnetfeld von 1.2 T, das durch die supraleitende Spule erzeugt wird. Die registrierten Spurkammersignale dienen der Rekonstruktion der Vierervektoren geladener Teilchen, der Rekonstruktion des Ereignisvertex und einigen hartverdrahteten Selektionseinheiten (*Trigger*).

Man unterscheidet zwischen dem zentralen Spurkammersystem, dem Vorwärtsspurkammersystem und der hinteren Spurkammer.

Zentrales Spurkammersystem

Das zentrale Spurkammersystem ist in transversaler Richtung in Abbildung 4.5 dargestellt. Es gliedert sich in die Jetkammern, CJC1 und CJC2, die Driftkammern, CIZ und COZ, und die Proportionalkammern, CIP und COP, die konzentrisch um die Strahlachse aufgebaut sind.

Durch das zentrale Spurkammersystem wird ein Polarwinkelbereich von $20° \leq \Theta \leq 160°$ abgedeckt.

Die Jetkammern: Bei den Jetkammern handelt es sich um Driftkammern, deren 2640 Signaldrähte parallel zur Strahlachse und um 150 μm alternierend versetzt aufgespannt sind. Die CJC1 ist transversal in 30 Segmente mit je 24 Signaldrähten und die CJC2 in 60 Segmente mit je 32 Signaldrähten unterteilt. Man erreicht eine Auflösung der Ortsmessung in der $r\phi$-Ebene von $\sigma_{r\phi} \approx 170\,\mu$m. In der rz-Ebene wird eine Auflösung von $\sigma_{rz} \approx 22$ mm erreicht.



Abbildung 4.5: *Das zentrale Spurkammersystem in der $r\phi$-Projektion.*



Abbildung 4.6: *Die Driftkammer COZ.*

Die Signale der Jetkammern werden zur Ereignisselektion durch den $DCR\phi$-Trigger in sogenannten Spurmasken zusammengefaßt.

Die Driftkammern: Um die Auflösung in z-Richtung zu verbessern, sind die dünnen Driftkammern CIZ und COZ (Abb. 4.6) installiert. Sie bestehen aus polygonförmig, konzentrisch um die Strahlachse gespannten Signaldrähten. Die COZ ist in 24 Zellen, die CIZ in 15 Zellen unterteilt. Jede Zelle besteht aus vier Signaldrähten. Bei der COZ liegen die vier Drähte jeweils in einer Ebene senkrecht zur Strahlachse. In den Zellen der CIZ sind die Drahtebenen der in negativer z-Richtung liegenden Zellen um $-45°$ gegen die Proton-Strahlrichtung, die der anderen um $+45°$ geneigt. Dadurch bewirkt man eine eindeutige Zuordnung der gemessenen Spurrichtung, wogegen bei der COZ auch sogenannte Spiegelspuren gemessen werden.

Die Driftkammern ermöglichen eine Ortauflösung von $\sigma_{rz} \approx 350\,\mu$m.

Die Signaldrahtpulse werden vom RZ-Trigger der ersten Triggerstufe zu Spuren zusammengefügt und dienen so der Ereignisselektion.

Die Proportionalkammern: Die Vieldrahtproportionalkammern CIP und COP bestehen aus jeweils zwei Kammerlagen mit parallel zur Strahlachse laufenden Signaldrähten. Die CIP ist in 60 rz-Segmente (*Pads*) und 16 $r\phi$-Pads, und die COP in 18 rz-Pads und 16 $r\phi$-Pads unterteilt.

Die Signale der Pads dienen ausschließlich dem H1-Triggersystem zur Ereignisselektion.

Vorwärtsspurkammersystem

Das vordere Spurkammersystem besteht aus drei sogenannten Supermodulen. Jedes Supermodul besteht aus

- einem planaren Modul mit drei Driftkammern,
- einer Vieldrahtproportionalkammer,
- einem Übergangsstrahlungsmodul und
- einem radialen Modul mit einer Driftkammer.

Die drei **planaren Driftkammern** sind um 60° gegeneinander verdreht und bestehen jeweils aus 32 Zellen mit je 4 senkrecht zur Strahlachse gespannten Signaldrähten. Man erreicht damit eine Auflösung von $\sigma_{r\phi} \approx 170\,\mu$m. Die **radiale Driftkammer** ist in der $r\phi$-Ebene in 48 Sektoren unterteilt. Jeder Sektor enthält 12 jeweils gegeneinander versetzte Signaldrähte, wodurch eine gute Impulsauflösung erreicht wird. Die Ortsauflösung liegt bei $\sigma_{r\phi} \approx 200\,\mu$m. Lediglich diese Module dienen der Spurrekonstruktion. Die **Vieldrahtproportionalkammer** wird für Triggerzwecke der ersten Triggerstufe benutzt und das **Übergangsstrahlungsmodul** dient der Trennung hochenergetischer Pionen und Elektronen.

Die hintere Spurkammer

Die hintere Spurkammer BDC[2] ist eine Driftkammer, die dazu dient, Spursegmente von Teilchen, die im rückwärtigen Kalorimeter registriert werden, zu bestimmen.



Abbildung 4.7: *Module des LAr-Kalorimeters in der rz-Projektion.*

4.2.2 Das Flüssig-Argon-Kalorimeter

Das Flüssig-Argon-Kalorimeter (engl.: **L**iquid-**Ar**gon-Calorimeter) liegt vollständig innerhalb der supraleitenden Magnetfeldspule und deckt den Polarwinkelbereich $4° \leq \Theta \leq 153°$ ab. Da das Kalorimeter direkt an die Spurkammern anschließt, ist das inaktive Material vor dem Kalorimeter minimiert. Das LAr-Kalorimeter gliedert sich entlang der Strahlachse in ein hinteres, fünf zentrale und zwei vordere Module (Abbildung 4.7). Die Module unterteilen sich wiederum in insgesamt über 45000 Zellen.

Es handelt sich um ein nicht-kompensierendes *Sampling*-Kalorimeter, das heißt es werden für Absorption und Nachweis unterschiedliche Materialien verwendet. Bei einem nicht-kompensierenden Kalorimeter wird der überwiegende Teil eines elektromagnetischen Schauers als Ionisationsenergie gemessen, während bei einem hadronischen Schauer etwa 30% der Energie durch Anregung und Spaltung von Kernen nicht zum gemessenen Signal beitragen.

Physikalisch unterteilt sich das LAr-Kalorimeter in einen elektromagnetischen und einen hadronischen Teil.

- **Elektromagnetischer Teil**: Hier ist das Kalorimeter aus 2.4 mm dicken Absorberplatten aus Blei mit dazwischenliegenden 2.35 mm breiten Spalten, gefüllt mit flüssigem Argon, aufgebaut. Im vorderen Bereich ist der elektromagnetische Teil $30X_0$ Strahlungslängen und im zentralen Bereich $20X_0$ Strahlungslängen dick (Abbildung 4.8). Die Energieauflösung beträgt:

$$\frac{\sigma_E}{E} = 0.11/\sqrt{E} \bigoplus 0.01\,.$$

  Das hintere Modul (*BBE*) besteht nur aus einem elektromagnetischen Teil.

- **Hadronischer Teil**: Der hadronische Teil besteht aus 1.9 cm dicken Absorberplatten aus Stahl und 0.23 cm breiten Spalten, gefüllt mit flüssigem Argon. Hadronen durchlaufen im vorderen Bereich bis zu acht und im zentralen Bereich bis zu fünf hadronische

[2]BDC: **B**ackward **D**rift **C**hamber