Studien zur Jetproduktion in der Vorwärtsregion des H1–Detektors bei kleinem x_B in der tiefinelastischen Streuung

Vom Fachbereich Physik
der Universität Dortmund
zur
Erlangung des akademischen Grades eines
Doktors der Naturwissenschaften
genehmigte

D I S S E R T A T I O N

von

Diplom-Physiker Joachim Kurzhöfer
aus Iserlohn

Dortmund
Oktober 1995

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Kapitel 1

Einführung

Das Ziel der Elementarteilchenphysik ist die Erforschung der elementaren Bausteine der Materie und ihrer Wechselwirkungen. Zu dem derzeitigen Erkenntnisstand haben Streuexperimente einen wesentlichen Beitrag geleistet. Anfang dieses Jahrhunderts ermöglichte die Untersuchung der Streuung von α–Teilchen an einer Goldfolie durch E. Rutherford [RUTH11] einen Einblick in die innere Struktur des Atoms, Streuexperimente mit hochenergetischen Leptonen zeigten 1956 [HOFS56], daß das Proton ein ausgedehntes Objekt ist. Heute ist das Innere des Protons Gegenstand vieler Experimente.

Nach dem bisher als gültig angenommenen Standardmodell der Elementarteilchenphysik [GLAS61, WEIN67, SALA68, FRIT73] ist die uns bekannte Materie aus Fermionen aufgebaut. Die Wechselwirkungen zwischen den Fermionen werden durch Austausch von Eichbosonen vermittelt. Die Fermionen lassen sich in zwei Gruppen einteilen, die Leptonen, die neben der Gravitation nur elektroschwach wechselwirken und die Quarks, die auch stark miteinander wechselwirken können. Von jeder Gruppe sind zur Zeit drei Generationen bekannt, wobei die uns bekannte stabile Materie nur aus Teilchen der ersten Generation aufgebaut ist.

Während die Leptonen als freie Teilchen beobachtet werden können, treten die Quarks in der Natur nur in gebundenen Zuständen, den Hadronen, auf. Streuexperimente bei hohen Energien können die innere Struktur von Hadronen auflösen, das ausgetauschte Eichboson wechselwirkt dann direkt mit einem Quark oder Gluon, dem Eichboson der starken Wechselwirkung. Bei solchen Experimenten spricht man auch von Streuung an Partonen, da bei hohen Energien die Zeitdauer der Wechselwirkung klein gegenüber den typischen Wechselwirkungszeiten der Quarks und Gluonen innerhalb der Hadronen ist, so daß das Quark oder Gluon als ein quasifreies Teilchen,ein Parton, betrachtet werden kann.

In der tiefinelastischen Elektron–Proton–Streuung werden hochenergetische Elektronen entweder am ruhenden Proton gestreut oder mit hochenergetischen Protonen in Kollision gebracht. Bei der Speicherringanlage HERA am DESY in Hamburg kollidieren Elektronen oder Positronen mit einer Energie von etwa 27 GeV mit Protonen von rund 820 GeV.

Die Experimente am Speicherring HERA ermöglichen das Studium von Prozessen in kinematischen Bereichen, die vorher nicht zugänglich waren. Insbesondere der kinematische Bereich, in dem die Partonen nur einen sehr kleinen Impulsbruchteil des Protons tragen, war bisher Gegenstand vieler Spekulationen. Dabei ist die Entwicklung der Partondichten von großem Interesse, da Einflüsse von neuer Physik aufgrund der hohen Partondichten bei kleinem x_B erwartet werden [MUEL90]. Zu dieser neuen Physik gehören sowohl die Ursachen für den beobachteten steilen Anstieg der Strukturfunktion F_2 als auch mögliche Rekombinationseffekte bei Gluonen. In dieser Arbeit wird erstmalig eine neue Methode angewendet, mit der diese beiden Fragestellungen untersucht werden können.

Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der tiefinelastischen Elektron–Proton–Streuung und des Quark–Parton–Modells diskutiert. Nach der Beschreibung von zwei Entwicklungsgleichungen für die Partondichten wird die in dieser Arbeit verwendete exklusive Analysemethode erläutert. Sie basiert auf der Untersuchung einer speziellen Klasse von Ereignissen der tiefinelastischen Elektron–Proton–Streuung, die einen hochenergetischen Jet in der Nähe der Proton–Flugrichtung aufweisen. Die Vorteile dieser Methode liegen in dem direkten Zugriff auf die Dynamik der Entwicklung der Partondichten, ohne von unbekannten Partondichten abhängig zu sein [MART92]. Eine kurze Abhandlung über die verwendeten Monte–Carlo–Generatoren beschließt das Kapitel.

Das dritte Kapitel ist der Beschreibung des H1–Detektors gewidmet, wobei die für diese Arbeit relevanten Komponenten des Detektors genauer besprochen werden. Dies betrifft insbesondere das Flüssig–Argon–Kalorimeter, da die untersuchten Jets aus Signalen dieses Kalorimeters gebildet werden.

Im vierten Kapitel werden die einzelnen Schritte der Datennahme und der Selektion des untersuchten Datensatzes besprochen. Dabei werden auch mögliche Verluste des Signals durch die Selektionsschnitte diskutiert.

Das fünfte Kapitel behandelt Jets. Es beginnt mit der Erläuterung von zwei Jet–Algorithmen, die auf unterschiedlichen Ansätzen beruhen. Bei dem anschließenden Vergleich wird ihre Eignung für die Analyse von Jets nahe der Protonflugrichtung untersucht. Die Beschreibung der Selektion von Jets aus dem selektierten Datensatz beendet das Kapitel.

Im sechsten Kapitel werden die verschiedenen Untergrundbeiträge zu dem selektierten Datensatz diskutiert. Die Bestimmung der Beiträge erfolgt sowohl mit Hilfe simulierter Ereignisse als auch durch zusätzliche Signaturen in den Daten.

Das siebte Kapitel enthält die Diskussion der Resultate dieser Analyse. Nach einer kurzen Präsentation der Ergebnisse einer inklusiven Messung erfolgt ein Vergleich der Daten mit den Vorhersagen zweier Monte–Carlo–Modelle. Der differentielle Wirkungsquerschnitt für Jets nahe der Protonflugrichtung bei kleinem Bjørken–x_B wird bestimmt.

Abschließend werden die wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefaßt.

Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der tiefinelastischen Elektron–Proton–Streuung behandelt. Nach der Definition von kinematischen Größen folgt eine Diskussion des Wirkungsquerschnittes und seine Deutung im Quark–Parton–Modell. Die analytische Berechnung des in dieser Analyse untersuchten differentiellen Wirkungsquerschnittes für Jets wird anschließend besprochen. Den Abschluß bildet eine Beschreibung von Ereignis–Generatoren.

2.1 Kinematik in der tiefinelastischen Elektron–Proton–Streuung

Abbildung 2.1 zeigt den Feynmangraphen für tiefinelastische Elektron–Proton–Streuung mit dem neutralen Strom in niedrigster Ordnung der elektro–schwachen Störungstheorie. Ein Elektron mit dem Viererimpuls l und ein Proton mit dem Viererimpuls p laufen ein und tauschen ein virtuelles Photon oder Z^0–Boson mit dem Viererimpuls $q = l - l'$ aus. Das auslaufende Elektron besitzt danach den Viererimpuls l'. Das Proton wird in der Regel durch den Austausch angeregt und es wird ein hadronischer Endzustand beobachtet, der im allgemeinen aus vielen Teilchen besteht.

Üblicherweise werden für die Beschreibung der Ereigniskinematik die im folgenden definierten Größen verwendet.

- Der Betrag des Quadrats des Viererimpulsübertrags q ist gegeben als

$$Q^2 = -q^2 = -(l - l')^2.$$

- Die Bjørken–Skalenvariable x_B ist definiert als

$$x_B = \frac{Q^2}{2pq}.$$



Abb. 2.1: *Der Feynmangraph der tiefinelastischen Elektron–Proton–Streuung in niedrigster Ordnung mit einem neutralen Strom.*

Die Bjørken–Skalenvariable x_B besitzt den Wertebereich $0 \leq x_B \leq 1$. Im Rahmen des naiven Quark–Parton–Modells kann sie unter Vernachlässigung aller Teilchenmassen und der Transversalimpulse der Partonen im Proton als der Bruchteil des Protonimpulses interpretiert werden, den das Parton vor dem Streuprozeß trägt.

- Die Skalenvariable y ist definiert als

$$y = \frac{pq}{pl}.$$

Die Skalenvariable y liegt ebenfalls im Wertebereich $0 \leq y \leq 1$. Im Ruhesystem des Protons vereinfacht sich obige Definition zu

$$y = \frac{E_e^* - E_e^{*'}}{E_e^*},$$

wobei E_e^* und $E_e^{*'}$ die Energie des einlaufenden, beziehungsweise auslaufenden Elektrons sind, und y ist dann der übertragene Energiebruchteil.

- Das Quadrat der Schwerpunktsenergie s ist definiert als

$$s = (p + l)^2.$$

Die Schwerpunktsenergie $\sqrt{s}$ ist bei der Speicherringanlage HERA durch die Energien des einlaufenden Elektrons und des Protons vollständig festgelegt.

Diese vier lorentzinvarianten Größen sind nicht voneinander unabhängig, sondern durch

$$Q^2 = x_B y s$$

miteinander verknüpft. Wegen der Festlegung der Schwerpunktsenergie $\sqrt{s}$ durch die Strahlenergien genügen zwei der drei kinematischen Größen x_B, y und Q^2 zur vollständigen Beschreibung der Kinematik.

Eine weitere, häufig verwendete lorentzinvariante Variable ist die invariante Masse des gesamten hadronischen Endzustandes:

$$W^2 := (p + l - l')^2 = (p + q)^2 = \frac{1 - x_B}{x_B} Q^2 + m_p^2$$

Es ist vorteilhaft, wenn auch die zur Jetdefinition (siehe Kapitel 5) eingesetzten Variablen möglichst invariant gegenüber Lorentztransformationen entlang der Strahlachse, im folgenden mit z–Achse benannt, sind. Ein solcher Satz von Variablen besteht aus dem Transversalimpuls P_T, dem Azimutwinkel φ und der Rapidität ζ. Die Rapidität ζ wird definiert als

$$\zeta := \frac{1}{2} \ln \left(\frac{E + P_z}{E - P_z} \right) .$$

Sie ist zwar nicht lorentzinvariant, verschiebt sich aber bei Lorentztransformationen entlang der Strahlachse nur um einen konstanten Wert, die Differenz in der Rapidität zwischen zwei Teilchen ist somit invariant gegenüber diesen Lorentztransformationen. Da man in der Regel nicht die Massen aller beteiligten Teilchen kennt, wird anstatt der Rapidität die Pseudorapidität η verwendet, die wie folgt definiert ist:

$$\eta := \frac{1}{2} \ln \left(\frac{P + P_z}{P - P_z} \right) .$$

Die Formeln zeigen, daß sich die Rapidität und die Pseudorapidität für masselose Teilchen gleich sind und bei kleinen Massen oder kleinen Rapiditätsbeträgen fast entsprechen. Die Pseudorapidität kann aus dem Polarwinkel θ, der zwischen dem Teilchen und der Flugrichtung des einlaufenden Protons aufgespannt wird, berechnet werden:

$$\eta = -\ln \tan \left(\frac{\theta}{2} \right) .$$

2.2 Wirkungsquerschnitte für die tiefinelastische Elektron–Proton–Streuung

Der Wirkungsquerschnitt σ für die Streuung zweier Teilchen a und b aneinander ist gegeben durch [HALZ84]:

$$d\sigma = \frac{1}{4F} \frac{1}{(2\pi)^{3N_e+4}} |\mathcal{M}|^2 \delta^{(4)}(l_a + p_b - \sum_{i=1}^{N_e} p_i) \prod_{i=1}^{N_e} \left(\frac{d^3 p_i}{2E_i} \right) \tag{2.1}$$

mit

F	=	Fluß der einlaufenden Teilchen,
$\mathcal{M}$	=	Übergangsmatrixelement,
l_a	=	Viererimpuls des einlaufenden Teilchens a,
p_b	=	Viererimpuls des einlaufenden Teilchens b,
p_i	=	Viererimpuls des auslaufenden Teilchens i im Endzustand,
E_i	=	Energie des auslaufenden Teilchens i im Endzustand und
N_e	=	Anzahl der Teilchen im Endzustand.

Der Term F normiert auf die Teilchenflüsse, die Deltafunktion sorgt für die Viererimpulserhaltung bei dem Streuprozeß und der nachfolgende Term multipliziert mit dem Phasenraum der auslaufenden Teilchen. Die eigentliche Physik der Wechselwirkung zwischen den beiden Teilchen ist in dem Übergangsmatrixelement $\mathcal{M}$ enthalten.

Das Übergangsmatrixelement $\mathcal{M}$ läßt sich im Rahmen der Störungstheorie für die tiefinelastische Streuung mit Hilfe der sogenannten Feynmanregeln berechnen. Dabei wird im folgenden davon ausgegangen, daß die Beiträge durch Austausch eines Eichbosons der schwachen Wechselwirkung gegenüber dem Beitrag durch Austausch eines Photons vernachlässigbar sind. Aufgrund der, im Vergleich zu dem in dieser Arbeit untersuchten Q^2–Bereich, großen Masse der Eichbosonen der schwachen Wechselwirkung stellt diese Annahme eine gute Näherung dar.

Für den Prozeß der tiefinelastischen Elektron–Proton–Steuung gilt dann:

$$\mathcal{M} = -ej_e^\mu \frac{g_{\mu\nu}}{q^2} J^\nu_{hadron} \,, \tag{2.2}$$

wobei

e	=	Elementarladung,
j_e^μ	=	Viererstrom des Elektrons,
$\frac{g_{\mu\nu}}{q^2}$	=	Propagator des ausgetauschten Photons und
J^ν_{hadron}	=	hadronischer Viererstrom

ist. In Gleichung 2.1 geht das Betragsquadrat der Übergangsmatrix $\mathcal{M}$ ein, das sich als

$$|\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{q^4} L^e_{\mu\nu} W^{\mu\nu}_{hadron} 4\pi m_p \tag{2.3}$$

mit

$L^e_{\mu\nu}$	=	leptonischer Tensor,
$W^{\mu\nu}_{hadron}$	=	hadronischer Tensor und
m_p	=	Masse des Protons

darstellen läßt.

Der leptonische Tensor für unpolarisierte Elektronen hat die Form

$$\begin{aligned} L^e_{\mu\nu} &= \frac{1}{2}\sum_{Spins}[\bar{u}(l')\gamma_\mu u(l)][\bar{u}(l')\gamma_\nu u(l)]^* \\ &= 2(l'_{a,\mu}l_{a,\nu} + l_{a,\mu}l'_{a,\nu} - (l_a l'_a - m_e^2)g_{\mu\nu}). \end{aligned}$$

Hierbei bezeichnet $l'_{a,\mu}$, beziehungsweise $l'_{a,\nu}$, den Viererimpuls des auslaufenden Elektrons mit der Masse m_e, die im relativistischen Limit vernachlässigt werden kann. Der hadronische Tensor hat aufgrund der inneren Struktur des Protons eine komplexere Form. Zur Parametrisierung wird der hadronische Tensor in einer allgemeinen Form aus dem metrischen Tensor $g^{\mu\nu}$ und den unabhängigen Viererimpulsen q des Photons und p des einlaufenden Protons konstruiert. Unter Ausschluß aller antisymmetrischen Terme, deren Beiträge zu dem Wirkungsquerschnitt nach dem Einsetzen in Gleichung 2.3 verschwinden, da $L^e_{\mu\nu}$ symmetrisch ist, erhält man folgenden Ansatz:

$$W^{\mu\nu}_{hadron} = -W_1 g^{\mu\nu} + \frac{W_2}{m_p^2}p^\mu p^\nu + \frac{W_4}{m_p^2}q^\mu q^\nu + \frac{W_5}{m_p^2}(p^\mu q^\nu + q^\mu p^\nu) \tag{2.4}$$

Der Term mit W_3 wurde weggelassen, weil er für paritätsverletzende Strukturfunktionen steht, die den Austausch eines Eichbosons der schwachen Wechselwirkung voraussetzen. Aus der Forderung nach Stromerhaltung am hadronischen Vertex

$$q_\mu W^{\mu\nu}_{hadron} = q_\nu W^{\mu\nu}_{hadron} = 0$$

folgt

$$W_5 = -\frac{p\cdot q}{q^2}W_2,$$

$$W_4 = \left(\frac{p\cdot q}{q^2}\right)^2 W_2 + \frac{m_p^2}{q^2}W_1.$$

Somit sind nur zwei der vier tiefinelastischen Strukturfunktionen der Gleichung 2.4 voneinander unabhängig und 2.4 läßt sich schreiben als

$$W^{\mu\nu}_{hadron} = W_1\left(-g^{\mu\nu} + \frac{m_p^2}{q^2}\right) + W_2\left(p^\mu - \frac{p\cdot q}{q^2}q^\mu\right)\left(p^\nu - \frac{p\cdot q}{q^2}q^\nu\right)$$

Die W_i sind Funktionen von lorentzinvarianten Skalarvariablen, die am hadronischen Vertex rekonstruiert werden können, zum Beispiel x_B und Q^2. Mit der Definition von

$$F_1(x_B, Q^2) = m_p W_1(x_B, Q^2) \text{ und} \tag{2.5}$$

$$F_2(x_B, Q^2) = \frac{p\cdot q}{m_p}W_2(x_B, Q^2) \tag{2.6}$$

ergibt sich nach Einsetzen in Gleichung 2.1 und α als elektromagnetische Feinstrukturkonstante

$$\frac{d^2\sigma}{dx_B\,dQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{x_B Q^4}\left(y^2 x_B F_1(x_B,Q^2) + (1-y)F_2(x_B,Q^2)\right). \tag{2.7}$$

$F_1(x_B,Q^2)$ und $F_2(x_B,Q^2)$ werden als Strukturfunktionen des Protons bezeichnet. Bisher können die Strukturfunktionen in der bei HERA erreichbaren kinematischen Region nur experimentell bestimmt werden, eindeutige theoretische Vorhersagen sind nicht möglich.

Bei der tiefinelastischen Streuung ist das Photon virtuell und kann im Gegensatz zu einem reellen Photon auch longitudinal polarisiert sein. Der Zusammenhang zwischen den Strukturfunktionen F_1 und F_2 und dem Verhältnis R der Wirkungsquerschnitte für den Austausch eines longitudinal polarisierten Photons zum Wirkungsquerschnitt für den Austausch eines transversal polarisierten Photons ergibt sich zu [COOP91]:

$$R = \frac{F_2(x_B,Q^2) - 2x_B F_1(x_B,Q^2)}{2x_B F_1(x_B,Q^2)} = \frac{F_L(x_B,Q^2)}{2x_B F_1(x_B,Q^2)} = \frac{\sigma_L}{\sigma_T}. \tag{2.8}$$

$F_L(x_B,Q^2)$ wird als longitudinale Strukturfunktion bezeichnet, σ_L ist der Wirkungsquerschnitt für longitudinal polarisierte Photonen und σ_T für transversal polarisierte Photonen. Mit Hilfe dieser Gleichung läßt sich Gleichung 2.7 in der Form

$$\frac{d^2\sigma}{dx_B\,dQ^2} = \frac{2\pi\alpha^2}{x_B Q^4}\left(2(1-y) + \frac{y^2}{1+R}\right)F_2(x_B,Q^2) \tag{2.9}$$

schreiben. In dieser Gleichung kommt neben dem unbekanntem R, nur noch eine Strukturfunktion vor. Die Größe R ist bis jetzt bei HERA noch nicht gemessen worden. Rechnungen unter Verwendung der QCD Relation [ALTA78] und der MSRH–Parametrisierung [MART93b] haben für den in dieser Arbeit untersuchten kinematischen Bereich Werte von $0,2$ bis $0,3$ ergeben. Eine ausführliche Tabelle mit den berechneten Werten von R befindet sich in [H1-95a].

Die Gleichung 2.9 eignet sich somit zur experimentellen Bestimmung von $F_2(x_B,Q^2)$ aus dem gemessenen differentiellen Wirkungsquerschnitt [H1-93c, H1-95a].

2.2.1 Naives Quark–Parton–Modell

Um das komplexe Spektrum der Hadronen zu beschreiben, führte Gell–Mann die Quarks ein [GELL64]. Danach sind die Hadronen aus Quarks zusammengesetzt. Die Struktur des Protons, die bei der tiefinelastischen Elektron–Proton–Streuung sichtbar wird, ergibt sich durch die Auflösung der Quarkstruktur des Protons durch das ausgetauschte Photon mit einer sehr kleinen Wellenlänge. Das Modell zur Beschreibung der tiefinelastischen

Elektron–Proton–Streuung, das sogenannte naive Quark–Parton–Modell [BJOR69], sieht die Streuung als elastische Streuung der Elektronen an sogenannten Partonen, die sich frei im Proton bewegen. Die Lebensdauer eines Parton–Zustandes beträgt für die tiefinelastische Streuung im Breit–System $\tau_{Parton} \sim q_z/m_\perp^2$, während die Zeitdauer der Wechselwirkung $\tau_{Wechselw.} \sim 1/q_z$ ist. Im Breit–System ist q_z gleich $\sqrt{Q^2}$, und $m_\perp^2 = m_{Parton}^2 + k_t^2$, wobei das Parton den Viererimpuls $k = xp + k_t$ besitzt. In der QCD ist $k_t^2 \ll q_z^2$ und daher ist $\tau_{Parton} \gg \tau_{Wechselw.}$ [GRIB83]. Deswegen kann für den Zeitraum der Streuung die Wechselwirkung des Quarks mit anderen Quarks des Protons vernachlässigt werden und das Quark als freies Teilchen, Parton, behandelt werden.

Der gesamte Wirkungsquerschnitt der tiefinelastischen Elektron–Proton Streuung ergibt sich dann durch die inkohärente Summe aller Beiträge der Streuung von Elektronen an den einzelnen Quarks im Proton:

$$\frac{d^2\sigma}{d\tilde{x}dQ^2} = \sum_q \int_0^1 f_q(\kappa)\frac{d^2\hat{\sigma}_{eq}}{d\tilde{x}dQ^2}d\kappa \tag{2.10}$$

$$= \sum_q \int_0^1 f_q(\kappa)\frac{2\pi\alpha^2 e_q^2}{Q^4}\left[1+(1-y)^2\right]\delta(\tilde{x}-\kappa)d\kappa \tag{2.11}$$

wobei

$\sum_q$	=	Summe über alle Quarks im Proton,
$f_q(\kappa)$	=	Wahrscheinlichkeit ein Quark q mit dem Anteil κ am Impuls des Protons im Proton zu finden und
$\frac{d^2\hat{\sigma}_{eq}}{d\tilde{x}dQ^2}$	=	Wirkungsquerschnitt für die Streuung eines Elektrons an einem Quark ist.

Im Quark–Parton–Modell mit als masselos betrachteten Partonen ist $\tilde{x}$ mit der Bjorkenvariablen x_B identisch. Die Strukturfunktionen F_1 und F_2 ergeben sich damit zu

$$F_2(x_B,Q^2) = x_B \sum_{l=1}^{N_{parton}} e_l^2 f_l(x_B) = F_2(x_B), \tag{2.12}$$

$$F_1(x_B,Q^2) = F_1(x_B) = \frac{1}{2x_B}F_2(x_B). \tag{2.13}$$

Wie aus den Gleichungen 2.12 und 2.13 ersichtlich hängen die Partondichten und somit auch die Strukturfunktionen F_1 und F_2 nur von x_B, aber nicht von Q^2 ab. Die Gleichung 2.13 wird als Callan–Gross–Relation [CALL69] bezeichnet, aus ihr folgt, daß im naiven Quark–Parton–Modell F_L beziehungsweise R verschwinden.

2.2.2 QCD–Korrekturen und Skalenverletzung

Experimentelle Untersuchungen zeigten, daß die Strukturfunktionen entgegen den Vorhersagen des naiven Quarkmodell eine Abhängigkeit von Q^2 aufweisen [BLOO69, H1-94a]. Dies wird als Skalenverletzung bezeichnet, deren Ursache sich im Rahmen der Theorie der starken Wechselwirkung, der Quantenchromodynamik (QCD), aus der inneren Struktur des Protons ergibt. Das Proton besteht danach neben den drei als Valenzquarks bezeichneten Quarks auch aus Gluonen, die von Quarks oder Gluonen abgestrahlt werden und ihrerseits Gluonen und Quark–Antiquarkpaare, die sogenannten Seequarks, erzeugen können.

Gluonen sind die Eichbosonen der starken Wechselwirkung. Das Besondere an ihnen ist, daß sie selber Farbladung tragen und somit auch untereinander wechselwirken. Dies führt zu dem sogenannten Confinement. So sind zwei Quarks durch ein Farbfeld verbunden, dessen Energie bei größeren Abständen proportional zum Abstand der Quarks ist [FEYN72]. Wird ein Quark von dem anderen getrennt, z. B. durch einen Streuprozeß, bekommt das Farbfeld eine solche Stärke, daß Quark–Antiquark–Paare gebildet werden und so das Farbfeld aufspalten wird. Deswegen ist es experimentell nicht möglich, im Detektor ein freies Quark oder Gluon nachzuweisen. Stattdessen sieht man im Detektor ein zusammengehöriges Bündel von Teilchen, das als Jet bezeichnet wird. Bei kurzen Distanzen ist die Kopplungskonstante α_s der QCD so klein, daß zur Berechnung von starken Wechselwirkungen Störungsrechnungen verwendet werden können. Eine Beschreibung der starken Wechselwirkung über größere Distanzen, wie sie bei der Fragmentation von Partonen in Hadronen auftreten, ist zur Zeit durch die Störungstheorie nicht möglich.

Zur Bestimmung der Strukturfunktionen muß neben der niedrigsten mindestens auch die nächste Ordnung der QCD–Störungsreihe mitberücksichtigt werden. In Ordnung α_s tragen reelle Beiträge durch QCD–Compton Prozesse (Abbildung 2.2) und Boson–Gluon–Fusionsprozesse (Abbildung 2.3) bei. Weiterhin erfährt das naive Quark–Parton–Modell virtuelle Korrekturen aufgrund der Interferenz von Schleifengraphen, bei denen ein Gluon abgestrahlt und wieder absorbiert wird.

Bei der Integration dieser Beiträge für das Betragsquadrat des Matrixelements treten Singularitäten auf. Die ultravioletten Divergenzen werden in der starken Kopplungskonstanten α_s absorbiert, die dadurch von Q^2 abhängig wird und gegeben ist durch (z.B. [REY81]):

$$\alpha_s(Q^2) = \frac{12\pi}{(33 - 2N_f)\log(Q^2/\Lambda)} \,. \tag{2.14}$$

N_f ist die Anzahl der Quarkflavors im Proton und Λ ein freier Parameter. Die infraroten Divergenzen und die kollinearen oder Massendivergenzen im Endzustand werden



Abb. 2.2: *Feynmangraphen der QCD–Compton–Prozesse*



Abb. 2.3: *Feynmangraphen der Boson–Gluon–Fusion*

durch die Divergenzen der virtuellen Beiträge kompensiert. Es verbleiben die kollinearen Divergenzen zum einlaufenden Quark, die in den Partonverteilungen absorbiert werden [MART93a]. Einen Ansatz für die dynamische Entwicklung der Partonverteilungen stellen die Dokshitzer–Gribov–Lipatov–Altarelli–Parisi (DGLAP) Gleichungen [ALTA77] dar:

$$\frac{\partial f_l(x_B, Q^2)}{\partial \log Q^2} = \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi} \int_{x_B}^1 \frac{dy}{y} \left[f_l(y, Q^2) P_{qq}\left(\frac{x_B}{y}\right) + g(y, Q^2) P_{qg}\left(\frac{x_B}{y}\right) \right] \quad (2.15)$$

$$\frac{\partial g(x_B, Q^2)}{\partial \log Q^2} = \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi} \int_{x_B}^1 \frac{dy}{y} \left[g(y, Q^2) P_{gg}\left(\frac{x_B}{y}\right) + \sum_{l=1}^{N_f} \left(f_l(y, Q^2) P_{gq}\left(\frac{x_B}{y}\right) \right) \right] \quad (2.16)$$

Hierbei ist

$f_l(x_B, Q^2)dx_B$	$=$	Wahrscheinlichkeit, ein Quark der Flavour l mit einem Impulsanteil aus dem Intervall $[x_B, x_B + dx_B]$ des Protons zu finden,
$g(x_B, Q^2)dx_B$	$=$	Wahrscheinlichkeit, ein Gluon mit einem Impulsanteil aus dem Intervall $[x_B, x_B + dx_B]$ des Protons zu finden,
$P_{ij}(z)$	$=$	die sogenannte Splittingfunktion, die die Wahrscheinlichkeit für die Erzeugung des Partons i durch Parton j angibt, wobei das Parton i den Impulsbruchteil z des Partons j trägt [ALTA77, DOKS77].

Diese Gleichungen bestimmen die Entwicklung der Partondichten in Q^2. Zur Berechnung der Partondichten für ein vorgegebenes (x_B, Q^2) wird eine Anfangsverteilung $f_l(x_B, Q_0^2)$, beziehungsweise $g(x_B, Q_0^2)$ vorgegeben und in Q^2 entwickelt. Für die Anfangsverteilung existieren ebenso keine eindeutigen theoretischen Vorhersagen wie für die Partondichten bei kleinen Werten von x_B. Man erwartet, daß die DGLAP–Gleichungen die Entwicklung der Partondichten für $x_B > 10^{-2}$ und $Q^2 > 4\ GeV^2$ beschreibt. Ein Beispiel für die Beschreibung von Partondichten mit der DGLAP–Gleichung findet man unter anderem in [GLÜC93].

Bei der Ableitung der Entwicklung der Partondichten werden nur Terme proportional zu $\log Q^2$ berücksichtigt, wobei angenommen wird, daß Terme mit$\log 1/x_B$ klein genug sind, um vernachlässigt zu werden. Nähere Details findet man in [MART93a].

In den neuen kinematischen Regionen, die mit HERA erschlossen werden, ist noch offen, ob auch die Physik in diesen Regionen noch vollständig durch die DGLAP–Gleichungen beschrieben werden kann.

Ein anderer Ansatz liegt der Balitzskii–Fadin–Kuraev–Liptatov (BFKL) Gleichung zugrunde [FADI75]. Bei der BFKL–Gleichung werden die Terme mit $\log(1/x_B)$ aufsummiert, anstatt wie bei DGLAP mit $\log(Q^2)$. Daher wird erwartet, daß die BFKL–Gleichung in dem Bereich von kleinem x_B anwendbar ist [H1-95f]. Die Entwicklungsgleichung für die Partondichten hat die Form:

$$-x_B \frac{\partial f_l'(x_B, k^2)}{\partial \log(1/x_B)} = \int_{k_0^2}^{\infty} dk'^2 K(k, k') f_l'(x_B, k'^2), \tag{2.17}$$

wobei $K(k, k')$ eine Art von Splittingfunktion darstellt und k_0 ein infraroter Abschneidewert ist, um Regionen mit großem α_s auszuschließen. Für die Lösungen gilt:

$$f_l'(x_B, k^2) \propto x_B^{\lambda} \tag{2.18}$$

Für die Berechnung der Partondichten muß auch wie bei der DGLAP–Gleichung eine Anfangsverteilung vorgegeben werden. Der Parameter λ hängt nur schwach von dem gewählten k_0^2 für die Anfangsverteilung der Partondichten ab. Numerische Rechnungen mit laufender Kopplungskonstante α_s haben für λ etwa $0,4 - 0,5$ ergeben [MART93a].

Beiden Entwicklungsgleichungen ist gemeinsam, daß die Partondichten zu kleinem x_B hin ansteigen, was bei HERA für den Bereich $10^{-4} \leq x_B \leq 10^{-2}$ beobachtet wird. Dieser Anstieg muß irgendwann abbrechen, da das Proton nur endlich viel Platz für Partonen bietet. Mit zunehmenden Partondichten nimmt die Wahrscheinlichkeit für Wechselwirkungen der Partonen untereinander zu und damit auch Rekombinationen von Gluonen. In den Entwicklungsgleichungen sind solche Wechselwirkungen nicht berücksichtigt. Sie müssen durch zusätzliche, nichtlineare Terme ergänzt werden [GRIB83]. Ein phänomenologischer Ansatz der DGLAP Gleichung für die Gluondichte mit zweiter Näherung für die Rekombination hat dann beispielsweise die Form [BART91]:

$$\begin{aligned} \frac{\partial g(x_B,Q^2)}{\partial \log Q^2} &= \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi}\int_{x_B}^{1}\frac{dy}{y}\left[g(y,Q^2)P_{gg}\left(\frac{x_B}{y}\right)+\sum_{l=1}^{N_f}\left(f_l(y,Q^2)P_{gq}\left(\frac{x_B}{y}\right)\right)\right] \\ &\quad -\frac{81}{16}\frac{1}{r^2}\frac{\alpha_s(Q^2)}{Q^2}\int_{x_B}^{1}\frac{dy}{y}\left[yg(y,Q^2)\right]^2 . \end{aligned} \tag{2.19}$$

Der Parameter r beschreibt die Größe des räumlichen Bereichs, in dem die Rekombinationsprozesse stattfinden. Die Partondichte für Gluonen könnte einerseits gleichmäßig im ganzen Proton ansteigen, dann wäre r durch die Größe des Protons gegeben, oder aber ungleichmäßig, wobei die Partondichten in der Nähe der Valenzquarks stark ansteigen. Diese Zonen werden als Hotspots bezeichnet [MUEL90]. In diesem Fall wäre r sehr viel kleiner und die Rekombinationseffekte würden schon bei größeren Werten von x_B beobachtbar sein. Diese Gleichung ist nur solange gültig, wie der Korrekturterm klein gegenüber dem normalen Entwicklungsterm ist. Sind beide Terme von vergleichbarer Größe, treten noch weitere wichtige Korrekturen auf, deren Form bis heute nicht bekannt ist [DOKS91]. Die BFKL–Gleichung kann auf ähnliche Weise ergänzt werden.

2.3 Der differentielle Jet–Wirkungsquerschnitt

Die Dynamik der Partondichten kann inklusiv über die Strukturfunktionen untersucht werden, allerdings ist es problematisch, zwischen der DGLAP–Entwicklung und der BFKL–Entwicklung zu unterscheiden. Die theoretischen Vorhersagen sind phänomenologisch und hängen zudem stark von den verwendeten Anfangsverteilungen ab. Zum heutigen Zeitpunkt können die gemessenen Strukturfunktionen bei kleinem x_B [H1-95a,



Abb. 2.4: *Der Prozeß der tiefinelastischen Streuung mit Partonkaskade.*

Zeus95] sowohl durch die DGLAP-Entwicklung (siehe etwa [GLÜC93]) als auch durch die BFKL–Entwicklung beschrieben werden. Der beobachtete steile Anstieg der Strukturfunktionen kann sowohl von der BFKL–Entwicklung an sich als auch von der Anfangsverteilung für die DGLAP–Entwicklung herrühren.

Im folgenden werden daher Methoden beschrieben, die direkt auf die Unterschiede zwischen der DGLAP– und der BFKL–Entwicklung abzielen.

Sie untersuchen nicht den eigentlichen Streuprozeß, sondern die Vorgänge im Proton, die zu der Erzeugung der am Streuprozeß beteiligten Partonen geführt haben. In Abbildung 2.4 sind diese beispielhaft dargestellt. Ein Quark des einlaufenden Protons strahlt ein Gluon ab, das wiederum Quarks und Gluonen abstrahlt. So baut sich eine Partonkaskade auf, an deren Ende der eigentliche Streuprozeß der tiefinelastischen Streuung stattfindet.

Die Auswirkungen der gewählten Entwicklungsgleichung zeigt sich in der inneren Struktur der Kaskade. In der Tabelle 2.1 sind die wesentlichen Unterschiede zwischen den Partonkaskaden entwickelt mit der DGLAP–Gleichung und der BFKL–Gleichung zusammengefaßt. Diese Angaben beruhen auf den Berechnungen in der führenden Ordnung der Logarithmen $\alpha_s \ln(Q^2)$ für die DGLAP–Gleichung und $\alpha_s \ln(1/x_B)$ für die BFKL–

Eigenschaft der Partonkaskade	DGLAP–Gleichung	BFKL–Gleichung
Ordnung im Transversalimpuls	$k_{T,1} \ll k_{T,2} \ll \ldots \ll k_{T,n}$	keine besondere Ordnung
Ordnung in x	$x_1 > x_2 > \ldots > x_n$	$x_1 \gg x_2 \gg \ldots \gg x_n$

Tab. 2.1: *Eigenschaften der Partonkaskade*

Gleichung [MUEL94].

Der größte Unterschied zwischen beiden Entwicklungen betrifft die Ordnung im Transversalimpuls der Partonen untereinander. Während sie bei der Entwicklung mit der DGLAP–Gleichung streng geordnet sind, besteht diese Ordnung bei der Entwicklung mit der BFKL–Gleichung nicht. Dort läuft die Entwicklung des Transversalimpulses eher zufällig ab, das in der Kaskade nachfolgende Parton kann sowohl einen höheren als auch einen niedrigeren Transversalimpuls besitzen [BART94].

Aufgrund dieses Unterschiedes ist das mittlere $< k_T >$ der Partonen in der Kaskade bei der BFKL–Entwicklung größer als bei der DGLAP–Entwicklung, was einen erhöhten transversalen Energiefluß im Bereich der Kaskade zur Folge hat. Als Konsequenz wird daher erwartet, daß die BFKL–Entwicklung mehr transversale Energie E_T als die DGLAP–Entwicklung zwischen dem gestreuten Quark und dem Protonrest erzeugt [H1-95f]. Eine inklusive Untersuchungsmethode studiert daher den transversalen Energiefluß bis zu einem minimalen Winkel von etwa 5° zum Proton und vergleicht ihn mit theoretischen Vorhersagen von analytischen Rechnungen [KWIE94a, KWIE94b] und entsprechend simulierten Ereignissen [H1-94b]. In Abschnitt 7.2 wird kurz auf diese Untersuchung eingegangen.

Nach einem Vorschlag von Mueller [MUEL90, MUEL91] konzentriert sich die in dieser Analyse verwendete, exklusive Methode auf den Anfang und das Ende der Partonkaskade. Bei den untersuchten Ereignissen ist das Ende der Kaskade durch den Streuprozeß bestimmt. Das Parton am Anfang der Kaskade erzeugt einen zusätzlichen hochenergetischen Jet[1], im folgenden als Vorwärtsjet bezeichnet, der separat nachgewiesen wird. Um die Unterschiede zwischen den Vorhersagen der beiden Entwicklungen zu vergrößern, wird mit der Forderung $k_{T,1}^2 \approx Q^2$ die Kaskadenentwicklung bei der DGLAP–Gleichung im Gegensatz zur BFKL–Entwicklung aufgrund der starken Ordnung im Transversalimpuls der Partonen unterdrückt [MART92]. Die zusätzliche Forderung nach einem möglichst hohen $x_j = E_j/E_{Proton}$, dem Impulsanteil des Vorwärtsjets an dem Proton, stellt einerseits sicher, daß der Jet von einem Parton am Anfang der Kaskade stammt, und andererseits gehen in die Berechnung des Wirkungsquerschnittes die Partondichten

[1]Zur genaueren Definition von Jets siehe Kapitel 5.

nur an der Stelle x_j ein. Bei den hier untersuchten Werten von x_j größer als $0,025$ sind die Partondichten experimentell genau gemessen. Dadurch ist diese Methode nahezu unabhängig von den verwendeten Strukturfunktionen [MART92]. Außerdem vergrößert ein möglichst großes Verhältnis von x_j/x_B den Phasenraum für die Jet–Produktion bei der BFKL–Entwicklung, die von diesem Verhältnis abhängt [BART92, TANG92].

Abbildung 2.5 zeigt das relevante Diagramm für die Berechnung des Wirkungsquerschnittes für die tiefinelastische Streuung mit der Produktion eines Vorwärtsjets [MART92].



Abb. 2.5: *Das Diagramm für die Berechnung des Wirkungsquerschnittes für die tiefinelastische Streuung mit der Produktion eines Vorwärtsjets. Aus [MART92].*

Der Wirkungsquerschnitt für diese Ereignisse ist gegeben durch [MART92]:

$$\frac{\partial \sigma}{\partial x_B \partial Q^2} = \int_{x_{j0}}^{\infty} dx_j \int_{k_0^2}^{\infty} dk_T^2 \frac{4\pi\alpha_s^2}{x_B Q^4} \left[(1-y) \frac{\partial F_2}{\partial x_j \partial k_t^2} + \frac{1}{2} y^2 \frac{\partial 2 x_B F_1}{\partial x_j \partial k_t^2} \right] \tag{2.20}$$

Die Größe X_{j0} beschränkt die Integration auf Bereiche mit einem Jet, für den $x_j \geq x_{j0}$ gilt.

Ein Vergleich mit Gleichung 2.7 für den Wirkungsquerschnitt der tiefinelastischen Streuung zeigt sofort die Ähnlichkeit. Die zusätzlichen Bedingungen aufgrund des Vorwärtsjets stecken allein in den nach den Jetvariablen abgeleiteten Strukturfunktionen, über die in Gleichung 2.20 integriert wird. Unter Verwendung der BFKL–Gleichung ergibt sich für die abgeleitete Strukturfunktion F_2 folgende Gleichung:

$$\frac{\partial F_2}{\partial x_j \partial k_T^2} = \frac{3\alpha_s(Q^2)}{\pi k_T^4} \sum_{Partonen} f_a(x_j, k_T^2) F(z, Q^2, k_T^2), \tag{2.21}$$

wobei

$$f_a(x_j, k_T^2) \quad = \quad \text{Partondichte für das Parton } a \text{ an der Stelle } (x_j, k_T^2)$$

$$\begin{aligned} z &= \frac{x_B}{x_j} \text{ und} \\ F(z, Q^2, k_T^2) &= \text{beschreibt den Gluon–Photon Subprozeß inklusive der} \\ & \quad\ \text{Emission weicher Gluonen, gezeigt in dem oberen Teil} \\ & \quad\ \text{der Abbildung 2.5.} \end{aligned}$$

Wie aus Gleichung 2.21 ersichtlich geht in die differentielle Strukturfunktion die Partondichte für x_j, aber nicht x_B ein. F erfüllt die BFKL–Gleichung, die symbolisch in Abbildung 2.6 dargestellt ist [MART92]:

$$F(z, k_T^2) = F_0(k_T^2) + \int_z^1 \frac{dz'}{z'} \int dk_T'^2 K(k_T, k_T') F(z', k_T'^2) \tag{2.22}$$

F_0 ist nur der Quarkbox– und der gekreuzte Quarkbox–Beitrag zu der Funktion F, dargestellt in Abbildung 2.6. Der restliche Term summiert die effektiven Beiträge der Gluonkaskade auf, die sowohl von virtuellen als auch realen Gluon–Emissionen stammen.



Abb. 2.6: *Das Diagramm zeigt die führende* $\ln(1/x_B)$ *Approximation für den Term F von Gleichung 2.22 und Abbildung 2.5. Aus [MART92].*

Abbildung 2.7 gibt Auskunft über den Zusammenhang zwischen x_j, k_T^2 und dem Winkel θ_j, unter dem der Vorwärtsjet im Laborsystem beobachtet werden kann.

Die untere Grenze für den Winkel wird von dem Detektor vorgegeben, und wurde bei den Berechnungen in [MART92] auf $5°$ gesetzt. Aus der Verteilung ist ersichtlich, daß Vorwärtsjets mit großem x_j nur unter kleinen Winkeln θ_j auftreten, daher auch die Bezeichnung Vorwärtsjets. Bei vorgegebenem θ_j sind größere Werte von x_j nur bei Jets mit größeren k_T^2 zu beobachten, allerdings mit einer sehr kleinen Ereignisrate.

Die Tabelle 2.2 enthält die berechneten Wirkungsquerschnitte für tiefinelastische Streuung mit Jet–Produktion für verschiedene, bei HERA erreichbare, kinematische Regionen. Dabei sind folgende Schnitte bei der Integration berücksichtigt worden:

- $x_j > 0,05$
- $\theta_j > 5°$



Abb. 2.7: *Die Abhängigkeit zwischen kinematischen Jetvariablen für den Vorwärtsjet. Das eingezeichnete schraffierte Band entspricht Vorwärtsjets mit einem Winkel $\theta_j > 5°$ und einem $x_j > 0,05$ [BART92].*

- $\frac{1}{2}Q^2 < k_T^2 < 2Q^2$

Die Werte ohne Klammern geben die Wirkungsquerschnitte inklusive BFKL–Effekte, mit Klammern den Wirkungsquerschnitt nur für die Quarkbox–Approximation $F = F_0$, also ohne BFKL–Effekte an.

Dabei ist zu beachten, daß die Identifizierung der BFKL–Entwicklung nur über die relative Änderung des Wirkungsquerschnittes in den einzelnen Regionen zueinander möglich ist, da die absoluten Wirkungsquerschnitte Normierungsunsicherheiten unterliegen. Aufgrund der für die Analyse zur Verfügung stehenden Luminosität ist es angebracht, die Tabelle nur in zwei Bereiche in x_B zu unterteilen. Der erste Bereich, im folgenden als Region 1 bezeichnet, reicht von $2 \cdot 10^{-4}$ bis $1 \cdot 10^{-3}$, die Region 2 von $1 \cdot 10^{-3}$ bis $2 \cdot 10^{-3}$. Bei der Unterteilung der Tabelle in die beiden Regionen, $2 \cdot 10^{-4} < x_B < 1 \cdot 10^{-3}$ und $1 \cdot 10^{-3} < x_B < 2 \cdot 10^{-3}$, erhält man für das Verhältnis $Region1/Region2$ einen Wert von $2,0$ inklusive BFKL–Effekte und $1,3$ ohne BFKL–Effekte.

Eine neuere Rechnung, welche die in dieser Arbeit verwendeten Selektionsschnitte berücksichtigt, kommt auf ein Verhältnis von $1,63$ für die BFKL–Gleichung und $1,01$ für den 3–Jet–Wirkungsquerschnitt auf dem Born–Niveau [BART95].

Ziel dieser Arbeit ist es, festzustellen, ob diese vorgeschlagene Methode experimentell anwendbar ist und wenn ja, das Verhältnis des Wirkungsquerschnittes zwischen den beiden Regionen zu bestimmen, da dieses Verhältnis Zugriff auf die zugrundeliegende Dynamik



Tab. 2.2: *Die Wirkungsquerschnitte, angegeben in pb, für tiefinelastische Streuung mit Jet–Produktion für verschiedene, bei HERA erreichbare, kinematische Regionen. Die Zahlen in den Klammern stehen für die Quarkbox–Approximation $F = F_0$ (siehe Abbildung 2.6), die Zahlen ohne Klammern enthalten zusätzlich die Gluon–Emissionen aufgrund der BFKL–Entwicklung [MART92].*

der Partondichten ermöglicht. Dabei ist von besonderem Interesse, ob die Daten von der Rechnung mit oder ohne BFKL–Effekte besser beschrieben werden.

2.4 Monte–Carlo–Generatoren

2.4.1 Physikalische Grundlagen

Zur Simulation physikalischer Prozesse werden Monte–Carlo–Generatoren verwendet. Der Ablauf der Produktion kann in zwei Schritte aufgegliedert werden. Im ersten Schritt werden Partonen erzeugt, die danach im zweiten Schritt in Hadronen überführt werden.

Es gibt verschiedene Wege, QCD–Effekte in Monte–Carlo–Modelle zu integrieren. Ein

Weg führt über die Matrixelemente. Gemäß den Wirkungsquerschnitten werden die unterschiedlichen partonischen Endzustände „gewürfelt“, wobei die Impulse der Partonen durch die differentiellen Wirkungsquerschnitte bestimmt sind. Allerdings existieren zur Zeit für die tiefinelastische Streuung nur Monte–Carlo–Modelle mit Hadronisierung, die Matrixelemente bis zur ersten Ordnung in α_s enthalten [WEGN94]. Daher kann die im vorherigen Abschnitt besprochene Partonkaskade in einem rein auf Matrixelemente beschränkten Monte–Carlo–Generator nicht erzeugt werden.

Das Partonschauermodell basiert dagegen auf den QCD–Partonverzweigungen in der „leading logarithm approximation“, wobei nur die führenden kollinearen Singularitäten der vollständigen QCD–Rechnung beachtet werden. Der Name des Modells kommt von der Eigenschaft, daß die bei dem harten Subprozeß erzeugten Partonen in weitere Partonen zerfallen. Somit können Endzustände mit beliebig vielen Partonen erzeugt werden. Aufgrund der kollinearen Näherung ist allerdings die Vorhersage für harte QCD–Abstrahlung unter großen Winkeln unsicher (siehe z.B. [BENG88]).

Zur Vermeidung der jeweiligen Problembereiche ist es vorteilhaft, beide Modelle kombinieren zu können. Die Simulation beginnt dann mit einer harten Abstrahlung, wie sie von den Matrixelementen in der ersten Ordnung α_s beschrieben werden, und anschließend werden weiche Abstrahlungen durch Partonschauer hinzugefügt [INGE80].

Einen ganz anderen Ansatz verfolgt das Farbdipolmodell [GUST86, GUST88, ANDE89]. Die Abstrahlung von Gluonen wird als Abstrahlung eines Gluons von einem Farbdipol angesehen. Die abstrahlenden Dipole können sowohl $q\bar{q}, qg, \bar{q}g$ als auch gg–Dipole sein. Ein Problem stellt allerdings der Prozess $g \rightarrow q\bar{q}$ dar, der die Grundlage für die Photon–Gluon–Fusion ist, aber nicht einfach in das Modell eingefügt werden kann.

Nach der Generierung der Partonen erfolgt die Simulation des hadronischen Endzustandes. Zur Zeit existieren dafür nur phänomenologische Näherungen. Ein in vielen Monte–Carlo–Generatoren verwendetes Modell ist das Lund–String–Modell [ANDE83]. Das String–Modell betrachtet das zwischen Partonen aufgespannte Farbfeld als Farbflußröhre ohne transversalen Freiheitsgrad.Für große Abstände wird eine lineare Abhängigkeit zwischen der Energie des Farbfeldes und Abstand der Partonen erwartet. Wenn die Partonen auseinanderlaufen, erhöht sich die Energie in der Farbflußröhre, bis sie durch Erzeugung eines $q\bar{q}$–Paares aufbricht. Sofern genügend Energie vorhanden ist, kommt es zu weiteren Aufspaltungen. Im Lund–String–Modell bleiben an jeder Stelle des Fragmentationprozesses Energie, Impuls und Flavour erhalten. Die Fragmentation ist lorentzinvariant.

2.4.2 Aufbau verschiedener Generatoren

Im folgenden werden die Generatoren kurz erläutert, die in dieser Arbeit Vewendung fanden. Alle Generatoren führen die Fragmentation gemäß dem Lund–String–Modell mit dem Programm JETSET [ANDE83] durch:

- Der Monte–Carlo–Generator LEPTO [INGE80, INGE91] erzeugt Ereignisse in der tiefinelastischen Elektron–Protonstreuung gemäß den Wirkungsquerschnitten der elektroschwachen Wechselwirkung in führender Ordnung der Kopplungskonstanten α. Für die Einbeziehung von QCD–Effekten stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl:
  - das Partonschauermodell (PS),
  - das Matrixelementmodell (ME) und
  - die Kombination aus beiden, das Matrixelemente plus Partonschauer–Modell (MEPS).

  Die Partonkaskaden dieses Generators sind in k_T entsprechend der DGLAP–Gleichung geordnet. Die Matrixelemente-Option enthält alle Matrixelemente bis zur ersten Ordnung in α_s. Inwieweit dieser phänomenologische Generator die Vorhersagen der DGLAP–Gleichung oder der BFKL–Gleichung beschreibt, insbesondere die Vorgänge innerhalb der Partonkaskade, ist zur Zeit noch nicht geklärt worden [H1-95f].

- Der Monte–Carlo–Generator ARIADNE [LÖNN92] ist eine Implementation des Farbdipolmodells. Für die Generierung von Ereignissen der Boson–Gluon–Fusion wird der Generator LEPTO mit der Matrixelemente–Option aufgerufen. Werden die Partonen in der Kaskade in x_j, wie sowohl von der GLAP– als auch der BFKL–Gleichung vorhergesagt, geordnet, sind sie nicht mehr in k_T geordnet. Diese Eigenschaft entspricht den Vorhersagen der BFKL–Gleichung, allerdings ist auch bei diesem Generator noch nicht geklärt, inwieweit er der Theorie entspricht. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Partonkaskade [H1-95f].

- Der Generator DJANGO [SCHU91] ist eine Verbindung von HERACLES, LEPTO und JETSET. HERACLES [KWIA91] enthält bei der Simulation von tiefinelastischen Ereignissen alle Matrixelemente bis zur ersten Ordnung in α_s als auch für elektromagnetische Strahlungskorrekturen die leptonischen und quarkonischen Korrekturen, sowie deren Interferenzen der Ordnung α. Ferner sind alle virtuellen Ein–Schleifen–Korrekturen implementiert. Dieser Generator zeichnet sich daher

	LEPTO	ARIADNE	DJANGO
Matrixelemente	Ja	nur Boson–Gluon Fusion	Ja
Partonschauer	Ja	Nein	Ja
Farbdipole	Nein	Ja	Nein
Strahlunskorrekturen	Nein	Nein	Ja

Tab. 2.3: *Implementierte Modelle in den verwendeten Generatoren*

gegenüber den vorher besprochenen Generatoren durch die Beschreibung der wichtigsten Anteile der elektromagnetischen Strahlungskorrekturen aus.

Die Vorhersagen der Monte–Carlo–Generatoren bezüglich der Partonkaskade können nur nach dem zweiten Schritt, also nach Bildung des hadronischen Endzustandes verglichen werden, da die Partonen nur einen Zwischenzustand darstellen, dessen Definition vom Monte–Carlo–Generator abhängig ist. Das Niveau des hadronischen Endzustandes wird im folgenden als Hadron–Niveau bezeichnet, das Niveau der gemessenen und rekonstruierten Signale im Detektor als Detektor–Niveau.

Um vom Hadron–Niveau zum Detektor-Niveau zu gelangen, werden die Signale, welche das Elektron und der hadronischen Endzustand im Detektor erzeugen würden, simuliert. Die Siumulation hält sich dabei so gut wie möglich an die realen Eigenschaften des Detektors, wodurch die simulierten Ereignisse im weiteren wie gemessene Daten behandelt werden können.

Kapitel 3

Experimentelle Grundlagen

In diesem Kapitel werden Eigenschaften der Speicherringanlage HERA und des H1–Detektors beschrieben, mit dem die verwendeten Daten im Jahre 1993 aufgezeichnet wurden. Die Beschreibung konzentriert sich dabei auf die für die Selektion und Analyse der Daten relevanten Detektorkomponenten. Eine ausführliche Beschreibung des Detektors findet man in [H1-93b].

3.1 Der Speicherring HERA

Der Doppelspeicherring HERA wurde von 1984 bis 1991 bei DESY in Hamburg gebaut und besteht aus zwei separaten Ringen mit einem Umfang von jeweils $6,3\,km$. Ein Ring besteht aus normalleitenden Magneten und dient zur Beschleunigung und Speicherung von Elektronen oder Positronen. Der andere Ring ist mit supraleitenden Magneten bestückt, um die notwendigen Feldstärken für die Beschleunigung und Speicherung von Protonen mit einer Energie von $820\ GeV$ zu liefern.

Die Abbildung 3.1 zeigt den Speicherring HERA und die für die Beschleunigung der Elektronen und Protonen verwendeten Anlagen. Die Elektronen werden von einem Linearbeschleuniger mit einer Energie von $500\ MeV$ in das Synchroton DESY II injiziert und dort auf $7\ GeV$ beschleunigt. Die nächste Stufe ist der Speicherring PETRA, von dem sie bei einer Energie von $12\ GeV$ an HERA übergeben werden, wo die Elektronen ihre Endenergie erreichen, die im Jahr 1993 26.7 GeV betrug.

Eine H^-–Quelle mit einem nachgeschalteten Linearbeschleuniger erzeugt $50\ MeV$ H^- Ionen. Den Ionen werden die Elektronen abgestreift und die dadurch entstandenen Proton in DESY III injiziert. Dort werden die Protonen auf 7.5 GeV, in PETRA auf 40 GeV und schließlich in HERA auf 820 GeV beschleunigt [WIIK91].

In zunächst zwei der vier möglichen Wechselwirkungszonen, der Experimentierhalle Nord mit dem Experiment H1 und der Experimentierhalle Süd mit dem Experiment ZEUS, werden die ansonst getrennten Strahlen zur Kollision gebracht. Das Experiment H1 wird