Université Libre de Bruxelles
Faculté des Sciences

Electroproduction élastique de mésons ρ à HERA

(Electroproduction of ρ mesons at HERA)

Dissertation présentée en vue
de l'obtention du titre de
Docteur en Sciences

Barbara CLERBAUX

Décembre 1998

Résumé

Notre travail de thèse a consisté en la participation, dans le cadre du laboratoire de physique des particules élémentaires de l'ULB, à l'analyse des résultats de l'expérience H1 au collisionneur positrons-protons HERA, à DESY (Hambourg). Ce travail se situe dans le cadre général de l'analyse des interactions diffractives, dont la compréhension constitue un défi majeur pour la chromodynamique quantique. Notre analyse a porté sur la production diffractive de mésons ρ: $ep \rightarrow ep\rho$, aux grandes valeurs de Q^2, l'opposé du carré de la quadri-impulsion portée par le photon virtuel échangé lors de l'interaction ($Q^2 > 2.5$ GeV^2) et aux grandes valeurs de W, l'énergie disponible dans le centre de masse hadronique ($30 < W < 140$ GeV) [1]. Les données ont été récoltées durant l'année 1996, correspondant à une luminosité totale de 3.87 pb^{-1}.

La distribution de la masse invariante des deux pions de désintégration du méson ρ a été étudiée en fonction de la variable Q^2. L'ensemble complet des 15 paramètres caractérisant la matrice de densité de spin du méson ρ a été mesuré. Le rapport R des sections efficaces γ^*p longitudinale et transverse augmente avec Q^2 et atteint la valeur $R \approx 3$ pour $Q^2 = 20$ GeV^2. Nous avons observé aux grandes valeurs de Q^2 une violation faible mais significative de l'hypothèse de la conservation de l'hélicité dans le canal s et nous avons établi que le rapport de l'amplitude dominante avec changement d'hélicité aux amplitudes sans changement d'hélicité est de $8 \pm 3\%$. La distribution en t, le carré de la quadri-impulsion échangée entre les protons incident et diffusé, des événements de production diffractive de mésons ρ est bien reproduite pour $|t| < 0.5$ GeV^2 par une dépendance exponentielle décroissante de pente b. Le paramètre b diminue aux grandes valeurs de Q^2. La section efficace $\gamma^*p \rightarrow \rho p$ a été mesurée dans le domaine cinématique $2.5 < Q^2 < 35$ GeV^2 et $W = 75$ GeV et suit la dépendance $\sigma(\gamma^*p) \propto 1/(Q^2 + m_\rho^2)^n$, avec $n = 2.24 \pm 0.09$. La dépendance en W de la section efficace $\gamma^*p \rightarrow \rho p$ a été mesurée pour 5 valeurs de Q^2. L'augmentation de la section efficace avec l'énergie est plus forte que dans le cas des interactions hadron-hadron et les données semblent indiquer, bien que les erreurs soient importantes, que cette dépendance augmente quand Q^2 augmente.

[1]Tout au long de cette thèse nous avons utilisé le système d'unités naturel: $\hbar = c = 1$.

Abstract

This thesis consists in an analysis of data collected by the H1 detector at the electron-proton collider HERA. The general framework of this work is the analysis of the diffractive interactions, of which the understanding is a major challenge for the quantum chromodynamic theory. We studied the elastic electroproduction of ρ mesons: $ep \rightarrow ep\rho$, for photon virtuality $Q^2 > 2.5$ GeV^2 and for hadronic centre of mass energy in the range $30 < W < 140$ GeV. The analysed data were taken in 1996, corresponding to an integrated luminosity of 3.87 pb^{-1}.

The shape of the ρ mass distribution is studied as a function of Q^2. The full set of ρ spin density matrix elements is measured. The ratio R of the longitudinal and transverse $\gamma^* p$ cross sections reaches the value $R \approx 3$ for $Q^2 = 20$ GeV^2. Evidence is found at high Q^2 for a weak but significant violation of s channel helicity conservation hypothesis. The ratio of the dominant helicity flip to non flip amplitudes is estimated to be 8 ± 3 %. The t distribution, where t is the four-momentum transfer squared to the proton, of the signal is well described for $|t| < 0.5$ GeV^2 by an exponential fall off with a slope parameter b which decreases with Q^2. The dependence of the cross section on Q^2 is measured in the range $2.5 < Q^2 < 35$ GeV^2 and for $W = 75$ GeV, and follows the parametrisation $\sigma(\gamma^* p) \propto 1/(Q^2 + m_\rho^2)^n$, with $n = 2.24 \pm 0.09$. The W dependence of the cross section $\gamma^* p \rightarrow \rho p$ is measured for five Q^2 values, suggesting that the W dependence of the $\gamma^* p$ cross section is higher than for hadron–hadron interactions, especially at high Q^2.

Sommaire

Chapitre 1

Introduction

Le cadre général de ce travail de thèse est celui de l'étude des composants ultimes de la matière subnucléaire et des forces élémentaires qui les lient. Cette étude constitue le but principal des expériences de diffusion profondément inélastique d'électrons sur protons menées auprès du collisionneur HERA, mis en fonctionnement fin 1991 sur le site de DESY (Hambourg). Par rapport aux expériences sur cible fixe, le mode collisionneur et les hautes énergies mises en jeu à HERA (l'énergie des faisceaux étant de 27.5 GeV pour les électrons et de 820 GeV pour les protons) permettent d'étendre le domaine d'observation des diffusions profondément inélastiques de deux ordres de grandeur vers les grandes valeurs de Q^2, l'opposé du carré de la quadri-impulsion portée par le photon échangé dans l'interaction ($Q^2_{max} = 4\ 10^4$ GeV^2) et vers les petites valeurs de x, la fraction de l'impulsion du proton portée par le quark participant à l'interaction, définie dans le référentiel du proton en mouvement rapide ($x_{min} = 5\ 10^{-5}$).

Grâce à la grande luminosité accumulée ces dernières années par le collisionneur HERA, la fonction de structure F_2 du proton a été mesurée avec grande précision dans un vaste domaine de valeurs de Q^2. Une découverte importante à HERA a été l'observation que cette fonction de structure augmente rapidement aux petites valeurs de x, qui correspondent aux grandes valeurs de W, l'énergie disponible dans le centre de masse hadronique. Ce comportement est très différent de celui observé à haute énergie pour les interactions hadron-hadron, où la dépendance en l'énergie de la section efficace totale est faible. Les mesures de la fonction de structure F_2 du proton à HERA ont permis de tester avec grande précision la théorie des interactions fortes, la chromodynamique quantique (QCD) et d'extraire les densités de quarks et de gluons dans le proton.

Un autre type d'interactions suscite également beaucoup d'intérêt à HERA: les interactions diffractives. Celles-ci sont caractérisées par une topologie particulière des particules dans l'état final: il existe un grand saut en rapidité entre le système du proton diffusé et le système hadronique, suggérant que l'objet échangé dans l'interaction ne porte pas de couleur. Dans les années 1970, les processus diffractifs ont été abondamment étudiés dans les interactions hadron-hadron et ont été décrits phénoménologiquement, dans le cadre du modèle de Regge, par l'échange dans le canal t d'un objet appelé le pomeron. Les interactions diffractives sont étudiées à HERA au moyen de la mesure inclusive de la fonction de structure diffractive et de l'étude des propriétés de l'état final hadronique. Une troisième approche consiste en une analyse exclusive: l'étude de la production diffractive des mésons vecteurs et en particulier des mésons ρ, qui est le sujet de cette thèse.

Expliquer les propriétés des interactions diffractives et en particulier de la production diffractive de mésons ρ constitue un défi majeur pour la chromodynamique quantique. L'approche la plus simple, dans ce cadre, modélise le pomeron comme un système de deux gluons, ce qui établit un lien direct entre la structure des hadrons et les propriétés de la diffraction.

Dans cette thèse, nous étudions la production diffractive de mésons ρ dans le domaine cinématique $2.5 < Q^2 < 60$ GeV^2 et $30 < W < 140$ GeV, en analysant les données récoltées en 1996 auprès du détecteur H1 et correspondant à une luminosité de 3.87 pb^{-1} [1]. Ce travail se situe dans la continuité de deux analyses précédentes menées par l'expérience H1 et basées en grande partie sur nos résultats personnels. La première analyse utilisait les données récoltées en 1994 dans le domaine cinématique $Q^2 > 8$ GeV^2, correspondant à une luminosité de 2.8 pb^{-1} et comportant de l'ordre de 180 événements [2]. La seconde analyse utilisait les données récoltées en 1995, pour lesquelles le point d'interaction nominal avait été déplacé de 70 cm dans la direction du proton diffusé, permettant de sonder le domaine cinématique $1 < Q^2 < 5$ GeV^2; cette étude, portant sur environ 500 événements, correspondait à une luminosité de 125 nb^{-1} [3].

Notre travail se compose de 9 chapitres, dont le premier constitue la présente introduction.

Dans le second chapitre, nous présentons une introduction générale à la production diffractive de mésons vecteurs. Nous décrivons d'abord les caractéristiques essentielles des sections efficaces d'interaction hadron-hadron à haute énergie, et introduisons les modèles phénoménologiques et l'approche partonique de la diffraction. Nous présentons ensuite les idées fondamentales à la base des principaux modèles de production de mésons vecteurs (modèle à dominance mésovectorielle et approches basées sur la chromodynamique quantique). Nous terminons ce second chapitre par une brève revue des expériences ayant trait à la production diffractive de mésons vecteurs réalisées avant le présent travail.

Le troisième chapitre présente brièvement le collisionneur HERA et le détecteur H1. Nous décrivons avec quelque détail les parties du détecteur utilisées dans notre travail et les critères de sélection des événements de production élastique de mésons ρ.

La cinématique de l'interaction est présentée au quatrième chapitre, qui décrit également l'algorithme de simulation par Monte-Carlo (le programme DIFFVM), utilisé pour corriger les distributions expérimentales pour les effets liés au détecteur.

Le cinquième chapitre détaille les effets pour lesquels les données doivent être corrigées, ce qui comprend l'efficacité du système d'acquisition des données, les acceptances géométriques des sous-détecteurs utilisés, les migrations et les pertes d'événements résultant des critères de sélection. Les bruits de fond restant dans l'échantillon final sont estimés, ainsi que les corrections radiatives.

Les trois chapitres suivants exposent les résultats expérimentaux obtenus pour la production élastique de mésons ρ.

Le sixième chapitre présente la distribution de la masse invariante des deux pions de désintégration du méson ρ. Les paramétrisations de Ross-Stodolsky et de Söding sont utilisées afin de décrire la déformation de la distribution de la masse invariante $m_{\pi\pi}$ par rapport à une distribution de Breit-Wigner relativiste. La dépendance des paramètres de déformation en la variable Q^2 est mesurée.

La polarisation du photon échangé et celle du méson ρ dans l'état final sont étudiées en détail au septième chapitre. Nous commençons par définir le formalisme utilisé et les hypothèses SCHC (s-channel helicity conservation) et NPE (natural parity exchange). Nous présentons ensuite la mesure des 15 paramètres liés aux éléments de la matrice de densité de spin du méson ρ. Sous les approximations SCHC et NPE, le rapport des sections efficaces longitudinale et transverse ainsi que la phase entre les amplitudes de production longitudinale et transverse sont estimés. Nous discutons ensuite la violation de l'hypothèse SCHC. Finalement, les prédictions de plusieurs modèles théoriques sont comparées à nos résultats.

Le huitième chapitre présente les sections efficaces différentielles de production de mésons ρ. Le paramètre exponentiel décrivant la distribution en t des événements de la sélection finale est mesuré, ainsi que sa dépendance en Q^2. Nous présentons ensuite les dépendances de la section efficace $\gamma^* p \to \rho p$ en fonction de Q^2 et de W. Ces résultats sont comparés avec les prédictions des modèles théoriques.

Le neuvième chapitre regroupe l'ensemble des résultats et présente la conclusion de ce travail.

Une grande partie des résultats présentés aux chapitres 6, 7 et 8 est reprise en annexe sous forme de tables.

Chapitre 2

La production diffractive de mésons vecteurs

Dans la première moitié du 17ème siècle, Grimaldi observe la déviation des rayons lumineux au bord d'objets opaques et la formation de figures au-delà de l'objet. Il appelle ce phénomène la diffraction. Celle-ci apparaît lorsque la propagation d'une partie du front d'onde est obstruée par un obstacle: l'amplitude ou la phase de l'onde est altérée, ce qui conduit à des interférences, l'intensité des figures de diffraction étant liée aux dimensions spatiales de l'obstacle. En 1927, l'observation par Davisson et Germer et par Thompson des figures de diffraction lors de la diffusion d'un faisceau d'électrons par un réseau cristallin confirme l'intuition fondamentale de de Broglie et établit sur une base expérimentale la double nature, corpusculaire et ondulatoire, des objets quantiques. Dans le domaine de la physique des hautes énergies, des phénomènes de diffraction importants caractérisent les interactions fortes [4, 5].

Dans ce chapitre d'introduction, nous décrivons d'abord les caractéristiques essentielles des sections efficaces d'interaction hadron-hadron à haute énergie. Nous présentons la section efficace totale, mise en contraste avec celle de la diffusion profondément inélastique, et les sections efficaces élastique et diffractive. Nous introduisons ensuite brièvement les modèles de la diffraction (modèles phénoménologiques et approche partonique), puis nous présentons les idées fondamentales qui sont à la base des différents modèles pour la production diffractive de mésons vecteurs dans les interactions photon-proton (modèle à dominance mésovectorielle et approches basées sur la chromodynamique quantique). Nous terminons ce chapitre d'introduction en donnant une brève revue des expériences ayant étudié la production diffractive de mésons vecteurs.

2.1 Sections efficaces totale, élastique et diffractive

Dans cette section, nous reprenons les caractéristiques essentielles des sections efficaces hadroniques à haute énergie. Nous commençons par décrire la dépendance en l'énergie de la section efficace totale hadron-hadron, que nous comparons à celle obtenue dans les interactions profondément inélastiques. Nous décrivons ensuite les interactions élastiques de hadrons et introduisons la section efficace différentielle $d\sigma/dt$. Les interactions diffractives de hadrons sont finalement présentées.



Figure 2.1: Représentations schématiques de la réaction inclusive A+B $\rightarrow$ X (a) et de la réaction élastique A+B $\rightarrow$ A+B (b).

2.1.1 Sections efficaces totales

Considérons la réaction:

$$A + B \rightarrow X, \tag{2.1}$$

où A et B sont deux hadrons et X un ensemble de particules (voir figure 2.1a). Nous nous intéressons à la dépendance de la section efficace totale d'interaction σ_{tot} en l'énergie disponible dans le système du centre de masse $\sqrt{s}$.

A basse énergie, $\sqrt{s} \lesssim$ quelques GeV, on observe [6] que les sections efficaces totales d'interaction sont caractérisées par une dépendance importante en l'énergie: une série de pics est observée, correspondant à la production de résonances, la forme de la dépendance en l'énergie de la section efficace dépendant de la réaction hadronique considérée.

Par contre, à haute énergie, $\sqrt{s} \gg$ quelques GeV, les sections efficaces totales d'interaction hadronique possèdent toutes la même caractéristique: quand l'énergie augmente, la section efficace totale est presque constante ou augmente lentement. Pour $\sqrt{s} \simeq 20$ GeV, les sections efficaces totales sont respectivement $\sigma_{tot}(pp)$ et $\sigma_{tot}(p\bar{p}) \simeq 40$ à 45 mb, $\sigma_{tot}(\pi p)$ $\simeq 25$ mb et $\sigma_{tot}(Kp) \simeq 20$ mb (voir figure 2.2). Le comportement de la section efficace d'interaction photon-proton est similaire. A haute énergie, cette augmentation lente avec l'énergie des sections efficaces hadroniques totales est caractéristique des interactions "soft" [1].

Ce comportement est à mettre en contraste avec celui des interactions appelées "dures", en particulier la diffusion profondément inélastique électron-proton, aux grandes valeurs de Q^2, l'opposé du carré de la quadri-impulsion échangée dans le processus. Les expériences H1 et ZEUS ont en effet observé dès 1992, pour le domaine profondément inélastique ($Q^2 >$ quelques GeV^2), une augmentation rapide de la fonction de structure F_2 du proton et donc de la section efficace totale $\gamma^* p$, avec l'énergie du système hadronique W. Ce comportement est illustré à la figure 2.3, présentant la dépendance de la section efficace totale $\gamma^* p$ en fonction de W^2, pour différentes valeurs de Q^2 (jusque 2000 GeV^2). Les données à haute énergie proviennent des expériences H1 [8, 9] et ZEUS [10, 11]. La dépendance de la fonction de structure $F_2(x, Q^2)$ du proton en la variable de Bjorken x ($\simeq Q^2/W^2$) peut être paramétrisée sous la forme x^λ. La figure 2.4 montre comment le paramètre λ augmente avec Q^2.

[1]Pour caractériser ce type de comportement, nous nous permettons de conserver, tout au long de cette thèse, le terme anglais "soft", qui n'a pas d'équivalent généralement admis en français. Par contre nous utiliserons le terme français "dur" pour désigner le terme "hard".
Notons que, dans le cas des interactions photon-proton, une contribution "dure" aux sections efficaces totale et élastique pourrait être présente [7].



Figure 2.2: Sections efficaces totales pour les interactions proton-proton et proton-antiproton (a), pour les interactions π^+-proton et π^--proton (b), pour les interactions K$^+$-proton et K$^-$-proton (c) et pour les interactions photon-proton (d). Les courbes en traits continus représentent le résultat de l'ajustement de la paramétrisation 2.20 aux données [19].

2.1.2 Sections efficaces élastiques

Un cas particulier de la réaction 2.1 est celui de l'interaction élastique:

$$A + B \rightarrow A + B. \tag{2.2}$$

Si la variable t représente le carré de la quadri-impulsion échangée dans l'interaction (voir figure 2.1b), dans le système du centre de masse des particules A et B, $t = -2p^2(1 - \cos\theta)$ (où θ est l'angle de diffusion de la particule A). Les petites valeurs de $\sqrt{-t}$ sont proches de l'impulsion transverse (par rapport à l'axe formé par les directions des particules A et B dans l'état initial) de la particule A après diffusion: $t \simeq -p^2\theta^2 \simeq -p_t^2$. Dans ce cas, la diffusion est peu violente, les particules interagissent de loin. Le transfert d'impulsion est lié à la structure spatiale des particules qui interagissent: les interactions aux petites valeurs de $|t|$ sondent la forme générale et la taille des particules interagissantes, alors qu'à grand $|t|$, la structure à petite distance est sondée.



Figure 2.3: Dépendance de la section efficace totale $\gamma^{(*)}p$ en fonction de W^2, pour différentes valeurs de Q^2 (jusque 2000 GeV^2). Les données à haute énergie proviennent des expériences H1 [8, 9] et ZEUS [10, 11].



Figure 2.4: Paramètre λ mesuré par la collaboration H1 [8, 9], en fonction de Q^2.



Figure 2.5: Sections efficaces élastiques différentielles dσ/dt d'interaction proton-proton en fonction de t et de l'énergie incidente. Les données proviennent de [12].

Dans les interactions élastiques de hadrons (interactions proton-proton et proton-antiproton, pion-proton et kaon-proton), la section efficace élastique à haute énergie est dominée par un pic prononcé à petit $|t|$, dont la forme et la taille changent peu avec l'énergie (voir figure 2.5). Pour les valeurs $|t| \lesssim 0.5$ GeV^2 le pic diffractif est communément paramétrisé selon une forme exponentielle décroissante:

$$\frac{d\sigma}{dt} = Ne^{-b|t|}. \tag{2.3}$$

Le comportement en t des sections efficaces élastiques présenté à la figure 2.5 peut être rapproché des figures de diffraction observées en optique. Considérons, en nous basant sur un modèle optique simple, la réaction $A+B \rightarrow A+B$, et supposons en première approximation que la section efficace soit indépendante de l'énergie, dépendant uniquement du paramètre d'impact b, c'est-à-dire de la distance entre les deux particules, définie selon une direction perpendiculaire à la direction de vol relative. La particule B (au repos) étant modélisée comme un disque noir de rayon R, la réaction peut être décrite comme l'absorption de l'onde de la particule A par le disque. Dans le cas le plus simple, supposons que l'absorption soit complète pour $b < R$ et qu'il n'y ait pas d'interaction pour $b > R$. Après un développement en série, la section efficace différentielle s'écrit:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto |f(\theta)|^2 = |f(0)|^2 \left(1 - \frac{p^2\theta^2 R^2}{2} + ...\right), \tag{2.4}$$

où Ω représente l'angle solide et $f(\theta)$ est l'amplitude de diffusion, p et θ étant respectivement l'impulsion et l'angle de diffusion de la particule A, toutes ces quantités étant définies dans le système du centre de masse de la paire $(A,\ B)$. Le développement est valable pour le domaine des petites valeurs de θ. Pour p et R fixés, la section efficace est donc importante à petit angle de diffusion θ. Si nous effectuons le changement de variable $t \simeq -p^2\theta^2$ pour les petites valeurs de $|t|$, les termes entre parenthèses de l'équation 2.4, $(1-|t|R^2/2+...)$, peuvent être vus comme les premiers termes du développement en série de la fonction exponentielle: $e^{-b|t|} = 1 - b|t| + ...$ avec $b \propto R^2$.

Le comportement exponentiel à petit $|t|$ de la section efficace hadronique peut donc être relié à la diffraction d'une onde lumineuse par une ouverture circulaire et le paramètre b peut être interprété comme une mesure du rayon de la particule sur laquelle a lieu la diffusion. Pour les interactions proton-proton, la valeur $b \simeq 10$ GeV^{-2} correspond à la valeur de 0.9 10^{-15} m pour le rayon du proton [2]. De manière plus générale, le paramètre b donne une mesure de la taille des objets qui participent à l'interaction:

$$b \propto R_A^2 + R_B^2, \tag{2.5}$$

où R_A et R_B sont respectivement les rayons des particules A et B. Il faut noter dès maintenant que le paramètre b augmente lentement (le pic diffractif devient plus fin) quand l'énergie augmente (phénomène de "shrinkage", voir équation 2.26).

Le théorème optique relie la partie imaginaire de l'amplitude de diffusion élastique vers l'avant, $f(\theta = 0)$, à la section efficace totale:

$$\mathrm{Im} f(0) = \frac{p}{4\pi}\sigma_{tot}. \tag{2.6}$$

Les interactions élastiques sont caractérisées par la section efficace différentielle:

$$\left.\frac{d\sigma_{el}}{d\Omega}\right|_{\theta=0} = |f(0)|^2 = (\mathrm{Im} f(0))^2 + (\mathrm{Re} f(0))^2 = \left(\frac{p\ \sigma_{tot}}{4\pi}\right)^2 (1+\alpha^2), \tag{2.7}$$

où α est le rapport de la partie réelle à la partie imaginaire de l'amplitude de diffusion vers l'avant. En fonction de la variable t, l'expression se réécrit:

$$\left.\frac{d\sigma_{el}}{dt}\right|_{t=0} = \frac{\sigma_{tot}^2}{16\pi}\ (1+\alpha^2). \tag{2.8}$$

Le rapport α est petit pour le domaine en énergie accessible à HERA et l'amplitude de diffusion vers l'avant y est donc principalement imaginaire. En négligeant désormais la partie réelle de l'amplitude de diffusion vers l'avant ($\alpha = 0$) et en combinant les équations 2.3 et 2.8, on obtient:

$$\frac{d\sigma_{el}}{dt}(s,t) = \frac{\sigma_{tot}^2(s)}{16\pi}\ e^{-b|t|}. \tag{2.9}$$

[2] Le facteur de conversion $\hbar c = 0.197$ GeV fm est utilisé.

La section efficace élastique est obtenue en intégrant l'équation 2.9 sur la variable t:

$$\sigma_{el}(s) = \int \frac{d\sigma_{el}}{dt}(s,t) \ \ dt \simeq \frac{\sigma_{tot}^2(s)}{16\pi} \frac{1}{b(s)} = \frac{0.051 \ \sigma_{tot}^2(s)}{b(s)}, \tag{2.10}$$

où la section efficace totale σ_{tot} et le paramètre de pente b sont exprimés respectivement en mb et en GeV^{-2}. La section efficace élastique de diffusion hadron-hadron présente donc un comportement "soft" avec l'énergie, comme la section efficace totale.

La section efficace inélastique est définie par la relation:

$$\sigma_{inel}(s) = \sigma_{tot}(s) - \sigma_{el}(s). \tag{2.11}$$

Dans le cas de l'interaction pion-proton, avec $\sigma_{tot} \simeq 25$ mb, $b \simeq 8 \ \mathrm{GeV}^{-2}$, on mesure que $\sigma_{inel} \simeq 21$ mb et $\sigma_{el} \simeq 4$ mb.

2.1.3 Sections efficaces diffractives

Un cas particulier des interactions inélastiques est celui des interactions diffractives. Celles-ci constituent en quelque sorte une généralisation des interactions élastiques, de la forme :

$$A + B \to C + D, \tag{2.12}$$

où les masses M_C et M_D des systèmes de particules C et D sont beaucoup plus faibles que l'énergie disponible dans le centre de masse:

$$M_C, M_D \ll \sqrt{s}. \tag{2.13}$$

On peut distinguer les interactions diffractives avec dissociation simple (SD) et les interactions diffractives avec dissociation double (DD), représentées respectivement aux figures 2.6a,b et 2.6c.

Dans un sens large, on parle d'interactions diffractives lorsque la relation 2.13 est vérifiée. La cinématique implique que les systèmes C et D soient nettement séparés. La figure 2.7



Figure 2.6: Représentation schématique des interactions diffractives avec dissociation simple (a et b) et avec dissociation double (c).



Figure 2.7: Représentation schématique de la distribution dN/dy pour les interactions inélastiques non-diffractives ($A+B \rightarrow X$, voir figure 2.1a) (a) et diffractives ($A+B \rightarrow C+D$, voir figure 2.6c) (b).

oppose schématiquement les interactions inélastiques non-diffractives (figure 2.7a) et diffractives (figure 2.7b). Dans le premier cas, les particules de l'état final sont distribuées uniformément en rapidité [3] dans le système du centre de masse. Dans le deuxième cas, elles sont rassemblées en deux systèmes séparés par un saut en rapidité.

La section efficace d'interaction diffractive est caractérisée, de manière semblable à celle des interactions élastiques, par une dépendance faible ("soft") en l'énergie et par la présence d'un pic diffractif:

$$\frac{d\sigma_{el}}{dt}(A+B \rightarrow C+D) \propto e^{-b|t|}. \tag{2.15}$$

Le paramètre b pour les interactions diffractives est plus grand que pour les interactions élastiques (caractère périphérique des interactions diffractives, voir section 2.2.1).

Dans une approche basée sur la théorie de Regge (voir section 2.2.2), les interactions diffractives, au sens strict, correspondent à l'échange du pomeron, qui domine à très haute énergie les réactions obéissant à la relation 2.13.

2.2 Approches phénoménologiques et partoniques de la diffraction

Une description phénoménologique des processus diffractifs peut être proposée selon deux voies différentes [13]: l'étude des interactions dans le canal s (avec absorption différentielle des différentes composantes des hadrons) ou dans le canal t (modèle de Regge). Depuis

[3] La rapidité d'une particule est définie par la relation:

$$y = \frac{1}{2}\ln\frac{E+P_z}{E-P_z}, \tag{2.14}$$

où E et P_z sont respectivement l'énergie de la particule et la composante de son impulsion selon l'axe z.

l'apparition de la chromodynamique quantique comme théorie des interactions fortes, la diffraction peut être étudiée dans une approche partonique, qui tente de la décrire en termes d'échange de quarks et de gluons.

2.2.1 Absorption différentielle des ondes hadroniques dans le canal s

L'étude des interactions diffractives dans le canal s a été proposée par Feinberg et Pomeranchuk [14] et Good et Walker [15]. La diffusion diffractive est décrite dans cette approche comme la conséquence de l'absorption différentielle de l'onde hadronique incidente, considérée comme la superposition cohérente d'un grand nombre d'états hadroniques qui interagissent avec la cible avec des sections efficaces différentes et sont donc absorbés de manière différentielle. Après interaction, le système se réarrange, menant dans l'état final à la production d'états hadroniques de masses et/ou nombres quantiques différents de ceux de l'état initial.

La diffusion élastique, reliée par le théorème optique à la section efficace totale (dont elle constitue en quelque sorte l'"ombre"), se produit sur l'ensemble du volume de la cible. Par contre, les interactions diffractives (inélastiques), dues aux fluctuations dans l'amplitude d'absorption des composantes hadroniques de la particule incidente, sont de caractère périphérique, puisque l'absorption pour les différents états hadroniques varie davantage dans la région extérieure ("grise") de la cible que dans la partie centrale ("noire"), où l'absorption est totale.

Cette approche de la diffraction est peu prédictive a priori car elle requiert, pour la description des processus diffractifs, la connaissance d'une série de sections efficaces peu ou mal connues.

2.2.2 Approche du canal t et modèle de Regge

Dans l'approche de la diffraction dans le canal t, les propriétés générales d'unitarité, d'analiticité et de symétrie d'échange ("crossing symmetry") des amplitudes de diffusion sont utilisées afin de décrire l'interaction par l'échange de particules virtuelles, dont le spin fixe la dépendance en l'énergie de la section efficace. Ceci mène au modèle de Regge [16].

On a observé que lorsque les particules sont classées sur un graphique représentant leur spin en fonction du carré de leur masse, elles s'alignent en différentes familles selon des trajectoires linéaires. Ces trajectoires sont représentées à la figure 2.8, appelée figure de Chew-Frautschi. Ceci suggère que l'on puisse ajuster sur les données la paramétrisation:

$$\alpha(t) = \alpha(0) + \alpha' \, t. \tag{2.16}$$

Lorsque les processus de diffusion, caractérisés par l'échange de quadri-impulsion de carré négatif t, sont classés selon les nombres quantiques échangés dans le canal t, on constate que les données expérimentales s'alignent selon le prolongement des trajectoires définies pour les particules réelles (voir figure 2.8).



Figure 2.8: Graphique de Chew-Frautschi présentant deux trajectoires de Regge. Pour $t > 0$, le spin J est repris en fonction du carré de la masse pour les mésons $\rho(770)$, $\omega(782)$, $f_2(1270)$, $a_2(1320)$, $\rho_3(1690)$ et $a_4(1320)$ [6]. La ligne en traits pleins est le résultat d'un ajustement linéaire sur les résonances et est prolongée pour les valeurs négatives de t (ligne en traits discontinus). Pour $t < 0$, les points proviennent de l'analyse de la dépendance en s de la section efficace différentielle $d\sigma/dt$ pour l'interaction $\pi^- p \rightarrow \pi^0 n$ [17]. La ligne en traits pointillés représente la trajectoire du pomeron (avec $\alpha(0) = 1.08$ et $\alpha' = 0.25$ GeV^{-2}).

Ceci conduit à la notion de "trajectoires de Regge", formant une continuation analytique, dans le plan des variables complexes (J, t), des trajectoires de particules réelles.

Le modèle de Regge paramétrise la dépendance en l'énergie de la section efficace élastique aux petites valeurs de $|t|$ comme une loi de puissance où l'exposant est déterminé par la trajectoire échangée:

$$\frac{d\sigma_{el}}{dt} \propto e^{-b_0|t|} \left(\frac{s}{s_0}\right)^{2(\alpha(t)-1)}. \tag{2.17}$$

Le facteur d'échelle s_0 est généralement pris comme $s_0 = 1$ GeV^2.

En utilisant le théorème optique (équation 2.8), on trouve que la dépendance en l'énergie de la section efficace totale est déterminée par l'intercept de la trajectoire en $t = 0$:

$$\sigma_{tot} \propto \left(\frac{s}{s_0}\right)^{(\alpha(0)-1)}. \tag{2.18}$$

La trajectoire de Regge de la famille du méson ρ présentée à la figure 2.8, qui est celle possédant l'intercept le plus élevé parmi les familles de particules observées, a un intercept inférieur à 1. D'après l'équation 2.18, la section efficace totale due à l'échange de cette trajectoire diminue donc avec l'énergie. Toutefois les expériences d'interactions hadroniques à haute énergie montrent que, pour $\sqrt{s} \gtrsim 10$ GeV, la section efficace totale augmente légèrement avec l'énergie. Il a donc été nécessaire de postuler l'existence d'une trajectoire hypothétique [4] ayant un intercept légèrement supérieur à l'unité:

$$\alpha_{I\!P}(0) = 1 + \epsilon \ , \qquad \epsilon \geq 0. \tag{2.19}$$

Cette nouvelle trajectoire, appelée trajectoire du pomeron, domine donc à haute énergie. Comme les sections efficaces totale et élastique sont reliées par le théorème optique, cette trajectoire gouverne également les interactions élastiques et le pomeron se voit attribuer les nombres quantiques: $PC = ++$, $I^G = 0^+$.

Les sections efficaces totales hadron-hadron et photon-hadron sont bien décrites par la contribution de deux trajectoires seulement: d'une part, l'échange de "reggeons" (famille des mésons ρ, ω, f_2, a_2), qui domine à basse énergie et d'autre part l'échange du pomeron, qui domine à haute énergie. Donnachie et Landshoff [19] ont en effet pu décrire ces sections efficaces avec la paramétrisation:

$$\sigma_{tot} = X s^{\epsilon} + Y s^{-\eta}, \tag{2.20}$$

où X et Y sont exprimés en mb et s en GeV^2. Le premier terme correspond à l'échange du pomeron et le second à celui des reggeons. Comme le pomeron possède les nombres quantiques du vide, son couplage à une particule A est le même qu'à l'antiparticule $\bar{A}$, c'est-à-dire que les coefficients X sont les mêmes pour $\sigma(AB)$ et pour $\sigma(\bar{A}B)$.

La paramétrisation 2.20 est ajustée aux mesures des sections efficaces totales d'interaction pp et $p\bar{p}$, les valeurs obtenues pour les paramètres étant:

$$\epsilon = 0.08, \qquad \eta = 0.45. \tag{2.21}$$

Cette paramétrisation décrit également les mesures des sections efficaces totales d'interaction $\pi^{\pm}p$, $K^{\pm}p$ et γp (voir figure 2.2). Le coefficient X est le même pour les interactions proton-proton et proton-neutron. De plus, le rapport des coefficients X pour les interactions πp et pp est proche de la valeur 2/3. Ces observations sont en accord avec le modèle additif des quarks qui suppose que le pomeron se couple aux quarks de valence, indépendamment de leur saveur. Dans ce travail, nous nous référons à la valeur généralement utilisée $\epsilon = 0.08$, comme caractéristique des interactions "soft", permettant de décrire la dépendance en l'énergie de l'ensemble des sections efficaces totales hadron-hadron à haute énergie.

Notons cependant que récemment Cudell, Kang et Kim [20] ont proposé la paramétrisation:

$$\sigma_{AB} = X \ s^{\epsilon} + Y_1 \ s^{-\eta_1} + Y_2 \ s^{-\eta_2}, \tag{2.22}$$
$$\sigma_{\bar{A}B} = X \ s^{\epsilon} + Y_1 \ s^{-\eta_1} - Y_2 \ s^{-\eta_2}, \tag{2.23}$$

pour décrire l'évolution en l'énergie des sections efficaces totales, où le premier terme correspond à l'échange du pomeron, le deuxième terme correspond à l'échange de la trajectoire

[4] Aucune particule n'est observée sur la trajectoire du pomeron, excepté peut-être un candidat "glueball" (état résonant de gluons), observé par la collaboration WA91 [18].

des mésons ρ et ω et le troisième terme à celui de la trajectoire des mésons a_2 et f_2. Cette paramétrisation est ajustée aux données des expériences portant sur les interactions $p^{\pm}p$, $\pi^{\pm}p$, $K^{\pm}p$, γp et $\gamma\gamma$ [6]. La valeur obtenue pour le paramètre ϵ est 0.10. Les auteurs estiment les erreurs théoriques sur l'ajustement à 0.02 environ, l'intercept "soft" pouvant varier de 0.07 à 0.11.

La valeur du paramètre $\alpha'_{I\!P}$ est extraite des mesures des sections efficaces différentielles $d\sigma/dt$ dans le cas des diffusions élastiques pp et $p\bar{p}$ à haute énergie [21]. La valeur obtenue est $\alpha'_{I\!P} = 0.25$ GeV^{-2}. La trajectoire du pomeron s'écrit alors:

$$\alpha_{I\!P}(t) = 1.08 + 0.25\ t, \tag{2.24}$$

t étant exprimé en GeV^2.

La valeur $\alpha' > 0$ de la trajectoire du pomeron permet d'expliquer le phénomène de "shrinkage", c'est-à-dire le fait que la pente en t augmente avec l'énergie disponible dans le centre de masse. En effet, à partir des équations 2.16 et 2.17, la section efficace différentielle peut s'écrire:

$$\frac{d\sigma_{el}}{dt} \propto \left(\frac{s}{s_0}\right)^{2(\alpha(0)-1)} e^{-b(s)|t|} \tag{2.25}$$

avec la pente b:

$$b(s) = b_0 + 2\alpha' \ln \frac{s}{s_0}. \tag{2.26}$$

La dépendance en l'énergie de la pente b est une caractéristique du modèle de Regge.

Intégrant sur t, nous obtenons la dépendance en l'énergie de la section efficace élastique:

$$\sigma_{el} \propto \frac{s^{2\epsilon}}{b(s)}. \tag{2.27}$$

Notons que le modèle de Regge est compliqué (et que son pouvoir prédictif est affaibli) par la nécessité de considérer l'échange de plusieurs pomerons et la contribution des diagrammes avec interaction entre les pomerons échangés.

2.2.3 Approche partonique et chromodynamique quantique

A la fin des années 1980, l'expérience UA8 observe dans les interactions diffractives de diffusion $p\bar{p}$ la production de jets de particules caractérisés par une grande valeur de l'impulsion transverse par rapport à l'axe des faisceaux [23]. Cette observation renforce l'hypothèse selon laquelle le pomeron possèderait une structure partonique, c'est-à-dire serait composé de quarks et de gluons qui sont sujets à interagir de manière "dure", avancée notamment par Ingelman et Schlein [24].

A partir de 1992, les expériences ZEUS et H1, auprès du collisionneur électron-proton HERA, observent la présence d'événements possédant un grand saut en pseudo-rapidité [5] [25,

[5] La pseudo-rapidité η d'une particule est définie par la relation $\eta = -\ln\tan(\theta/2)$, où θ est l'angle polaire de la particule.

26]. Ces événements sont caractérisés par l'absence d'activité dans la partie avant du détecteur, c'est-à-dire dans la direction correspondant au proton diffusé. Cette topologie diffère de celle des événements de diffusion profondément inélastique où une chaîne de couleur relie les débris du proton au quark diffusé, menant à l'émission de particules dans toute la région concernée du détecteur (voir figure 2.7a). Les événements avec un grand saut en pseudo-rapidité contribuent de 8 à 10 % à la section efficace totale et leur distribution en Q^2 est semblable à celle de l'ensemble des événements profondément inélastiques (contribution "leading twist" à la section efficace). Ils sont attribués à des interactions diffractives. En effet, comme il n'y a pas d'échange de couleur dans une interaction diffractive (le pomeron portant les nombres quantiques du vide), les objets produits dans l'interaction se fragmentent indépendamment, selon le schéma de la figure 2.7b.

En plus des expériences H1 et ZEUS, les interactions diffractives sont également étudiées au collisionneur $p\bar{p}$ Tevatron à Fermilab.

Avec le développement de la chromodynamique quantique (QCD) comme théorie microscopique des interactions fortes, des modèles ont été proposés afin de comprendre les interactions diffractives dans ce contexte.

Dans la suite de cette section (voir aussi [27]), nous présentons les mesures des sections efficaces diffractives inclusives réalisées à HERA. Nous décrivons ensuite deux approches permettant de comprendre les interactions diffractives en termes partoniques: l'approche de la fonction de structure du pomeron et l'approche des fluctuations du photon en un système partonique. Finalement, nous utilisons ces deux approches pour décrire les études inclusives et semi-inclusives de l'état final des interactions diffractives à HERA.

2.2.3.1 Fonction de structure F_2^D

Beaucoup d'efforts sont accomplis à HERA pour mesurer avec précision la section efficace inclusive de production diffractive. Pour ce type d'interactions, l'état final hadronique (système $\gamma^{(*)}p$) est divisé en deux sous-systèmes de masses plus petites, le système X (de masse M_X) venant de la dissociation du photon et le système Y (de masse M_Y) venant de la dissociation du proton (voir figure 2.9). Ces deux systèmes sont séparés par un saut en pseudo-rapidité significativement plus grand que celui provenant habituellement de la fluctuation de la densité de particules lors du processus d'hadronisation dans les interactions non-diffractives. L'échange est donc attribué à un objet singlet de couleur, reggeon ou pomeron.

Dans le cas où le proton dans l'état final reste intact, $ep \to eXp$, l'interaction est définie par les grandeurs Q^2, t, β et $x_{I\!P}$ (ainsi que par l'angle entre les plans de diffusion de l'électron et du proton, qui n'est généralement pas mesuré). Les variables $x_{I\!P}$ et β sont définies par:

$$x_{I\!P} \simeq \frac{Q^2 + M_X^2}{Q^2 + W^2}\,, \qquad \beta \simeq \frac{Q^2}{Q^2 + M_X^2}. \tag{2.28}$$

Dans un référentiel où le proton est en mouvement rapide, la variable $x_{I\!P}$ représente la fraction d'impulsion du proton portée par l'objet échangé (reggeon ou pomeron), β étant la fraction de l'impulsion échangée portée par le quark sondé par le photon. La cinématique impose que, à haute énergie, un saut en pseudo-rapidité soit créé entre le système X et le proton diffusé pour $x_{I\!P} \ll 1$, c'est-à-dire pour $M_X \ll W$.



Figure 2.9: Représentation schématique de la réaction inclusive $ep \to eXY$.

Par analogie avec les interactions de diffusion profondément inélastique non diffractives, et après intégration sur la variable t, la fonction de structure diffractive $F_2^{D(3)}(Q^2, x_{I\!P}, \beta)$ est définie par la relation:

$$\frac{d^3\sigma(ep \to eXp)}{dQ^2 dx_{I\!P} d\beta} = \frac{4\pi\alpha^2}{\beta Q^4}\left(1 - y + \frac{y^2}{2(1+R_D)}\right) F_2^{D(3)}(Q^2, x_{I\!P}, \beta), \tag{2.29}$$

où y est la variable d'échelle $y \simeq W^2/s$ et R_D est le rapport des sections efficaces diffractives longitudinale et transverse [6].

Des méthodes différentes, que nous ne détaillons pas ici, sont utilisées par les collaborations H1 [28, 29] et ZEUS [30, 31] pour mesurer les fonctions de structure diffractives.

L'expérience H1 utilise pour décrire les données une paramétrisation inspirée du modèle de Regge [29]:

$$\begin{aligned} F_2^{D(3)}\,(Q^2, x_{I\!P}, \beta) &= \Phi^{I\!P}(x_{I\!P})\; F_2^{I\!P}(Q^2,\beta) + \Phi^{I\!R}(x_{I\!P})\; F_2^{I\!R}(Q^2,\beta) + \text{interf.} \\ &= x_{I\!P}^{2\,\langle\alpha_{I\!P}\rangle - 1}\; F_2^{I\!P}(Q^2,\beta) + x_{I\!P}^{2\,\langle\alpha_{I\!R}\rangle - 1}\; F_2^{I\!R}(Q^2,\beta) + \text{interf.} \end{aligned} \tag{2.30}$$

Si la factorisation en la variable $x_{I\!P}$ est valable, les facteurs $\Phi^{I\!P}(x_{I\!P})$ et $\Phi^{I\!R}(x_{I\!P})$ peuvent être interprétés comme décrivant respectivement les flux effectifs du pomeron et des reggeons dans le proton, $F_2^{I\!P}(Q^2,\beta)$ et $F_2^{I\!R}(Q^2,\beta)$ décrivant leurs fonctions de structure respectives [7]. Après ajustement de la paramétrisation 2.30 aux données [8], la valeur obtenue pour l'intercept du pomeron est $\alpha_{I\!P}(0) = 1.20 \pm 0.04$, sans dépendance en β ou en Q^2 dans le domaine $0.4 < Q^2 < 75$ GeV^2, l'expérience ZEUS obtenant des résultats comparables [31]. Cette valeur est significativement plus grande que celle mesurée dans le cas des interactions hadron-hadron ($\alpha_{I\!P}(0) = 1.08$, voir relation 2.21). Elle est également supérieure à la valeur obtenue lors de l'analyse des interactions diffractives en photoproduction par l'expérience H1: $\alpha_{I\!P}(0) = 1.07 \pm 0.05$ [33] et par l'expérience ZEUS: $\alpha_{I\!P}(0) = 1.12 \pm 0.09$ [34]. Notons qu'une valeur supérieure à la valeur "soft" est observée pour des valeurs modestes de Q^2 par la

[6] La grandeur R_D n'étant pas encore mesurée, sa valeur est généralement prise égale à zéro. Cette approximation influence peu les résultats pour la mesure de la fonction de structure diffractive $F_2^{D(3)}(Q^2, x_{I\!P}, \beta)$ dans le domaine en y accessible à HERA.

[7] La factorisation a été prouvée à la référence [32] pour les processus profondément inélastiques diffractifs.

[8] Le terme d'interférence entre les échanges du pomeron et des reggeons de l'équation 2.30 n'est pas connu. Cependant, le résultat de l'ajustement aux données est insensible à la valeur de l'interférence utilisée.



Figure 2.10: Interaction diffractive photon-proton: a,c) vue dans le référentiel au repos du proton: le photon fluctue en une paire $q\bar{q}$ (a) ou en un état de Fock $q\bar{q}g$ (c), qui par la suite interagit de manière diffractive avec le proton (le pomeron étant modélisé ici comme un système de deux gluons); b,d) vue dans un référentiel où le proton est en mouvement rapide, le pomeron étant modélisé comme un système $q\bar{q}$, avec un couplage photon−quark (b), ou comme un système gg, avec un couplage photon-quark-gluon (d).

collaboration H1 [35] [9]. Ceci est à mettre en parallèle avec l'observation du changement de comportement de la fonction de structure F_2 avec l'énergie, visible déjà aux petites valeurs de Q^2 (voir figure 2.3).

2.2.3.2 Description partonique

Les interactions diffractives formant une composante fondamentale des interactions hadron-hadron, leur compréhension en terme de partons est un défi pour la théorie des interactions fortes, la chromodynamique quantique. Cette compréhension peut s'envisager selon deux approches différentes: celle de la fonction de structure du pomeron et celle des fluctuations hadroniques du photon. Ces deux approches correspondent à un choix différent du référentiel de l'observateur [10].

L'approche de la fonction de structure du pomeron est obtenue en se plaçant dans un référentiel où le proton est en mouvement rapide. Le pomeron est alors vu comme un objet, singlet de couleur, émis par le proton (figures 2.10b,d). Le photon sonde la structure partonique du pomeron et les équations d'évolution d'Altarelli-Parisi peuvent être utilisées pour décrire l'évolution en Q^2 de la fonction de structure du pomeron.

La figure 2.11 présente les résultats de la collaboration H1 pour la mesure du produit $x_{I\!P}\, F_2^{D(3)}(Q^2, x_{I\!P}, \beta)$ (extrapolé en $x_{I\!P} = 0.003$) en fonction de Q^2 pour différentes valeurs de β [29]. Nous observons une violation de l'invariance d'échelle: pour les petites valeurs de β, la fonction de structure diffractive augmente avec Q^2, cette augmentation étant moins forte

[9]Une contribution du pomeron “dur” pour des valeurs modestes de Q^2 a été proposée [7].

[10]Dans un calcul semi-classique, Hebecker [36] a montré que ces deux approches sont équivalentes dans le cas de l'émission d'un gluon “soft” par la paire $q\bar{q}$ issue du photon (état de Fock $q\bar{q}g$).



Figure 2.11: Mesures de $x_{\mathbb{P}}\ F_2^{D(3)}(Q^2, x_{\mathbb{P}}, \beta)$, extrapolées pour $x_{\mathbb{P}} = 0.003$, en fonction de Q^2 pour différentes valeurs de β, obtenues par la collaboration H1 [28]. Les courbes superposées aux données représentent les résultats de l'ajustement des équations d'Altarelli-Parisi obtenus en utilisant à l'échelle de départ de l'évolution ($Q_0^2 = 3$ GeV^2) soit une contribution uniquement quarkonique (a), soit une contribution quarkonique et gluonique (b).

pour les grandes valeurs de β [11]. Les équations d'Altarelli-Parisi sont ajustées aux données pour les deux contributions de l'équation 2.30. La contribution du reggeon est paramétrisée en utilisant la fonction de structure du pion, et deux cas différents sont considérés pour la fonction de structure du pomeron. Dans le premier cas, seuls les quarks contribuent à l'échelle de départ de l'évolution $Q_0^2 = 3$ GeV^2 ("fit 1"), donnant une description médiocre des données ($\chi^2/ndf = 314/159$, courbes de la figure 2.11a). Dans le second cas, les gluons contribuent également à l'échelle $Q_0^2 = 3$ GeV^2 ("fit 3"), donnant une bonne description des données ($\chi^2/ndf = 176/154$, courbes de la figure 2.11b). Les distributions de partons du pomeron correspondant au meilleur ajustement obtenu ("fit 3") peuvent alors être extraites. La composition partonique du pomeron est dominée à $\gtrsim 80$ % par les gluons pour le domaine en Q^2 considéré. La collaboration ZEUS a effectué des études similaires en incluant également dans les ajustements les données de photoproduction diffractive de jets de particules, et trouve également que les gluons dominent la structure partonique du pomeron [37].

Ces études ont l'avantage de donner une bonne description des mesures expérimentales

[11]Notons que la dépendance en Q^2 de la fonction de structure diffractive observée aux grandes valeurs de β est différente de celle de la fonction de structure du proton $F_2(Q^2, x)$. En effet, aux grandes valeurs de la variable de Bjorken $x \gtrsim 0.2$, la fonction de structure du proton diminue quand Q^2 augmente. On observe par contre la dépendance inverse en Q^2 de la fonction de structure diffractive, même à des valeurs de $\beta \simeq 0.65$.

en utilisant des hypothèses simples, dont les résultats peuvent être facilement implémentés dans un programme de simulation par Monte-Carlo. Ceci permet par la suite de tester les hypothèses faites, en effectuant des analyses inclusives ou semi-inclusives de l'état final hadronique des interactions diffractives (voir section 2.2.3.3).

La seconde approche consiste à se placer dans le référentiel du proton au repos. A haute énergie, le photon fluctue en un système partonique ($q\bar{q}$, $q\bar{q}g$, etc.) bien avant son interaction avec le proton (figures 2.10a,c). Ce système est en mouvement rapide et les états de Fock correspondant apparaissent donc comme "gelés" pendant l'interaction dure. La section efficace diffractive est calculée comme la convolution de trois facteurs correspondant respectivement à la structure partonique du photon, à l'interaction diffractive entre cette fluctuation et le proton et finalement à la recombinaison des partons dans l'état final et à l'hadronisation:

$$\sigma(\gamma p \to XY) = \sum_{q\bar{q},q\bar{q}g,...} \int d^2b_T \; \Psi(\gamma \to q\bar{q},...) \; \sigma(q\bar{q},...+p \to q\bar{q},...+p) \; \Psi(q\bar{q},... \to hadrons). \tag{2.31}$$

Ces calculs sont généralement effectués dans l'espace du paramètre d'impact (b_T), et seuls les premiers états de Fock ($q\bar{q}$, $q\bar{q}g$) sont considérés. Le pomeron est paramétrisé comme un système de deux gluons ou une échelle de Lipatov, de sorte que le système soit neutre de couleur et de saveur. Nous reviendrons à cette approche à la section 2.3.2 dans le cas particulier de la production diffractive de mésons vecteurs.

Notons finalement que la présence d'événements possédant un grand saut en pseudo-rapidité peut s'expliquer également sans faire référence au concept de diffraction ou d'échange de pomeron. Dans ce cas, comme pour les interactions profondément inélastiques, un quark est éjecté du proton par le photon. La propagation de ce quark dans le champ de couleur du proton est accompagnée par la radiation de gluons "soft". Celle-ci modifie les propriétés de couleur du système de l'état final, menant pour une fraction des événements à la neutralisation de couleur, c'est-à-dire à la formation de deux systèmes neutres de couleur séparés par un saut en pseudo-rapidité [38, 39].

2.2.3.3 Etudes de l'état final

Les collaborations H1 et ZEUS ont mené de nombreuses études sur les caractéristiques inclusives et semi-inclusives de l'état final des interactions diffractives. Ces études permettent d'une part de comparer, indépendamment des modèles, les caractéristiques des événements diffractifs avec ceux d'autres processus et d'autre part de confronter aux données les modèles implémentés dans les simulations par Monte-Carlo.

Pour les interactions avec saut en pseudo-rapidité, trois types différents de modèles ont été implémentés dans des simulations par Monte-Carlo et sont repris sous les noms de RAPGAP [40], POMPYT [41] et LEPTO [39]. Le programme RAPGAP est basé sur l'idée d'un flux de pomeron factorisable et utilise les distributions de partons dans le pomeron qui évoluent selon les équations d'Altarelli-Parisi, une fois leurs distributions données à l'échelle de départ Q_0. Les prédictions de RAPGAP sont utilisées pour tester la sensibilité des caractéristiques de l'état final aux distributions de partons obtenues à l'échelle Q_0 par les ajustements sur les sections efficaces diffractives totales (voir section 2.2.3.1). La simulation

POMPYT décrit les interactions diffractives en photoproduction par échange du pomeron. La simulation LEPTO 5.1 implémente le concept de radiation de gluons "soft" dans le cadre du modèle de fragmentation de Lund. Comparé à la simulation décrivant les interactions profondément inélastiques non-diffractives, le seul paramètre ajustable dans LEPTO 5.1 est la quantité de radiation de gluons "soft".

Pour les interactions diffractives, deux topologies principales peuvent être distinguées au niveau des partons: les états finals à deux et à trois corps. Les deux schémas du haut de la figure 2.10 correspondent à un état final à deux corps $q\bar{q}$ et se caractérisent par une structure en deux jets de particules du système X alignés selon l'axe photon-pomeron. En effet, les fluctuations du photon en une paire $q\bar{q}$ possédant de grandes impulsions transverses (figure 2.10a) sont défavorisées à cause des effets de transparence de couleur [12]. Par contre, les deux schémas du bas de la figure 2.10 correspondent à un état final à trois corps $q\bar{q}g$, caractérisé par une interaction octet-octet de couleur. En effet, pour le schéma 2.10c la paire $q\bar{q}$ et le gluon "soft" sont des octets de couleur. Il en est de même pour le schéma 2.10d, entre la paire $q\bar{q}$ et les débris du pomeron. L'interaction octet-octet entre les hémisphères avant et arrière induit une activité plus importante (flux d'énergie, multiplicité de particules) dans la région centrale, comparé aux interactions de couleur triplet-triplet des diagrammes 2.10a,b supposées ressembler davantage aux interactions e^+e^-.

Les analyses inclusives de l'état final hadronique des interactions diffractives effectuées par les collaborations H1 [42] et ZEUS [43] comprennent l'étude de la topologie de l'état final, les distributions en impulsion transverse des particules chargées, ainsi que des études de la multiplicité et de la répartition du flux d'énergie. Des études semi-inclusives de l'état final hadronique des interactions diffractives sont également menées par les collaborations H1 [44] et ZEUS [45], comprenant l'étude des événements avec un ou plusieurs jets de particules de grande impulsion transverse par rapport à l'axe des faisceaux, ainsi que l'étude des interactions diffractives avec production de particules charmées dans l'état final.

L'ensemble de ces analyses aboutit à des conclusions concordantes concernant la structure partonique du pomeron. En effet, comparées aux interactions e^+e^-, les interactions diffractives se caractérisent par des valeurs plus grandes du "thrust" [13] moyen, un flux d'énergie et une multiplicité de particules chargées plus importants dans la partie centrale, ainsi que par une corrélation plus forte entre les hémisphères avant et arrière. Ces différences sont attribuées à une radiation de partons plus importante pour les interactions diffractives que pour les interactions e^+e^-. Ceci suggère que les interactions diffractives procèdent selon la configuration octet-octet contrairement à la configuration triplet-triplet des interactions e^+e^-. L'importance du rôle des gluons dans les interactions diffractives est confirmée par la comparaison des données avec les prédictions de la simulation RAPGAP. En effet, l'ensemble des caractéristiques des données est bien reproduit par la simulation RAPGAP lorsque la

[12] La fluctuation du photon en une paire $q\bar{q}$ de grandes impulsions transverses correspond, par le principe d'incertitude, à une topologie où la distance transverse entre les quarks est petite. Ceux-ci s'écrantent alors mutuellement, formant un système neutre de couleur lors de son interaction avec le proton, et la section efficace de cette topologie est faible.
La présence d'une divergence colinéaire pour des quarks de masse nulle contribue également à expliquer la dominance des configurations longitudinales.

[13] Dans le système du centre de masse d'un ensemble X de N particules, la valeur maximale de la variable "thrust", $T = 1$, est obtenue dans le cas d'une configuration colinéaire des particules du système X, et la valeur minimale $T = 0.5$ est obtenue pour une configuration isotropique des particules du système X (avec $N \to \infty$).

fonction de structure du pomeron est dominée par des gluons, en accord avec les résultats des ajustements sur les mesures des sections efficaces totales diffractives, alors que ces caractéristiques sont mal reproduites dans le cas du pomeron modélisé, à l'échelle de départ, comme un système $q\bar{q}$.

Il faut noter que les caractéristiques de l'état final hadronique sont également bien décrites par la simulation LEPTO. Ceci est en accord avec le rôle important joué par les gluons pour les événements avec un grand saut en pseudo-rapidité, puisque sont implémentées dans la simulation les fonctions de distribution de partons dans le proton, qui possèdent une contribution importante des gluons à petit x.

2.3 Modèles de la production diffractive de mésons vecteurs

Cette section présente une description générale des modèles de la production diffractive de mésons vecteurs. Nous introduisons d'abord le modèle de la dominance mésovectorielle. Nous introduisons ensuite les modèles basés sur la théorie des interactions fortes QCD et insistons sur ceux de Royen et Cudell [46], de Martin, Ryskin et Teubner [47] et d'Ivanov et Kirschner [48], dont les prédictions seront comparées par la suite à nos résultats.

2.3.1 Analogie photon-hadron et dominance mésovectorielle

On observe expérimentalement (voir par exemple [49]) plusieurs analogies entre les interactions photon-hadron et les interactions hadron-hadron:

• le comportement de la section efficace photon-nucléon est similaire à celui de la section efficace hadron-nucléon: formation de résonances à basse énergie et, au-dessus de quelques GeV, section efficace presque constante en s. Cependant la section efficace photon-nucléon est inférieure d'un facteur α (constante de structure fine $\alpha = e^2/4\pi$) à celle des processus hadron-nucléon;

• comme pour la section efficace hadron-nucléon, on observe pour les interactions photon-hadron une contribution diffractive importante: la production de mésons ρ et aussi ω et ϕ;

• les sections efficaces de diffusion γp et γn sont très semblables. En première approximation, l'interaction ne dépend donc pas de la charge de la particule cible;

• comme pour les interactions hadron-noyau, des phénomènes de "shadowing" [14] sont observés dans le cas des interactions de photons sur noyaux.

Ces observations ont conduit à décrire le photon physique, tel qu'il se manifeste dans les interactions avec la matière, comme une superposition d'états hadroniques [15] possédant les

[14]Dans les interactions hadron-noyau, en raison de la grande section efficace d'interaction, les nucléons disposés sur la surface du noyau exposée au faisceau de hadrons absorbent la plus grande partie de l'onde incidente, projetant ainsi une "ombre" sur les nucléons situés à l'intérieur du noyau. La section efficace totale d'interaction sur noyau complexe est donc plus faible que la somme des sections efficaces d'interaction sur tous les nucléons.

[15]On néglige la composante électronique car elle connaît une section efficace plus faible d'un facteur α que la composante hadronique.

mêmes nombres quantiques que lui: $J^{PC} = 1^{--}$ (Q=B=S=0) [49, 50] ce qui, d'un point de vue quantique, implique a priori la possibilité d'un mélange. Le photon physique $| \widehat{\gamma} >$ peut être modélisé au premier ordre comme la somme d'une composante "nue" $| \gamma >$ et d'une composante hadronique $| h >$:

$$| \widehat{\gamma} >=| \gamma > +\sqrt{\alpha}| h > . \tag{2.32}$$

Dans le modèle à dominance mésovectorielle (VDM) ne sont considérées, parmi les fluctuations hadroniques du photon, que celles correspondant aux mésons vecteurs les plus légers: les mésons $\rho(770)$, $\omega(783)$ et $\phi(1020)$, regroupés sous le symbole V. Dans ce modèle, le courant électromagnétique est identifié à une superposition de champs:

$$J_\mu^{em} = \sum_V \frac{m_V^2}{f_V} V_\mu, \tag{2.33}$$

où la sommation porte sur les mésons vecteurs V, identifiés au champ V_μ, de masse m_V, f_V étant la constante de couplage au photon, mesurée dans les désintégrations purement leptoniques du méson V de largeur Γ_V:

$$\Gamma_V(V \rightarrow e^+e^-) = \frac{4\pi}{3}\alpha^2\frac{m_V}{f_V^2}. \tag{2.34}$$

Le modèle fait l'hypothèse que les amplitudes de diffusion impliquant un photon (réel ou virtuel) $\gamma N \rightarrow X$ sont égales aux amplitudes correspondantes pour les mésons vecteurs réels: $VN \rightarrow X$, à un propagateur près. Dès lors, l'amplitude d'interaction entre un photon (réel ou virtuel) et un hadron A peut s'écrire comme combinaison linéaire des amplitudes correspondantes pour les mésons vecteurs, chacune étant multipliée par son propagateur:

$$T_{\gamma A\rightarrow B}(Q^2, s, t) = \sum_V \frac{e}{f_V} \left(\frac{m_V^2}{m_V^2 + Q^2}\right) T_{VA\rightarrow B}(s, t), \tag{2.35}$$

où Q^2 est l'opposé du carré de la quadri-impulsion portée par le photon. A une énergie de quelque GeV et $Q^2 \simeq 0$, les trois mésons vecteurs les plus légers (ρ, ω et ϕ) rendent compte de l'ordre de 80 % de la composante hadronique du photon.

Dans ce modèle, le rapport des sections efficaces de production de mésons vecteurs par des photons longitudinaux et transverses, $R = \sigma_L/\sigma_T$, est proportionnel à Q^2:

$$R = \frac{\xi Q^2}{m_V^2} \tag{2.36}$$

(pour les événements de photoproduction ($Q^2 = 0$), les photons sont purement transverses et la section efficace longitudinale σ_L est nulle, ainsi que R). Le paramètre ξ est un paramètre libre de la théorie, à déterminer par l'expérience.

2.3.1.1 Dominance mésovectorielle et production de mésons ρ

Le modèle à dominance mésovectorielle a été appliqué par Donnachie et Landshoff au cas particulier de la production diffractive de mésons ρ [51]. A HERA ($ep \rightarrow ep\rho$), pour le cas de la photoproduction ($Q^2 \simeq 0$), leur approche est essentiellement dépourvue de paramètres libres. L'interaction avec le proton est décrite par l'échange d'un pomeron "soft", d'intercept $\alpha_{I\!P}(0) = 1.08$. La formule 2.35 (avec $Q^2 \simeq 0$) du modèle VDM donne, avec l'équation 2.9, pour la section efficace à l'avant:

$$\left.\frac{d\sigma}{dt}\right|_{t=0} = \frac{e^2}{f_\rho^2} \left.\frac{d\sigma}{dt}\right|_{t=0} (\rho p \to \rho p) = \frac{1}{16\pi} \frac{e^2}{f_\rho^2} \left(1+\alpha^2\right) \sigma_{tot}^2. \tag{2.37}$$

Suivant le modèle additif des quarks, l'amplitude $\rho p \to \rho p$ est estimée en prenant la moyenne des amplitudes de production $\pi^+ p \to \pi^+ p$ et $\pi^- p \to \pi^- p$. En utilisant les résultats des ajustements de l'équation 2.20 sur les sections efficaces totales $\pi^- p$ et $\pi^+ p$, la section efficace totale pour la diffusion ρp est, en millibarns:

$$\sigma_T(\rho p) = 13.6\ s^{0.08} + 31.8\ s^{-0.45}. \tag{2.38}$$

La dépendance en l'énergie du modèle décrit assez bien les données de photoproduction de mésons ρ, bien que la normalisation prédite soit trop haute d'environ 20 %.

2.3.1.2 GVDM et le modèle de Schildknecht, Schuler et Surrow

Le modèle à dominance mésovectorielle a été généralisé pour inclure les résonances plus massives $\rho(1600)$, J/ψ, Υ, ... et par extension, l'ensemble du spectre de masse des mésons vecteurs ("Generalised Vector Meson Dominance", GVDM) [52].

Ce modèle a été utilisé récemment par Schildknecht, Schuler et Surrow [53] afin de décrire la section efficace de production de mésons ρ et ϕ. Les auteurs considèrent une somme continue sur le spectre de masse, entraînant des interférences destructives entre états voisins. Ceci a pour conséquence de modifier la valeur de la masse m_V dans l'équation 2.35, avec l'apparition de masses effectives longitudinale et transverse: $m_T, m_L < m_V$.

Schildknecht, Schuler et Surrow proposent pour l'amplitude de production de mésons ρ:

$$A_T[\gamma^* p \to \rho p](W^2, Q^2, t=0) = m_T^2 \int_{m_T^2} \frac{dm^2}{(Q^2\ + m^2)^2} A[\gamma p \to \rho p](W^2, t=0), \tag{2.39}$$

$$A_L[\gamma^* p \to \rho p](W^2, Q^2, t=0) = \xi m_L^2 \int_{m_L^2} \sqrt{\frac{Q^2}{m^2}} \frac{dm^2}{(Q^2\ + m^2)^2} A[\gamma p \to \rho p](W^2, t=0). \tag{2.40}$$

Ces formules sont valables à haute énergie et pour $t = 0$. Le modèle prédit la dépendance en Q^2 des sections efficaces longitudinale et transverse, et donc celle du rapport R. Celui-ci tend vers une valeur constante aux grandes valeurs de Q^2:

$$R(W^2, Q^2) \to \frac{\pi^2}{4} \xi^2 \frac{m_L^4}{m_T^4} \quad \text{pour } Q^2 \to \infty. \tag{2.41}$$

Ce résultat est en constraste avec la dépendance linéaire en Q^2 pour le rapport R de la prédiction 2.36. Le modèle possède quatre paramètres libres: les masses effectives m_T et m_L, le paramètre ξ et la section efficace de photoproduction (à $Q^2 = 0$) $\sigma(W^2)$ $[\gamma p \to \rho p]$.

Après ajustement de la dépendance en Q^2 de la section efficace $\gamma^* p \to \rho p$ et du rapport R sur les données de l'expérience ZEUS, les paramètres obtenus sont:

$$\xi = 1.06, \quad m_T^2 = 0.68\ m_\rho^2, \quad m_L^2 = 0.71\ m_\rho^2, \quad \sigma\ [\gamma p \to \rho p] = 11\ \mu b. \tag{2.42}$$

Ces paramètres mènent à la prédiction $R \to 2.5$ pour $Q^2 \to \infty$, qui est un peu basse comparée aux données (voir par exemple [2]). En fait, les données de la collaboration ZEUS contraignent peu les paramètres 2.42 lors de l'ajustement. Une autre possibilité est de fixer $\xi = 1$, $m_L^2 = 1.5\ m_T^2$ (correspondant à $R \to 5.5$ pour $Q^2 \to \infty$), et de procéder à un ajustement à deux paramètres libres. Les valeurs obtenues sont:

$$m_T^2 = 0.62\ m_\rho^2, \quad \sigma\,[\gamma p \to \rho p] = 11\ \mu b, \quad (\xi = 1.0, \quad m_L^2 = 1.5\ m_T^2). \tag{2.43}$$

Les valeurs du rapport χ^2/nombre de degrés de liberté des ajustements 2.42 et 2.43 sont semblables.

Les prédictions du modèle de Schildknecht, Schuler et Surrow sont comparées aux résultats de notre travail pour la dépendance en Q^2 du rapport R (voir section 7.6.3) et pour la dépendance en Q^2 de la section efficace $\gamma^* p \to \rho p$ (voir section 8.3).

2.3.2 Modèles basés sur la chromodynamique quantique

Dans cette section, nous reprenons les idées importantes et les approximations qui sont à la base de la description de la production diffractive de mésons vecteurs par la théorie des interactions fortes, la chromodynamique quantique (QCD). Celle-ci est une théorie de gauge avec liberté asymptotique: la constante de couplage des interactions fortes $\alpha_s(Q^2)$ est asymptotiquement nulle aux grandes valeurs de Q^2, c'est-à-dire aux petites distances $\lambda \propto 1/Q$.

Afin de pouvoir utiliser la technique du développement perturbatif en puissances de α_s pour résoudre les équations de la théorie QCD, il est nécessaire de posséder une échelle "dure". Il est concevable de calculer la production de mésons vecteurs dans une approche perturbative de la théorie QCD dans les cas suivants [16]: le domaine cinématique des grandes valeurs de Q^2, des grandes valeurs de $|t|$ ou encore des grandes valeurs de la masse des quarks constituant le méson vecteur; Q^2, t ou m_V définit l'échelle de l'interaction.

Toutefois l'interaction $ep \to ep\rho$ fait intervenir des hadrons: les protons incident et diffusé et le méson vecteur dans l'état final. La description de tels états liés de quarks et de gluons est non-perturbative, c'est-à-dire n'est pas calculable par un développement en série, et doit être décrite par une approche phénoménologique.

Il est donc nécessaire de séparer la physique à petite distance (interaction "dure" qui peut être décrite perturbativement) de celle à grande distance (interaction "soft" qui ne peut être calculée perturbativement). Ceci est possible grâce à l'utilisation du théorème de factorisation démontré par Collins, Frankfurt et Strikman [59]. On peut en effet montrer que, aux grandes valeurs de Q^2 et en négligeant la masse des quarks, les sections efficaces diffractives s'écrivent comme une convolution en z (la fraction d'impulsion longitudinale) d'une fonction de structure, d'un coefficent "dur" et d'une fonction d'onde du méson vecteur. Le théorème est vrai quelle que soit la masse du méson vecteur. Les fonctions de structure sont non-diagonales (pour t non nul) et tendent vers le carré de la densité des gluons $(xg(x))^2$ dans le cas longitudinal.

[16] Notons que différentes idées ont été avancées afin de décrire la production de mésons vecteurs dans un cadre non-perturbatif de la théorie QCD; elles sont reprises aux références [54, 55, 56, 57, 58].



Figure 2.12: Visualisation de la production d'un méson vecteur, dans le référentiel du proton au repos. A haute énergie, il y a factorisation: le photon fluctue en une paire $q\bar{q}$ bien avant son interaction avec le proton, caractérisée par un temps très court, et le système partonique se recombine en un méson vecteur bien après son interaction avec le proton.

Dans le référentiel du proton au repos, la production diffractive de mésons vecteurs peut être décrite selon la séquence temporelle suivante: le photon virtuel fluctue en un système partonique dont l'état le plus simple est une paire $q\bar{q}$ formant un dipôle, sur une distance l_c donnée par le principe d'incertitude:

$$l_c = \frac{1}{E_V - \nu} = \frac{E_V + \nu}{E_V^2 - \nu^2} \simeq \frac{2\nu}{m_V^2 + Q^2} \simeq \frac{1}{m_N x} \tag{2.44}$$

pour $Q^2 \gg m_V^2$, E_V et ν étant respectivement les énergies du méson vecteur et du photon, m_N la masse du nucléon cible et x la variable de Bjorken. A haute énergie (petites valeurs de x), la distance l_c est beaucoup plus grande que la taille caractéristique du nucléon cible. L'interaction entre le système partonique issu du photon et le proton a alors lieu sur une échelle de temps court, caractéristique des interactions dures. Enfin, le système partonique diffusé se recombine en un méson vecteur, bien après son interaction avec le proton sur une échelle de temps caractéristique des processus d'hadronisation "soft", compte tenu de la dilatation relativiste du temps.

Les physiques à grande et petite distances sont alors séparées et le calcul de l'amplitude de la production de mésons vecteurs peut être factorisé (voir figure 2.12). Pour les trois processus sont utilisées respectivement: la fonction d'onde ψ^γ donnant l'amplitude de la fluctuation du photon en un système partonique, typiquement une paire $q\bar{q}$, l'amplitude T de diffusion de la paire $q\bar{q}$ sur la cible, et la fonction d'onde ψ^V donnant l'amplitude pour la paire $q\bar{q}$ de former un méson vecteur:

$$\mathcal{M} \propto \psi^\gamma(q\bar{q}) \otimes T(q\bar{q} + p) \otimes \psi^V(q\bar{q}). \tag{2.45}$$

L'amplitude T de diffusion de la paire $q\bar{q}$ sur la cible peut être décrite par un développement perturbatif de la théorie QCD, et l'échange singlet de couleur est généralement modélisé par deux gluons ou une échelle de Lipatov. L'amplitude obtenue est supposée proportionnelle au carré de la densité de gluons diagonale c'est-à-dire $(xg(x))^2$. Deux difficultés importantes affectent cependant le calcul: d'une part, déterminer l'échelle à laquelle la densité des gluons est sondée, d'autre part, prendre en compte le fait que la transition est non diagonale en x. Ceci mène à des incertitudes importantes sur les prédictions. Notons que la production



Figure 2.13: Section efficace de production de mésons J/ψ pour $Q^2 \simeq 0$. La droite représente le résultat de l'ajustement aux données de la collaboration H1 (points noirs) [63] de la paramétrisation $\sigma(\gamma p) \propto W^\delta$, avec $\delta = 0.80 \pm 0.10$. Les trois courbes en traits discontinus, pointillés et en traits discontinus et pointillés représentent des prédictions du modèle de Frankfurt, Koepf et Strikman [62] obtenues en utilisant respectivement les paramétrisations GRV(HO), MRS(R2) et CTEQ(4M) pour la densité de gluon dans le proton.

élastique de mésons vecteurs (et les processus diffractifs en général) est plus sensible aux variations de la densité de gluons $xg(x, Q^2)$ que la section efficace inclusive, qui ne dépend que linéairement de celle-ci.

L'un des premiers calculs perturbatifs basés sur la théorie QCD en vue de décrire la production de mésons vecteurs remonte à 1992: Ryskin [60] proposa un calcul pour la production diffractive de mésons J/ψ pour $Q^2 \simeq 0$, la masse du méson J/ψ fournissant une échelle dure ($m_{J/\psi} \gg$ l'échelle de confinement Λ_{QCD}) et la section efficace obtenue étant proportionnelle au carré de la densité de gluons dans le proton. Le modèle prédit que la section efficace longitudinale domine à grand Q^2 et que l'hélicité est conservée, c'est-à-dire que le méson J/ψ dans l'état final est également polarisé longitudinalement. Par la suite, ces calculs ont été étendus à l'ordre supérieur [61] et le comportement de la section efficace transverse a été également prédit [62].

Cette approche a été stimulée par l'observation de la forte augmentation de la section efficace de production de mésons J/ψ en fonction de W (voir figure 2.13). La paramétrisation $\sigma(\gamma p) \propto W^\delta$, ajustée aux données de la collaboration H1 [63], donne pour le paramètre δ la valeur $\delta = 0.80 \pm 0.10$, très différente du comportement de la diffraction "soft", mais en accord avec l'observation de la forte augmentation des fonctions de structure du proton aux petites valeurs de x. La dépendance en l'énergie de la section efficace de production de mésons J/ψ pourrait être une manière efficace de mesurer la densité de gluons dans le proton, mais les incertitudes théoriques importantes continuent à affecter cette démarche.

La même approche à été appliquée à la production de mésons ρ, où l'échelle est cette fois donnée par les grandes valeurs de Q^2. Brodsky et al. [64] et Frankfurt, Koepf et Strikman [65] prédisent le comportement en Q^2 et en W de la section efficace longitudinale pour $t = 0$, Nemchik et al. [66] prédisant également le comportement de la section efficace transverse. L'importance des corrections d'écrantage lors des calculs de la section efficace de production de mésons vecteurs a été étudiée à la référence [67].

L'échelle dure nécessaire pour un développement perturbatif peut être (en plus de Q^2 et de la masse du méson vecteur) également le carré de la quadri-impulsion t transférée au vertex du proton, $|t| \gg \Lambda^2_{QCD}$ [68, 69, 70]. La mesure des sections efficaces à grand $|t|$ souffre actuellement de la faible statistique disponible et aucun résultat significatif n'a été obtenu.

Dans ce qui suit, nous nous concentrons plus particulièrement sur trois modèles utilisant une approche perturbative de la chromodynamique quantique pour discuter la production de mésons ρ. Ces modèles, récemment proposés, sont caractérisés par le fait qu'ils tentent de décrire la dépendance en Q^2 du rapport R des sections efficaces longitudinale et transverse. On se rappelle (voir équation 2.36) que ce rapport est prédit comme variant linéairement avec Q^2 dans le modèle à dominance mésovectorielle. C'est aussi le cas pour la plupart des approches basées sur la chromodynamique quantique, alors que les données indiquent que l'augmentation de R avec Q^2 ralentit fortement pour $Q^2 \simeq$ quelques GeV^2 (voir section 7.3.2). La prédiction correcte du comportement du rapport R est donc un défi actuel pour la théorie. Les modèles que nous comparons à nos données sont ceux de Royen et Cudell [46], de Martin, Ryskin et Teubner [47] et d'Ivanov et Kirschner [48] (nous mentionnons également brièvement la paramétrisation de la dépendance en t de la section efficace proposée par Ryskin, Shabelski et Shuvaev [71], qui est comparée à nos résultats à la section 8.1.4).

2.3.2.1 Modèle de Royen et Cudell

Récemment, Royen et Cudell [46] ont proposé un modèle décrivant la production élastique de mésons ρ, ρ', ϕ, J/ψ et ψ', valable à haute énergie et pour $Q^2 \gtrsim$ quelques GeV^2. Néanmoins, le modèle se révèle également capable de reproduire le comportement des sections efficaces pour $Q^2 \simeq 0$. Il concerne donc l'ensemble du domaine cinématique en les variables Q^2 et m_V (m_V étant la masse du méson vecteur).

Les calculs sont effectués à l'ordre le plus bas de la théorie QCD, en utilisant le principe de factorisation à haute énergie: il est supposé qu'il n'y a pas d'échange de gluons "soft" entre le proton et le méson vecteur V. Le diagramme de l'interaction est présenté à la figure 2.14. La production diffractive de mésons vecteurs est calculée en utilisant l'état de Fock le plus bas ($q\bar{q}$) du photon, convolué avec l'amplitude d'interaction "dure" de la paire $q\bar{q}$ avec le proton. L'échange singlet de couleur est modélisé par deux gluons, les quarks issus du photon se voient attribuer une masse constituante m_q non nulle. Un facteur de forme du proton est utilisé.

La transition $q\bar{q} \to V$ est décrite par la fonction de vertex du méson vecteur ϕ_V. Notons que cette fonction est différente de la fonction d'onde du méson vecteur ψ_V de l'équation 2.45



Figure 2.14: Diagrammes pour la production diffractive de mésons ρ, utilisés dans le modèle de Royen et Cudell [46].

dans le sens où elle n'inclut pas de propagateur de quark, ce qui permet de considérer explicitement le comportement de ces derniers [17]. La fonction de vertex est paramétrisée selon la forme: $\phi_V(l) = Ne^{-L^2/(2p_F^2)}$, où $l \pm V/2$ sont les quadri-impulsions portées par le quark et l'antiquark, L étant la tri-impulsion portée par le quark dans le référentiel du méson vecteur au repos. Le facteur de normalisation N est fixé en imposant que le taux de désintégration $V \to e^+e^-$, mesuré expérimentalement, soit reproduit. La variable p_F représente l'impulsion de Fermi des quarks constituant le méson vecteur.

Le calcul comprend une intégration sur la quadri-impulsion l (boucle du haut de la figure 2.14) et une deuxième intégration sur la quadri-impulsion k portée par les gluons échangés dans l'interaction (boucle du bas de la figure 2.14). Pour l'intégration sur la variable k, l'amplitude possède une singularité infra-rouge (proportionnelle à $1/k_t^2$, k_t étant l'impulsion transverse du quark par rapport à la direction du photon) qui est absorbée par la dépendance en k_t^2 venant du facteur de forme du proton. Cependant, l'amplitude possède un pôle pour la valeur $l^2 = (m_q^2 - m_V^2)/4$, m_q étant la masse du quark constituant. Deux contributions sont donc calculées: celle venant de la discontinuité (ou partie imaginaire) et celle venant de la partie principale (ou partie réelle).

Le modèle prédit les dépendances en Q^2 et en t des sections efficaces γ^*p longitudinale et transverse et en particulier leur rapport. Aux petites valeurs de Q^2 le rapport R augmente linéairement avec Q^2, mais pour des valeurs de $Q^2 \simeq 2$ GeV^2, la dépendance devient plus faible et le rapport R atteint une valeur presque constante, $R \simeq 4$ pour $10 \lesssim Q^2 \lesssim 30$ GeV^2.

Dans une version antérieure du modèle [73], l'intégration sur la quadri-impulsion était absente, le méson vecteur étant décrit par la fonction d'onde de Fermi d'impulsion nulle, impliquant que $m_q = m_V/2$, et le calcul de l'amplitude ne considérait que la contribution venant de la discontinuité (partie imaginaire). Le modèle prédisait une dépendance linéaire en Q^2 pour le rapport R. Les auteurs concluent que, afin de reproduire l'aplatissement de la dépendance en Q^2 du rapport R à grand Q^2, il est essentiel de considérer la possibilité pour les quarks de ne pas être sur leur couche de masse et donc d'inclure également la contribution de la partie principale (réelle) dans l'amplitude.

[17]En effet, d'après les auteurs, la structure analytique du propagateur, qui est généralement incluse dans la définition de la fonction d'onde, joue un rôle important afin de reproduire la dépendance correcte du rapport R des sections efficaces longitudinale et transverse.

Si le modèle prédit les dépendances en t et en Q^2 de la section efficace, la dépendance en W n'est par contre pas donnée. Les sections efficaces sont calculées à un facteur de normalisation près, appelé "facteur de Regge", qui est supposé ne dépendre que des variables W et t. Cependant, pour le rapport R, ainsi que pour les rapports des sections efficaces de production de différents mésons vecteurs, cette incertitude disparaît, le modèle donnant une prédiction absolue. La dépendance en Q^2 de la section efficace vient de la boucle d'intégration sur la quadri-impulsion des quarks, à des termes logarithmiques près. La dépendance en t provient du facteur de forme du proton, de la boucle d'intégration sur la quadri-impulsion des quarks et du facteur de Regge.

Les incertitudes du modèle proviennent principalement du choix de la masse des quarks constituants m_q et du choix de l'impulsion de Fermi p_F. Dans le calcul, les valeurs utilisées pour la production diffractive de mésons ρ sont $m_q = 0.3$ GeV et $p_F = 0.3$ GeV.

Les prédictions du modèle de Royen et Cudell sont comparées aux résultats de notre travail pour la dépendance en Q^2 du rapport R (voir section 7.6.1), pour la distribution en t du signal (voir section 8.1.4) et pour la dépendance en Q^2 de la section efficace $\gamma^* p$ (voir section 8.3).

2.3.2.2 Modèle de Martin, Ryskin et Teubner

Martin, Ryskin et Teubner [47] remarquent que, dans le cadre de la théorie QCD et lorsque les calculs des sections efficaces font intervenir la convolution de l'amplitude de diffusion avec la fonction d'onde du méson ρ, la section efficace transverse diminue trop fortement quand Q^2 augmente. A grand Q^2, les valeurs prédites pour le rapport R sont trop grandes.

Ils proposent donc une approche différente pour décrire la production diffractive de mésons ρ à haute énergie et pour $Q^2 \gtrsim 5$ GeV^2. Ils considèrent la production ouverte de paires $u\bar{u}$ et $d\bar{d}$, supposant que dans l'intervalle de masse de la paire $q\bar{q}$ $0.6 < M < 1.05$ GeV, ces dernières ont peu d'alternative à leur combinaison en un méson ρ. La section efficace est obtenue en utilisant la dualité parton-hadron:

$$\sigma(\gamma^* p \to \rho p) \simeq \sum_{q=u,d} \int_{M_a^2}^{M_b^2} \frac{d\sigma(\gamma^* p \to (q\bar{q})p)}{dM^2} dM^2. \tag{2.46}$$

L'interaction est vue de la manière suivante (voir figure 2.15): le photon fluctue en une paire $q\bar{q}$ et celle-ci interagit avec les protons via l'échange de deux gluons ou d'une échelle de gluons (interaction "dure"). Les détails du calcul pour l'interaction "dure" sont donnés à la référence [74]. L'étape de la recombinaison des quarks en un méson ρ n'est pas considérée ou, de manière équivalente, la fonction d'onde du méson ρ est prise égale à 1.

Dans le calcul de l'amplitude, deux intégrations sont effectuées, une première sur la variable K^2 (boucle du haut) (définie ci-dessous) et une deuxième sur la quadri-impulsion l des gluons échangés (boucle du bas). Afin de traiter les régions de singularité infra-rouge, deux paramètres limites $K_0 = 200$ MeV et $l_0^2 = 1.5$ GeV^2 sont utilisés dans le calcul de l'amplitude.



Figure 2.15: Schéma pour la production diffractive de mésons ρ, utilisé dans le modèle de Martin, Ryskin et Teubner [47].

Les sections efficaces longitudinale et transverse sont proportionnelles au carré de la densité de gluons dans le proton à l'échelle:

$$K^2 = z(1-z)Q^2 \; + k_t^2, \tag{2.47}$$

où z et $(1-z)$ sont les fractions d'énergie du photon portées par le quark et l'antiquark et $\pm k_t$ sont les impulsions transverses du quark et de l'antiquark par rapport à la direction du photon virtuel. L'échelle K détermine les distances transverses $b_T \approx 1/K$ typiquement sondées dans le processus.

Le modèle prédit la dépendance en Q^2 et en W des sections efficaces $\gamma^* p$ longitudinale et transverse et en particulier l'évolution du rapport R en fonction de Q^2. Dans le cas de l'approximation du logarithme dominant en $\ln K^2$, pour laquelle la contribution principale dans l'intégration sur l est supposée venir du domaine $l^2 \lesssim K^2$, la prédiction de la dépendance en Q^2 du rapport R se réduit à la relation:

$$R = \frac{\sigma_L}{\sigma_T} \simeq \frac{Q^2}{M^2} \left(\frac{\gamma}{\gamma+1} \right)^2, \tag{2.48}$$

où γ est la dimension anomale du gluon, définie par:

$$\gamma = \frac{d \ln (xg(x, K^2))}{d \ln K^2}. \tag{2.49}$$

Le terme en $\gamma^2/(\gamma+1)^2$ dans l'équation 2.48 a pour effet de diminuer l'augmentation en Q^2 du rapport R aux grandes valeurs de Q^2.

Le modèle ne donne pas de dépendance en t des sections efficaces et celles-ci sont calculées pour $t = 0$. Cependant, afin de pouvoir comparer les prédictions avec les données, les sections efficaces sont intégrées sur t en supposant une dépendance exponentielle décroissante $e^{-b|t|}$ avec $b = 5.5$ GeV^{-2}.

Le modèle est affecté de grandes incertitudes sur la normalisation des sections efficaces. Les incertitudes principales viennent des corrections d'ordres supérieurs et du choix de l'intervalle de masse à considérer autour de la masse du méson ρ. Les corrections d'ordres supérieurs (regroupées sous le terme "facteur K") sont importantes et sont estimées par les auteurs comme pouvant être de l'ordre d'un facteur trois. Les prédictions dépendent faiblement du choix des paramètres limites K_0 et l_0. Cependant, pour le rapport R des sections efficaces longitudinale et transverse, les prédictions sont peu sensibles à ces incertitudes. Les auteurs concluent que la mesure de la dépendance en Q^2 du rapport R est un moyen d'étudier la densité de gluons dans le proton.

Les prédictions du modèle de Martin, Ryskin et Teubner sont comparées aux résultats de notre travail pour la dépendance en Q^2 du rapport R (voir section 7.6.1) et pour les dépendances en Q^2 et en W de la section efficace $\gamma^* p$ (voir sections 8.3 et 8.4 respectivement).

2.3.2.3 Modèle d'Ivanov et Kirschner

La plupart des modèles décrits ci-dessus obtiennent ou supposent la conservation de l'hélicité dans le canal s (hypothèse SCHC), c'est-à-dire que l'hélicité du photon virtuel est la même que celle du méson ρ dans l'état final. Récemment, Ivanov et Kirschner ont calculé, dans le cadre d'un développement perturbatif de la théorie QCD où l'interaction de la paire $q\bar{q}$ avec le proton est modélisée par un échange de deux gluons, l'ensemble des amplitudes d'hélicité $T_{\lambda_\rho \lambda_\gamma}$ pour la production diffractive de mésons ρ (λ_ρ et λ_γ sont respectivement les hélicités du méson ρ et du photon virtuel). Expérimentalement, la polarisation du méson ρ dans l'état final est mesurée à partir des distributions angulaires des deux pions venant de la désintégration du méson ρ (le formalisme mathématique est présenté à la section 7.1). Le résultat principal du modèle d'Ivanov et Kirschner est la prédiction de la violation de l'hypothèse SCHC aux grandes valeurs de Q^2.

Sous l'hypothèse d'échange de parité naturelle (hypothèse NPE, voir section 7.1.3), les amplitudes d'hélicité obéissent à la hiérarchie (pour $Q^2 \simeq 10$ GeV^2 et $W \simeq 100$ GeV):

$$1 > \alpha = \frac{T_{11}}{T_{00}} > \beta = \frac{T_{01}}{T_{00}} > |\delta| = \left|\frac{T_{10}}{T_{00}}\right| > |\eta| = \left|\frac{T_{1-1}}{T_{00}}\right|. \tag{2.50}$$

Les paramètres α, β et δ dépendent de t, Q^2, M et γ, où M est la masse invariante de la paire $q\bar{q}$ et γ est la dimension anomale du gluon. Le paramètre η dépend également de la densité de gluons sondée à l'échelle $Q^2/4$.

Le modèle prédit en particulier la dépendance en t de l'amplitude avec changement d'hélicité T_{01}:

$$\beta = \frac{T_{01}}{T_{00}} \propto \frac{\sqrt{|t|}}{\sqrt{2}Q\gamma}. \tag{2.51}$$

La transition d'un photon virtuel transverse vers un méson ρ longitudinal n'est pas petite pour les conditions cinématiques typiques de HERA et en particulier pour les valeurs de $\langle t \rangle = 1/b$, avec $b \simeq 5$ à 6 GeV^{-2}. Cette amplitude avec changement d'hélicité induit par interférence un effet mesurable dans la distribution de l'angle entre le plan de l'électron diffusé et celui de production du méson. Ces prédictions sont comparées aux résultats de notre analyse à la section 7.6.4.

2.3.2.4 Modèle de Ryskin, Shabelski et Shuvaev

Le modèle de Ryskin, Shabelski et Shuvaev [71] paramétrise la section efficace $d\sigma/dt$ de la production de mésons ρ en utilisant les facteurs de forme du proton et du méson ρ, ainsi que la dépendance en t de l'amplitude $\gamma^* p$, extraite par une formulation à la Regge. L'amplitude $\gamma^* p$ est modélisée par l'échange d'un pomeron effectif caractérisé par la valeur effective $\alpha'_{I\!P} \simeq 0.15$ GeV^{-2}, estimée en utilisant les résultats de calculs perturbatifs. La paramétrisation obtenue pour le paramètre de pente b est:

$$b(t) = \frac{4}{m^2 + |t|} + \frac{2}{m_\rho^2 + Q^2 + |t|} + 2B_P, \tag{2.52}$$

avec $m^2 = 0.71$ GeV^2 et

$$B_P = \alpha'_{I\!P} \ \ln \frac{s \ m_\rho^2}{(Q^2 + m_\rho^2)^2}. \tag{2.53}$$

Les prédictions du modèle de Ryskin, Shabelski et Shuvaev pour la dépendance en t des événements de production diffractive de mésons ρ sont comparées aux résultats de notre analyse à la section 8.1.4. Un calcul similaire a été effectué dans le cadre du formalisme des dipôles [72].

2.4 Résultats expérimentaux antérieurs à ce travail

De nombreuses expériences sur cible fixe ont étudié la production diffractive de mésons vecteurs. Les expériences antérieures à 1978 sont reprises dans la revue [49] et concernent notamment des études de la photoproduction de mésons vecteurs sur hydrogène réalisées au Cambridge Electron Accelerator, au Wilson Synchrotron Laboratory à Cornell, à SLAC (Stanford) et à DESY (Hambourg), l'énergie des photons ν variant entre 2 et 18 GeV. Des études de photoproduction de mésons ρ, ω et ϕ à plus haute énergie ($20 < \nu < 180$ GeV) ont été effectuées à Fermilab (Chicago) [75] et au CERN (Genève) [76].

L'électroproduction et la muoproduction des mésons vecteurs ρ, ω, ϕ pour des valeurs de $Q^2 < 4.7$ GeV^2 ont été étudiées à SLAC [77, 78, 79], DESY [80] et Cornell [81].

Les expériences CHIO à FNAL [82], EMC [83] et NMC [84] au CERN ont étudié la production de mésons ρ et ϕ à plus haute énergie dans les interactions muon-proton, les domaines cinématiques considérés étant $0 < Q^2 < 3$ GeV^2 et $5 < W < 16$ GeV pour l'expérience CHIO, et de l'ordre de $1 < Q^2 < 25$ GeV^2 et $6 < W < 19$ GeV pour les expériences EMC et NMC.

Plus récemment, la production de mésons ρ a été étudiée dans les interactions muon-proton par la collaboration E665 au Tevatron de Fermilab, le domaine cinématique accessible étant $0.15 < Q^2 < 20$ GeV^2 et $9.5 < W < 24$ GeV [85].

Quatre caractéristiques ressortent de l'analyse de la production de mésons ρ par les expériences citées ci-dessus:

- la déformation du spectre de masse $m_{\pi\pi}$ du méson ρ: par comparaison avec une fonction de Breit-Wigner relativiste, un excès et un manque d'événements sont observés respectivement aux petites valeurs ($m_{\pi\pi} < 0.77$ GeV) et aux grandes valeurs ($m_{\pi\pi} > 0.77$ GeV) de $m_{\pi\pi}$ (phénomène de "skewing").

- une faible dépendance en W de la section efficace $\gamma^* p \rightarrow \rho p$ à haute énergie ($W \gtrsim 10$ GeV).

- une dépendance exponentielle décroissante en t de la section efficace, $d\sigma/dt \propto e^{-b|t|}$, aux petites valeurs de $|t|$.

- en première approximation, la conservation de l'hélicité dans le canal s, les amplitudes avec changement d'hélicité contribuant à moins de 15 % de l'amplitude totale aux petites valeurs de $|t|$.

Au début de l'année 1992, les premières collisions électron-proton sont enregistrées au collisionneur HERA, permettant d'étudier la production diffractive de mésons ρ à plus haute énergie (pour des valeurs de $\langle W \rangle$ de l'ordre de 100 GeV), dans un vaste domaine en Q^2.

La photoproduction de mésons ρ a été étudiée à HERA par les expériences ZEUS [86, 87, 88] et H1 [89]. Les résultats de ces études sont en bon accord avec les quatre caractéristiques mentionnées ci-dessus, notamment la faible dépendance de la section efficace $\gamma p \rightarrow \rho p$ en fonction de W. Paramétrisant la dépendance en W de la section efficace par une loi de puissance: $\sigma(\gamma p \rightarrow \rho p) \propto (W/W_0)^\delta$, l'expérience ZEUS obtient la valeur $\delta = 0.16 \pm 0.06$ (stat.) $^{+0.11}_{-0.15}$ (syst.) [87]. Cette valeur est compatible avec l'échange d'un pomeron "soft". En effet, en utilisant l'équation 2.17, on a [18]:

$$\sigma(\gamma p \rightarrow \rho p) \;\propto\; \left(\frac{W}{W_0}\right)^{4(\alpha\langle t\rangle - 1)} \;\propto\; \left(\frac{W}{W_0}\right)^{4\epsilon + 4\alpha'_{\mathbb{P}}\langle t\rangle} , \tag{2.54}$$

En utilisant $1/\langle t\rangle = b \simeq 10$ GeV^{-2} en photoproduction de mésons ρ, $\epsilon = 0.08$ et $\alpha'_{\mathbb{P}} = 0.25$ GeV^{-2}, on obtient la valeur $\delta = 0.22$. La collaboration ZEUS a présenté à une conférence en 1998 une mesure du paramètre $\alpha'_{\mathbb{P}}$, $\alpha'_{\mathbb{P}} = 0.163 \pm 0.035$ GeV^{-2} [88].

Avant l'analyse correspondant à la présente thèse, deux études ont été effectuées par la collaboration H1. La première a utilisé les données récoltées en 1994 dans le domaine cinématique $Q^2 > 8$ GeV^2 et $40 < W < 140$ GeV; la luminosité correspondante était de 2.8 pb^{-1} et le signal de 180 événements (voir table 2.1). La deuxième a utilisé les données récoltées en 1995, pour lesquelles la position nominale du point d'interaction était déplacée de 70 cm vers l'avant du détecteur (direction du proton diffusé), permettant d'étudier le domaine cinématique des petites valeurs de Q^2: $1 < Q^2 < 5$ GeV^2 et $40 < W < 140$ GeV, le signal comprenant de l'ordre de 500 événements, pour une luminosité de 125 nb^{-1} [3].

L'expérience ZEUS a étudié la production diffractive de mésons ρ pour des valeurs de $7 < Q^2 < 25$ GeV^2 et $40 < W < 130$ GeV en analysant les données récoltées en 1993 [90]. Les résultats des analyses des données récoltées en 1995 par le détecteur ZEUS ont été récemment publiés et correspondent à deux domaines cinématiques distincts: d'une part

[18] Nous supposons que la dépendance en W de la section efficace intégrée en t est donnée par la dépendance en W de la section efficace différentielle $d\sigma/dt$ estimée en $t = \langle t\rangle$.

Année	luminosité	domaine cinématique		signal
1994	2.8 pb^{-1}	$Q^2 > 8$ GeV^2	$40 < W < 140$ GeV	180
1995	125 nb^{-1}	$1 < Q^2 < 5$ GeV^2	$40 < W < 140$ GeV	498
1996	3.87 pb^{-1}	$2.5 < Q^2 < 60$ GeV^2	$30 < W < 140$ GeV	1807

Table 2.1: Caractéristiques des données récoltées en 1994, 1995 et 1996 auprès du détecteur H1, utilisées pour l'étude de la production diffractive de mésons ρ. Pour chaque année, la table reprend la luminosité utilisée pour l'analyse, le domaine cinématique accessible et le nombre d'événements présents dans l'échantillon final après avoir appliqué l'ensemble des critères de sélection.

celui des petites valeurs de Q^2: $0.25 < Q^2 < 0.85$ GeV^2 et $20 < W < 90$ GeV, avec 5450 événements correspondant à une luminosité de 3.8 pb^{-1}, d'autre part le domaine $3 < Q^2 < 50$ GeV^2 et $32 < W < 176$ GeV, correspondant à une luminosité de 6.0 pb^{-1} et possédant de l'ordre de 3000 événements [91, 92].

Mentionnons que la production diffractive de mésons vecteurs autres que le méson ρ est également étudiée à HERA. La production de mésons ϕ a été analysée dans le régime de photoproduction [93, 88] et aux grandes valeurs de Q^2 [94, 95, 92, 96]. La collaboration ZEUS a présenté une analyse de la photoproduction de mésons ω [97]. La production diffractive de mésons ρ avec dissociation du proton dans l'état final a été étudiée par les collaborations H1 [96] et ZEUS [88].

A HERA, les expériences H1 et ZEUS étudient également la production diffractive de mésons lourds, en particulier la production de mésons J/ψ pour $Q^2 \simeq 0$ [98, 63, 99] et en électroproduction [2, 91]. Des signaux pour la production diffractive des mésons $\psi(2S)$ [100] et Υ ont également été observés [101, 102].

Chapitre 3

Dispositif expérimental et sélection des événements

Le sujet de cette thèse est l'étude de la production diffractive de mésons ρ : $ep \to ep\rho \to ep\pi^+\pi^-$. Ces événements se caractérisent par un état final composé du proton diffusé, de l'électron diffusé et de deux pions provenant de la désintégration du méson ρ. Nous sélectionnons les interactions élastiques, c'est-à-dire celles où le proton reste intact dans l'état final. De plus, comme il est peu dévié de sa trajectoire initiale, il n'est pas détecté et reste dans le tube à vide. Nous observons donc dans le détecteur un électron et deux pions de charges opposées.

Dans ce chapitre, le collisionneur HERA et le détecteur H1 sont présentés brièvement. Ensuite, l'accent est mis sur les parties du détecteur importantes pour la sélection des événements. Le détecteur de traces central est décrit d'abord, ainsi que les critères de sélection des événements à deux traces. La sélection des événements avec $Q^2 \gtrsim 1$ GeV^2, utilisant la partie arrière du détecteur, est ensuite présentée. Pour sélectionner les événements de production élastique de mésons ρ, les détecteurs avant sont utilisés comme veto. Nous expliquons ensuite le système de déclenchement de l'acquisition des événements et détaillons les déclencheurs utilisés pour notre travail. Finalement nous expliquons le calcul de la luminosité.

3.1 Le collisionneur HERA

Le collisionneur HERA (Hadron Elektron Ring Anlage) [103] est le premier collisionneur positrons-protons (ou électrons-protons)[1]. Il est entré en fonctionnement fin 1992 et est situé à Hambourg sur le site de DESY (Deutsche Elektron SYnchrotron). L'énergie des

[1]Le collisionneur HERA peut fonctionner dans les deux modes électron-proton et positron-proton. Depuis 1994, le faisceau d'électrons a été remplacé par un faisceau de positrons permettant d'accéder à une plus grande luminosité, le temps de vie du faisceau de positrons étant plus long que celui des électrons. Ceci est dû au fait que les électrons interagissent avec les ions positifs restant dans le tube à vide, alors que les positrons les repoussent.

Paramètre	Unité	val. nominale e^-/p	1995 e^+/p	1996 e^+/p
Circonférence	m	6336		
Points d'interactions		4		
Nombres maximum de paquets		210/210		
Energies nominales	GeV	30/820	27.54/820.8	27.57/821.7
Courants moyens	mA	58/163	18/54	21/60
Séparation des paquets	ns	96	96	96
Luminosité de HERA	nb^{-1}	10^5	10848	15605
Luminosité utile pour H1	nb^{-1}	-	5466	9605

Table 3.1: Les paramètres de l'accélérateur HERA.

faisceaux d'électrons[2] et de protons est respectivement de 27.5 et 821 GeV, l'énergie dans le centre de masse *ep* étant de 300 GeV. Les paramètres principaux de l'accélérateur HERA sont repris à la table 3.1, qui compare les valeurs nominales à celles obtenues en 1995 et 1996.

Les particules sont accélérées dans un complexe d'accélération en chaîne (figure 3.1). Les électrons et les protons sont accélérés d'abord par des pré-accélérateurs linéaire (LINAC) et circulaires (DESY II, DESY III, PETRA). Ensuite, les électrons et protons sont injectés dans HERA à la sortie de l'accélérateur PETRA, avec des énergies respectivement de 12 et 40 GeV. Les deux anneaux de HERA sont disposés dans un tunnel souterrain quasi-circulaire de 6.3 km de circonférence, situé à environ 20 m sous le niveau du sol. Les deux tubes à vide, l'un pour les électrons, l'autre pour les protons, se croisent en quatre points d'interaction. Dans deux de ces sites sont situés les détecteurs des expériences H1 et ZEUS.

Les particules chargées sont accélérées dans une série de cavités radio-fréquence (classiques et supraconductrices) et sont guidées par un ensemble d'aimants dipolaires et quadrupolaires (supraconducteurs dans le cas des protons). Dans le cas des électrons, les cavités radio-fréquence ont également pour rôle de compenser la perte d'énergie par rayonnement synchrotron. Cette perte d'énergie est négligeable pour le faisceau de protons.

Les faisceaux sont constitués de paquets de particules dont la fréquence de croisement est de 10.4 MHz, c'est-à-dire que 96 ns séparent deux interactions (représentant environ une distance de 29 m entre deux paquets). Ce faible intervalle de temps engendre des contraintes sur le temps de réponse des détecteurs et sur le système d'acquisition des données. La plupart des paquets de particules d'un faisceau sont appariés à un paquet de particules de l'autre faisceau, de façon à ce qu'ils se croisent au centre du détecteur. Un petit nombre de paquets restent toutefois non-appariés; ils sont appelés paquets pilotes et permettent d'estimer la probabilité d'interaction des faisceaux avec le gaz résiduel présent dans le tube à vide. Durant l'année 1996, il y avait 175 paquets appariés, 20 paquets pilotes (dont 14 pour les électrons et 6 pour les protons) et 25 paquets vides. Les paquets d'électrons ont une dispersion longitudinale par rapport à l'axe des faisceaux de l'ordre de 2.5 cm (0.08 ns). Les paquets de protons ont une structure longitudinale plus compliquée: en plus d'un pic

[2]Dans cette thèse, nous utilisons le nom générique de faisceau d'électrons pour décrire le faisceau d'électrons (condition de fonctionnement avant 1994) et le faisceau de positrons (condition de fonctionnement de 1994 à 1997).



Figure 3.1: Le complexe d'accélération en chaîne de DESY [103].

central, il existe des pics "satellites" situés à $\pm$ 4.8 ns et à $\pm$ 19.2 ns [104]. Généralement, seules les interactions correspondant au pic principal des paquets de protons sont utilisées pour l'analyse physique. Cependant le système de luminosité, basé sur la détection des interactions de bremsstrahlung $ep \to ep\gamma$ (voir section 3.8), est sensible au nombre total de protons contenus dans une fenêtre de $\pm$ 19 ns autour du pic. La luminosité doit donc être corrigée pour prendre en compte l'effet des paquets satellites.

Les points de croisement des faisceaux Nord et Sud sont occupés par les expériences H1 et ZEUS respectivement [3].

3.2 Le détecteur H1

Le type de physique étudié auprès du détecteur H1 contraint ce dernier à répondre à des conditions spécifiques. L'étude des processus profondément inélastiques nécessite une bonne identification et une mesure précise des paramètres de l'électron diffusé, pour l'étude des interactions du type courant neutre, et une bonne herméticité permettant de réaliser les bilans d'énergie et d'impulsion, pour celles du type courant chargé. L'étude de la photoproduction et celle des états finals hadroniques nécessitent une bonne mesure de l'activité hadronique. Enfin, l'identification des muons et la mesure de leur énergie permettent la recherche d'événements avec production de quarks lourds, ou encore correspondant à une nouvelle physique (supersymétrie, sous-structure des quarks, etc.)

[3] Il existe deux autres sites (halls Ouest et Est) où sont situées les expériences sur cible fixe : HERMES et HERA-B. HERMES utilise le faisceau d'électrons de HERA, dont la polarisation transverse est transformée en une polarisation longitudinale par des polarisateurs de spin et étudie leur interaction avec un jet de gaz de protons polarisés. Le but de cette expérience est de mesurer les fonctions de structure polarisées du proton. L'expérience HERA-B est conçue pour étudier la physique du quark b, notamment la violation de la symétrie combinée CP dans le système $B_0 - \bar{B}_0$, la spectroscopie du méson B, les propriétés d'hadronisation. HERA-B utilise les interactions des protons légèrement hors phase par rapport au faisceau, avec un fil tendu à travers le tube à vide.

La structure générale du détecteur H1 [105] est présentée à la figure 3.2. Le système de coordonnées, dont l'origine est au point d'interaction nominal, est défini de sorte que l'axe des faisceaux corresponde à l'axe z, la direction des protons incidents correspondant aux coordonnées z positives. L'axe x est horizontal et dirigé vers le centre de l'accélérateur, l'axe y est vertical et dirigé vers le haut. L'angle polaire θ est mesuré par rapport à la direction aval du faisceau de protons. L'angle azimutal ϕ est mesuré par rapport à l'axe x, dans le plan (x, y). La grande différence d'énergie entre les électrons et les protons à HERA provoque une asymétrie dans la topologie des événements, la densité de particules émises étant plus grande dans la direction avant[4]. Le détecteur a donc été conçu de manière asymétrique: il est équipé davantage dans la partie avant que dans la partie arrière. Le détecteur possède une symétrie cylindrique par rapport à l'axe des faisceaux et est structuré en couches. En le parcourant depuis le centre vers l'extérieur on trouve:

• le système de détection des traces [106], composé de chambres à dérive et de chambres proportionnelles. Il s'étend sur le domaine angulaire $5° < \theta < 172°$. Il est placé dans un champ magnétique uniforme et parallèle aux faisceaux, de 1.15 Tesla. Le but des chambres à dérive est de reconstruire les trajectoires des particules chargées et de mesurer leur charge et leur impulsion grâce à la mesure de la courbure de la trajectoire. Les chambres proportionnelles sont utilisées par le système de déclenchement d'acquisition des données. Le système de détection des traces, dont la figure 3.3 présente une vue longitudinale par rapport à l'axe des faisceaux, est divisé en une partie avant, une partie arrière et une partie centrale. Celle-ci est détaillée à la section 3.3.

• le calorimètre à argon liquide (LAR) [107] qui entoure le système de détection des traces. Le calorimètre à argon liquide est la principale spécificité du détecteur H1. Il est facile à calibrer et possède une grande stabilité temporelle. Tous les modules du détecteur sont plongés dans le même cryostat afin d'éviter les problèmes d'inhomogénéité. Le calorimètre à argon liquide est un calorimètre à échantillonnage où les plaques d'absorbeur alternent avec les couches de matériau actif, l'argon liquide. Il possède une partie électromagnétique, correspondant à 20 longueurs de radiation (environ une longueur d'interaction hadronique) dans la partie centrale et 30 dans la région avant, entourée d'une partie hadronique représentant de 4.7 à 7 longueurs d'interaction hadronique. Les modules électromagnétiques se composent de plaques de plomb de 2.4 mm d'épaisseur séparées par 2.5 mm d'argon liquide. Les cellules de lecture ont des sections de (3×3) ou (8×8) cm^2. Les modules hadroniques sont formés de plaques d'acier inoxydable de 19 mm d'épaisseur séparées par des régions de 9.2 mm d'espace actif et sont typiquement deux fois plus larges que les cellules électromagnétiques. Les parties électromagnétique et hadronique du calorimètre se caractérisent par une grande segmentation longitudinale et transverse et par une profondeur importante, avec au total de l'ordre de 45000 cellules géométriques. En plus d'une bonne résolution angulaire sur la direction des particules incidentes, ceci permet une discrimination efficace entre électrons et hadrons par une analyse du développement longitudinal et/ou transverse des gerbes. D'autre part, les réponses du calorimètre à un électron ou un photon et à un hadron de même énergie sont différentes. Ceci induit une erreur sur la reconstruction de l'énergie des gerbes hadroniques (voir table 3.2), due à l'incertitude sur la fraction d'énergie emportée, au cours du développement de la gerbe, par les particules électromagnétiques (essentiellement les photons dus à la désintégration des mésons π^0). La bonne segmentation du calorimètre

[4]Tout au long de ce travail, les parties "avant" et "arrière" du détecteur désignent respectivement celles correspondant aux valeurs de z positives et négatives.