Messung differentieller 2-Jet-Raten und Bestimmung der starken Kopplung α_s in tief-unelastischer Streuung bei HERA

Dissertation

zur Erlangung des Doktorgrades
des Fachbereichs Physik
der Universität Hamburg

vorgelegt von

Nicolai Tobien

aus Hamburg

Hamburg
1999

Gutachter der Dissertation:	Prof. Dr. B. Naroska Prof. Dr. J. Meyer
Gutachter der Disputation:	Prof. Dr. J. Meyer Prof. Dr. R. Klanner
Datum der Disputation:	01.12.1999
Dekan des Fachbereichs Physik und Vorsitzender des Promotionsausschusses:	Prof. Dr. F. W. Büsser

Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der Analyse differentieller 2-Jet-Raten in Ereignissen tiefunelastischer ep-Streuung mit hohem Impulsübertrag Q^2. Die Messung basiert auf den mit dem H1-Detektor in den Jahren 1995-97 bei HERA genommenen Daten. Monte-Carlo-Modelle können die unter Verwendung zweier unterschiedlicher Jet-Algorithmen gemessenen Verteilungen nur grob beschreiben. Störungstheoretische QCD-Rechnungen in $O(\alpha_s^2)$ beschreiben diese Verteilungen dagegen sehr gut. Der Wert der starken Kopplung α_s wird durch Vergleich der Messung mit diesen Rechnungen bestimmt. Die mit den beiden Jet-Algorithmen ermittelten (korrelierten) Werte sind $\alpha_s(M_Z^2) = 0,119\pm^{0,009}_{0,011}$ bzw. $\alpha_s(M_Z^2) = 0,119\pm^{0,008}_{0,010}$. Diese Werte sind mit dem Weltmittelwert von α_s konsistent. In der Messung wird zudem das Skalenverhalten der starken Kopplung untersucht. Die Beobachtungen bestätigen dabei das aus der QCD erwartete Verhalten.

Measurement of differential di-jet rates and determination of α_s in deep inelastic scattering at HERA

Abstract

This analysis covers the measurement of differential di-jet event rates in deep inelastic ep scattering at high momentum transfer Q^2. The measurement is based on data taken with the H1 detector in 1995-97 at HERA . In contrast to Monte Carlo models perturbative QCD calculations in $O(\alpha_s^2)$ describe well the measured distributions, obtained with two different jet algorithms. The value of α_s is extracted by comparison of the measurement with these calculations. Using the two jet algorithms the (correlated) results are $\alpha_s(M_Z^2) = 0.119\pm^{0.009}_{0.011}$ and $\alpha_s(M_Z^2) = 0.119\pm^{0.008}_{0.010}$, respectively. This is in agreement with the world average value of α_s. The measurement also investigates the scale dependence of the strong coupling. The observed dependence confirms the QCD expectation.

»*Dieses Unternehmen ist Wahnsinn!*«
Professor Bienlein in:
Tim und Struppi - Schritte auf dem Mond

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Das heutige Verständnis vom Aufbau der Materie wird im sogenannten *Standardmodell* der Elementarteilchenphysik zusammengefaßt. Dieses enthält als grundlegende Bausteine Fermionen: jeweils sechs *Leptonen* und *Quarks*, geordnet in je drei *Generationen*. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Fermionen werden durch eichinvariante Quantenfeldtheorien beschrieben. Die diese Wechselwirkungen vermittelnden Feldquanten sind das Photon, das Z^0- und die W-Bosonen sowie die Gluonen.

Mit diesem Modell lassen sich die elektroschwache und die starke Wechselwirkung, welche auf Elementarteilchenniveau relevant sind, erklären. Versuche, auch die Gravitation, die in den uns zugänglichen Energiebereichen um viele Größenordnungen schwächer als diese Wechselwirkungen ist, in eine einheitliche Theorie einzubinden, stehen erst am Anfang [1].

Experimentell am wenigsten gesichert ist im Standardmodell die Beschreibung der zwischen den Quarks auf Grund ihrer *Farbladung* bestehenden starken Wechselwirkung durch die *Quantenchromodynamik* (QCD). Betrachtet man die Massen der Quarks als dem gesamten Standardmodell zugehörige Größen, so ist der einzig freie Parameter der QCD die Stärke der zwischen Quarks und Gluonen wirkenden Kopplung α_s. Wegen der in Quantenfeldtheorien notwendigen *Renormierung* ist der Wert von α_s energieskalenabhängig. Das Skalenverhalten der starken Kopplung führt dabei zu einer gewissen Komplikation: Weder Quarks noch Gluonen sind als freie Teilchen beobachtbar. Bei hohen Energien, entsprechend der Unschärferelation gleichbedeutend mit kleinen Abständen, ist die Kopplung klein, die Quarks verhalten sich *asymptotisch frei*. In diesem Bereich sind die Vorhersagen der QCD mit störungstheoretischen Mitteln berechenbar. Mit steigendem Abstand der Quarks wird die zwischen ihnen wirkende Kraft immer größer. Das daraus resultierende *Confinement*, die alleinige Beobachtung farbneutraler Hadronen im Experiment, ist bisher nur durch phänomenologische Modelle beschrieben.

Das Confinement und die Stärke der Kopplung an sich führen dazu, daß α_s, verglichen z.B mit der Feinstrukturkonstante α, eine relativ unsicher gemessene Größe ist. Der Weltmittelwert, angegeben bei der durch die Z^0-Masse definierten Skala, ist $\alpha_s(M_Z^2) = 0,119 \pm 0,004$ [2].

Ein sehr direkter Weg, in Teilchenreaktionen hoher Schwerpunktsenergie Informationen über die hier asymptotisch frei agierenden Quarks und Gluonen zu erlangen, ist die Analyse der sich aus ihnen im Endzustand durch kollimierte Bündel von Hadronen bildenden *Jets*.

Der Elektron-Proton-Speicherring HERA liefert durch seine hohe Schwerpunktsenergie von ~ 300 GeV erstmals die Möglichkeit, Jets klar in tiefunelastischer Lepton-Nukleon-Streuung zu beobachten. Diese Schwerpunktsenergie liegt etwa eine Größenordnung über der in bisherigen Experimenten mit stationären Nukleonen erreichten. Dies führt zu einem gesteigerten Auflösungsvermögen für die Struktur des Protons, welches in den Streuereignissen mit dem jeweiligen Impulsübertrag Q^2 identifiziert werden kann.

Die Beobachtung von Jets bei HERA erlaubt nicht nur die Messung des Wertes der starken Kopplung, sondern auch die Untersuchung ihres Skalenverhaltens , d.h. die Messung von α_s als Funktion von Q^2, an einem einzigen Experiment. Die in den Ereignissen jeweils rekonstruierte Anzahl von Jets hängt dabei vom verwendeten *Jet-Algorithmus* und dessen Auflösungsparameter ab. Die Hauptobservable der vorliegenden Analyse ist die bezüglich dieses Auflösungsparameters differentielle Rate von 2-Jet-Ereignissen.

Die Messung basiert auf den in den Jahren 1995-97 mit dem H1-Detektor bei HERA genommenen Daten. Es werden Ereignisse im kinematischen Bereich $Q^2 \geq 150\ \mathrm{GeV}^2$ betrachtet. Die Rekonstruktion der Jets erfolgt mit zwei Algorithmen, die jeweils unter experimentellen bzw. theoretischen Gesichtspunkten optimiert sind. Die Ergebnisse der Messung werden sowohl mit den Vorhersagen von Monte-Carlo-Modellen als auch mit störungstheoretischen QCD-Rechnungen verglichen. Dabei ermöglicht der Vergleich mit den Rechnungen die Bestimmung von α_s.

Die Ergebnisse der Analyse wurden als vorläufige H1-Resultate in [3] präsentiert.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt:

Im ersten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Analyse erörtert und die verwendeten Monte-Carlo-Modelle sowie Programme zur Ausführung von QCD-Rechnungen vorgestellt. Kapitel 2 beschreibt das H1-Experiment. In Kapitel 3 wird die Selektion tiefunelastischer Streuereignisse mit hohen Impulsüberträgen erläutert. Das vierte Kapitel enthält die Definition der beiden verwendeten Jet-Algorithmen. Darüber hinaus werden Methoden zur Korrektur der unter Verwendung dieser Algorithmen gemessenen Verteilungen auf die Effekte begrenzter Detektorakzeptanz und -auflösung vorgestellt sowie die systematischen Unsicherheiten der Messung untersucht. In Kapitel 5 erfolgt der Vergleich der korrigierten 2-Jet-Verteilungen mit den Vorhersagen der Monte-Carlo-Modelle und der QCD-Rechnungen. Im sechsten Kapitel schließlich werden die Methoden zur Bestimmung von α_s vorgestellt und die damit erhaltenen Ergebnisse präsentiert.

Kapitel 1

QCD und tiefunelastische Streuung

Im folgenden soll die Struktur der Quantenchromodynamik als eichinvariante Quantenfeldtheorie und die daraus folgende störungstheoretische Behandlung von Prozessen der starken Wechselwirkung erläutert werden. Dabei wird vor allem auf das Potential der Beobachtung von Jets in Ereignissen tiefunelastischer Streuung zur Bestimmung des freien Parameters der Theorie, des Wertes der starken Kopplung α_s, eingegangen.

Zusätzlich werden die in der vorliegenden Analyse benutzten Monte-Carlo-Programme zum Generieren tiefunelastischer Streuereignisse und das Programm zur Berechnung von QCD-Prozessen in $O(\alpha_s^2)$ vorgestellt.

1.1 QCD als eichinvariante Feldtheorie

Die der QCD zugrunde liegende Symmetriegruppe ist die der speziell unitären Transformationen SU(3). Den Quarks wird dabei ein spezieller innerer Freiheitsgrad, die sogenannte Farbladung, zugeordnet.

Betrachtet man den Spinor ψ eines Quarks im Vakuum, so erfüllt dieser die freie Dirac-Gleichung[1]

$$(i\gamma_\mu \partial^\mu - m)\psi = 0$$

für jede seiner 3 Farbkomponenten:

$$\psi = \begin{pmatrix} q_R \\ q_G \\ q_B \end{pmatrix}$$

Eine lokale SU(3)-Transformation bezüglich der Farbe kann folgendermaßen dargestellt werden:

$$\psi' = \begin{pmatrix} q_R \\ q_G \\ q_B \end{pmatrix}' = \exp\left(i\frac{g_s}{2}\lambda_j \beta_j(x)\right) \begin{pmatrix} q_R \\ q_G \\ q_B \end{pmatrix}$$

[1] Konvention in der Hochenergiephysik: $c = \hbar = 1$

Dabei ist g_s die Kopplung der starken Wechselwirkung ($\alpha_s = g_s^2/4\pi$) und $\lambda_j\,\beta_j \equiv \lambda_1\,\beta_1 + \cdots + \lambda_8\,\beta_8$ eine Kombination von acht unabhängigen, reellen Transformationsphasen $\beta_j(x)$ mit den Gell-Mann-Matrizen λ_j. Letztere können, als Verallgemeinerung der Pauli-Matrizen, als Erzeugende der SU(3) betrachtet werden.

Die postulierte Invarianz der Dirac-Gleichung gegenüber solchen lokalen Transformationen erfordert den Übergang zur kovarianten Ableitung:

$$\partial^\mu \;\Rightarrow\; D^\mu = \partial^\mu + i\,\frac{g_s}{2}\,(\,\lambda_1\,b_1^\mu + \cdots + \lambda_8\,b_8^\mu\,)$$

Das bedeutet, daß die Forderung nach Invarianz zur Existenz von Feldern b_j^μ führt. Diese werden bei einer lokalen SU(3)-Transformation des Spinors einer parallelen Eichtransformation unterzogen. Die Quanten dieser Felder, die Gluonen, vermitteln die starke Wechselwirkung. Eine Folge der nicht-abelschen Struktur der Theorie, d.h. der Nichtvertauschbarkeit der SU(3)-Transformationen, ist die Selbstkopplung der Gluonen.

Über den Feldstärketensor

$$G_j^{\mu\nu} = \partial^\nu b_j^\mu - \partial^\mu b_j^\nu + g_s\, f_{jkl}\, b_k^\mu\, b_l^\nu$$

mit den total antisymmetrische Strukturkonstanten der SU(3) f_{jkl} ergibt sich die Lagrange-Dichte der Theorie als

$$\mathcal{L}_{\text{inv}} = \overline{\psi}(\,i\gamma_\mu D^\mu - m\,)\,\psi - \frac{1}{4}\,\text{Spur}(G_{\mu\nu}\,G^{\mu\nu})\;\;.$$

Die Eigenschaft der Eichinvarianz dieser Lagrange-Dichte $\mathcal{L}_{\text{inv}}$ führt zu einigen Schwierigkeiten bei der Quantisierung der Theorie, die durch die Einführung ergänzender *Eich-* und *Geist-*Felder überwunden werden können [5], so daß sich die endgültige Lagrange-Dichte als Kombination dreier Komponenten darstellt:

$$\mathcal{L}^{\text{QCD}} = \mathcal{L}_{\text{inv}} + \mathcal{L}_{\text{Eich}} + \mathcal{L}_{\text{Geist}}$$

1.2 Perturbative QCD

Die Kenntnis der Lagrange-Dichte der QCD erlaubt die Aufstellung von Feynman-Regeln zur störungstheoretischen Behandlung von Prozessen festgelegter Ordnung in α_s, d.h. mit einer bestimmten Anzahl von Quark-Gluon- bzw. Gluon-Gluon-Vertices.

Die naive Anwendung dieser Regeln, beispielsweise zur Berechnung von *Strahlungskorrekturen* (Abbildung 1.1), führt zu mathematischen Problemen. Virtuelle Korrekturen durch geschlossene Quark- und Gluonlinien werden, da durch keinen Erhaltungssatz begrenzt, über den gesamten Impulsraum integriert und ergeben Beiträge unendlicher Größe, sogenannte *ultraviolette* (UV) Divergenzen.

Das Verfahren zur Behandlung dieser Divergenzen ist die Renormierung. Dabei werden die unendlich-wertigen Integrale durch *Regularisierung* mathematisch beherrschbar gemacht und die Divergenzen auf die »nackten«, in der Natur nicht beobachtbaren, ebenfalls unendlichen



Abbildung 1.1: Virtuelle Strahlungskorrekturen zum Quark-Gluon-Vertex. Jeder Vertex gibt einen Beitrag $\sqrt{\alpha_s}$ zur Amplitude.

Variablen der Theorie abgewälzt. Die resultierenden endlichen Größen entsprechen den meßbaren Observablen wie z.B. Masse und Ladung. Das Verfahren wird durch ein *Renormierungsschema*, nach dem die Divergenzen behandelt werden, und eine beliebige *Renormierungsskala* μ_R, die in der Renormierung als Referenzskala dient, definiert.

1.2.1 Die Renormierungsgruppengleichung

Renormierung nach unterschiedlichen Schemen und bei verschiedenen Skalen definiert eine Gruppenstruktur [6]. Eine renormierte Observable Γ_R darf allgemein in Quantenfeldtheorien nicht vom willkürlich gewählten Wert der Referenzskala μ_R abhängen, d.h. Γ_R muß die *Renormierungsgruppengleichung* erfüllen:

$$\mu_R \frac{d\Gamma_R}{d\mu_R} \stackrel{!}{=} 0$$

Damit diese Gleichung lösbar ist, müssen alle freien Parameter der Theorie, also auch die Kopplung, Funktionen der Renormierungsskala sein:

$$\alpha := \alpha(\mu_R)$$

Eine charakteristische Größe der Renormierungsgruppe ist die β-*Funktion*, die angibt, wie sich die Kopplung beim Übergang von μ_R zu einer beliebigen Skala μ verändert:

$$\beta(\alpha) = \frac{\partial\alpha}{\partial t}; \quad t = \log\left(\frac{\mu^2}{\mu_R^2}\right)$$

Für die starke Wechselwirkung ergibt sich daraus in Störungsrechnung erster Ordnung, aufgelöst nach der Kopplung:

$$\alpha_s(\mu^2) = \frac{\alpha_s(\mu_R^2)}{1 + \frac{\alpha_s(\mu_R^2)}{12\pi}(33 - 2n_f)\log\left(\frac{\mu^2}{\mu_R^2}\right)}$$

Dabei gibt n_f die Anzahl der verschiedenen Quark-Sorten an, die, abhängig von ihrer Masse, bei der zur Verfügung stehenden Gesamtenergie eines Prozesses berücksichtigt werden müssen.

Durch Einführung eines Parameters $\Lambda^{(n_f)}$ mit

$$\Lambda^{(n_f)^2} := \mu_R^2 \exp\left(\frac{-12\pi}{(33 - 2n_f)\,\alpha_s(\mu_R^2)}\right)$$

läßt sich aus (1.2.1) die folgende Form für das Verhalten der Kopplung $\alpha_s(\mu^2)$ ableiten:

$$\alpha_s(\mu^2) = \frac{12\pi}{(33-2n_f)\log\left(\frac{\mu^2}{\Lambda^{(n_f)2}}\right)} \tag{1.1}$$

Der Parameter $\Lambda^{(n_f)}$ ist nicht aus der QCD berechenbar, sondern muß im Experiment bestimmt werden. Er ist ein Maß für die skalenbereinigte Stärke der Kopplung. Da α_s eine stetige Größe ist, springt der Wert von $\Lambda^{(n_f)}$ beim Überschreiten der Energieschwellen, die die Teilnahme einer neuen Quark-Sorte am beobachteten Prozeß ermöglichen, auf einen anderen Wert $\Lambda^{(n_f+1)}$. In höheren störungstheoretischen Ordnungen wird die Gestalt der Gleichung 1.1 und damit der Wert von $\Lambda^{(n_f)}$ zudem abhängig vom angewendeten Renormierungsschema [5].

Im Standardmodell, in dem n_f nicht größer als 6 werden kann, ist $\beta(\alpha_s) < 0$, d. h. die Kopplung wird geringer, je höher die physikalische Skala eines Prozesses liegt und verschwindet im Limes $\mu^2 \to \infty$. Dieses Verhalten der Kopplung kann nur in nicht-abelschen Eichtheorien auftreten. Die Beobachtung dieser *asymptotischen Freiheit* im Experiment ist ein Hauptargument für die Gültigkeit der QCD als Theorie der starken Wechselwirkung.

1.2.2 Die Bestimmung der starken Kopplung

Zur Bestimmung der starken Kopplung α_s kann jeder auf Effekte der starken Wechselwirkung sensitive physikalische Prozeß X herangezogen werden, indem der gemessene Wirkungsquerschnitt mit den störungstheoretischen Vorhersagen verglichen wird:

$$\sigma_X := C_0^X + C_1^X \cdot \alpha_s(\mu_R^2) + C_2^X \cdot \alpha_s^2(\mu_R^2) + \cdots \tag{1.2}$$

Der Koeffizient C_i^X führender Ordnung (d.h. der erste Koeffizient $C_i^X \neq 0$) ist von der Renormierungsskala μ_R unabhängig, da hier noch keine virtuellen Quark- und Gluonschleifen auftreten können. Um eine gewisse Unabhängigkeit von der Wahl von μ_R zu erlangen, wie sie in der Renormierungsgruppengleichung exakt gefordert ist, müssen die Berechnungen also mindestens bis zu einer weiteren, der nächstführenden Ordnung durchgeführt werden. Hier können sich die Renormierungsskalenabhängigkeiten in $C_{i+1}^X(\mu_R)$ und $\alpha_s(\mu_R)$ (bis zu einem gewissen Grad) kompensieren.

1.2.3 Hadronisierung und Jets

Störungstheoretische QCD kann keine Vorhersagen für Prozesse bei beliebig kleiner Skala liefern. So wird Formel 1.1 für $\mu^2 \to \Lambda^2$ singulär und die berechnete Kopplung beliebig groß. Das beobachtete Verhalten der starken Wechselwirkung ist in diesen Fällen das *Confinement*: Quarks und Gluonen lassen sich nicht als freie Teilchen beobachten. Mit steigendem Abstand und damit der Unschärferelation entsprechend abnehmender Skala μ^2 wird die zwischen ihnen wirkende Kraft so stark, daß die Feldenergie im Vakuum ausreicht, weitere Teilchen zu erzeugen, die mit den Ausgangsteilchen zusammen die beobachtbaren Hadronen bilden.

Obwohl Quarks und Gluonen nicht als freie Teilchen beobachtet werden, legen die Strukturen der an Teilchenbeschleunigern aufgezeichneten physikalischen Reaktionen ihre Existenz nahe. Insbesondere werden im hadronischen Endzustand kollimierte Bündel von Hadronen, die sogenannten *Jets*, beobachtet, die auf zugrunde liegende Quark- und Gluonkonfigurationen schließen lassen. So wird z.B. in e^+e^--Reaktionen, in denen Jets erstmals beobachtet wurden, die Beobachtung von 2-Jet-Ereignissen auf die Erzeugung eines hochenergetischen Quark-Antiquark-Paares zurückgeführt [7], die von 3-Jet-Ereignissen auf die Abstrahlung eines zusätzlichen reellen Gluons [8]. Die Vermessung der Eigenschaften dieser Jets erlaubt Rückschlüsse auf die die Ereignisse bestimmenden QCD-Prozesse.

1.2.4 Infrarote Divergenzen

Neben den durch die Renormierung beherrschbaren ultravioletten Divergenzen treten in der perturbativen QCD noch Singularitäten durch die Abstrahlung beliebig niederenergetischer Gluonen und durch kollineare Abstrahlungen auf [5]. Diese sogenannten *infraroten* Divergenzen heben sich im hadronischen Endzustand bei der Berechnung von Wirkungsquerschnitten in fester Ordnung α_s gegenseitig auf (KLN-Mechanismus [9]).

Eine beliebige Observable kann in störungstheoretischer QCD nur sinnvoll berechnet werden, wenn sie infrarot-sicher, d.h. insensitiv auf niederenergetische oder kollineare Partonabstrahlungen ist.

1.3 Tiefunelastische Streuung

Abbildung 1.2 zeigt die schematische Darstellung von tiefunelastischen Elektron(Positron)-Proton-Streuprozessen, die die Grundlage der vorliegenden Analyse bilden. Diese werden durch den Austausch eines virtuellen Eichbosons zwischen dem Lepton und einem der Konstituenten des Protons vermittelt. Dieses Boson ist in Ereignissen mit *neutralem Strom* ein Photon oder ein Z^0-Boson. In Ereignissen mit *geladenem Strom* wird ein W-Boson ausgetauscht, welches das einlaufende Elektron in ein Neutrino verwandelt.



Abbildung 1.2: Tiefunelastische Elektron(Positron)-Proton-Streuung mit neutralem (links) und geladenem Strom (rechts)

Seien k, k', P und q die Vierervektoren von einlaufendem und gestreutem Elektron, einlaufendem Proton sowie ausgetauschtem Eichboson. Dann wird die Kinematik des Streuprozesses durch die folgenden lorentzinvarianten Größen beschreiben:

$$\text{Impulsübertrag}: \; Q^2 \; = \; -q^2 \; = \; -(k-k')^2$$

$$\text{Bjørken-Skalenvariable:} \; x \; = \; \frac{Q^2}{2P\cdot q}$$

$$\text{Inelastizität (bzw.relativer Energieübertrag)}: \; y \; = \; \frac{P\cdot q}{P\cdot k}$$

Vernachlässigt man die Massen $m_{p,e}$ von Proton und Elektron, so gilt zwischen diesen kinematischen Größen und dem Quadrat der Schwerpunktsenergie s die Beziehung

$$Q^2 \; = \; sxy\,,$$

so daß bei gegebenem s nur zwei dieser Größen unabhängig sind. Während Q^2 ein Maß für die Virtualität und für das Auflösungsvermögen des ausgetauschten Eichbosons gibt, läßt die invariante Masse des hadronischen Endzustandes

$$W^2 \; = \; (P+q)^2$$

Rückschlüsse auf die Stärke des »Aufbrechens« des Protons zu. Von tiefunelastischer Streuung spricht man im Fall von $Q^2 \gg m_p^2$ und $W^2 \gg m_p^2$.

1.3.1 Das Quark-Parton-Modell

Die Anteile des reinen Z^0-Austausches und der Z^0/Photon-Interferenz am Wirkungsquerschnitt σ_{DIS} tiefunelastischer Streuereignisse[2] sind wegen der hohen Masse des Z^0-Bosons für $Q^2 \ll M_{Z^0}^2$ auf Grund der Propagatorfaktoren der Form $Q^4/(Q^2+M_{Z^0}^2)^2$ bzw. $Q^2/(Q^2+M_{Z^0}^2)$ unterdrückt. Die ähnlich hohe Masse der W-Bosonen führt aus dem gleichen Grund für $Q^2 \ll M_W^2$ zu einem um Größenordnungen kleineren Wirkungsquerschnitt für Ereignisse mit geladenem Strom.

Unter Beschränkung auf den reinen Ein-Photon-Austausch läßt sich der Aufbau des Protons im doppelt differentiellen Wirkungsquerschnitt tiefunelastischer Streuung durch zwei Strukturfunktionen F_1 und F_2 beschreiben:

$$\frac{d^2\sigma_{DIS}(x,Q^2)}{dx\,dQ^2} \; = \; \frac{4\pi\alpha^2}{xQ^4}\left[\frac{y^2}{2}2xF_1(x,Q^2) + (1-y)F_2(x,Q^2)\right]$$

Eine Deutung dieser Strukturfunktionen liefert das Quark-Parton-Modell. Hierbei wird das Proton im tiefunelastischen Streuprozeß in einem Bezugssystem mit sehr hohem Impuls P betrachtet (*infinite momentum frame*), so daß seine Konstituenten, die punktförmigen Quarks, durch Zeitdilatation quasi-frei mit dem Elektron wechselwirken. Im diesem Modell erhält die

[2] DIS: *Deep Inelastic Scattering*

Skalenvariable x eine einfache Deutung, sie entspricht dem Impulsanteil ξ des wechselwirkenden Quarks am Gesamtimpuls P des Protons. Die Strukturfuntionen F_1 und F_2 hängen jetzt nur noch von x und nicht mehr von Q^2 ab (Skalenverhalten). Sie erfüllen, bei einem Spin der Quarks von 1/2, die Callan-Gross-Relation [12]:

$$F_2(x) \;=\; 2xF_1(x) \;=\; x\sum_i e_i^2\,(q_i(x)+\overline{q_i}(x)) \tag{1.3}$$

Dabei wird über alle Dichtefunktionen $q_i(x)$ bzw. $\overline{q_i}(x)$ der im Proton existierenden Quark- und Antiquark-Sorten i, gewichtet mit dem Quadrat der jeweiligen Quark-Ladung e_i, summiert.

1.3.2 QCD-Modifikationen des Quark-Parton-Modells

Der Übergang vom statischen Quark-Parton-Modell zur dynamischen Beschreibung der Protonstruktur durch die QCD hat eine Reihe von Konsequenzen. Die Notwendigkeit für diesen Übergang ergibt sich z.B. aus der Betrachtung von Summen wie

$$\sum_i \int_0^1 dx\; x\,(q_i(x)+\overline{q_i}(x)) \;=\; 1-\varepsilon\,,$$

für die der gemessene Wert von ε signifikant von null verschieden ist [13]. Es wird also nur ein Teil des Protonimpulses von Quarks und Antiquarks getragen, der Rest wird den Gluonen zugeschrieben.

QCD-Effekte führen zu einer Verletzung der Callan-Gross-Relation und zur Abhängigkeit der Strukturfunktionen auch von Q^2. Die ersten Beobachtungen dieser *Skalenverletzung* wurden in Myon-Streuexperimenten gemacht [14].

Die Beschreibung der tiefunelastischen Streuung durch die QCD führt zu den in Quantenfeldtheorien üblichen Divergenzen. Dabei werden die UV-Divergenzen durch Renormierung beseitigt und die divergierenden Terme durch infrarote Abstrahlungen im Endzustand durch den KLN-Mechanismus unterdrückt (vgl. Abschnitt 1.2.4). Dieser Mechanismus wirkt aber nicht auf Effekte gleicher Art im Anfangszustand. Die Behandlung dieser Divergenzen erfolgt im Rahmen des *Faktorisierungstheorems*, nach dem die Observablen Γ durch die Faltung zweier Funktionen beschrieben werden können [5]:

$$\Gamma(x,Q^2) \;=\; \sum_{i=q,\overline{q},g}\int_x^1 d\xi\; C_\Gamma^{(i)}\left(\frac{x}{\xi}\,,\,\frac{Q^2}{\mu_R^2}\,,\,\frac{\mu_F^2}{\mu_R^2}\,,\,\alpha_s(\mu_R^2)\right)\,\Phi_p^{(i)}(\xi\,,\mu_F) \tag{1.4}$$

Summiert wird jetzt über die im Proton vorhandenen Quarks, Antiquarks und Gluonen. Die zwei Funktionen im Integral sind die Koeffizientenfunktionen $C_\Gamma^{(i)}$ und die Partondichten $\Phi_p^{(i)}$. Die Koeffizientenfunktionen sind für jede infrarot-sichere Observable Γ störungstheoretisch berechenbar. Die Partondichten sind für das Proton unabhängig von Γ universell und werden durch Anpassung an Messungen bestimmt. Anschaulich ist dies eine Aufteilung in kurzreichweitige, harte sowie langreichweitige, nicht störungstheoretisch zugängliche Prozesse der Γ zugrunde liegenden Wechselwirkungen. Welcher Anteil von Γ jeweils durch die $C_\Gamma^{(i)}$ und $\Phi_p^{(i)}$ beschrieben wird, legt die Wahl der in Gleichung 1.4 zusätzlich auftauchenden *Faktorisierungsskala* μ_F und



Abbildung 1.3: Splitting-Prozesse für Quarks und Gluonen

des *Faktorisierungsschemas* fest. Gebräuchlich sind das *DIS*-Schema [15], bei dem F_2 in allen Ordnungen α_s die selbe Definition wie im Quark-Parton-Modell hat (analog zu Gleichung 1.3 $\Rightarrow$ der Gluonkoeffizient $C^g_{F_2}$ verschwindet), und das mathematisch elegante $\overline{MS}$-Schema [16], in dem die Partondichten in einer speziellen Operatordarstellung behandelt werden.

Die übliche Wahl von μ_F ist Q^2, welches das Auflösungsvermögen des virtuellen Photons bestimmt. Fragt man nun, analog zur β-Funktion der Renormierungsgruppe, wie sich die Quark- und Gluondichten des Protons, q und g, mit der Skala ändern, so ergibt sich ein System gekoppelter Differentialgleichungen ($t = \log(\frac{Q^2}{\Lambda_{QCD}})$) [17]:

$$\frac{\partial q(x,t)}{\partial t} = \frac{\alpha_s(t)}{2\pi}\int_x^1 \frac{dy}{y}\left[q(y,t)P_{qq}\left(\frac{x}{y}\right) + g(y,t)P_{qg}\left(\frac{x}{y}\right)\right]$$

$$\frac{\partial g(x,t)}{\partial t} = \frac{\alpha_s(t)}{2\pi}\int_x^1 \frac{dy}{y}\left[q(y,t)P_{gq}\left(\frac{x}{y}\right) + g(y,t)P_{gg}\left(\frac{x}{y}\right)\right]$$

Sie verbinden die starke Kopplung α_s und die Quark- und Gluondichten. Die *Splitting*-Funktionen $P_{ab}(\frac{x}{y})$ geben die Wahrscheinlichkeit an, mit der aus einem Parton b mit Impulsbruchteil y ein neues Parton a mit Impulsbruchteil $x < y$ entsteht (siehe Abbildung 1.3).

Diese Differentialgleichungen werden benutzt, um in einem Fit an gemessene Verteilungen unterschiedlicher Experimente die Partondichten des Protons über einen großen kinematischen Bereich zu parametrisieren. Dieser Aufgabe widmen sich Gruppen von Phänomenologen, die mit jeweils unterschiedlichen Arten der Parametrisierung und Startskalen der Partondichteentwicklungen arbeiten.

1.3.3 α_s und Jets in tiefunelastischer Streuung

Der Prozeß tiefunelastischer Streuung ist in führender Ordnung, dem Quark-Parton-Modell, nicht sensitiv auf die starke Kopplung α_s, d.h. der Koeffizient $C_0^{\sigma_{DIS}}$ in Gleichung 1.2 ist ungleich null. Die in Abbildung 1.3 gezeigten Quark-Gluon-Prozesse führen aber zu Skalenverletzungen, deren Stärke proportional zur starken Kopplung ist. Für die Strukturfunktion F_2 ergibt sich:

$$\frac{dF_2}{d\log Q^2} \propto \alpha_s(Q^2)$$

Wegen der Dominanz des führenden Koeffizienten in der Störungsreihe verlangt die Bestimmung der starken Kopplung über die Strukturfunktion F_2 sehr kleine statistische und systematische Unsicherheiten in der Messung. Das H1-Experiment ist im Moment im Begriff, diese Präzision zu erreichen [18].



Abbildung 1.4: QCD-Compton-Graph (links) und Boson-Gluon-Fusions-Graph (rechts)

Einen sehr viel direkteren Zugang zur Bestimmung von α_s in tiefunelastischer Streuung bei hohen Schwerpunktsenergien bietet die Messung von Jets. Im Quark-Parton-Modell erwartet man im hadronischen Endzustand die Beobachtung *eines* vom gestreuten Quark herrührenden Jets. Daneben tritt noch ein sogenannter *Remnant*-Jet auf, der aus den Fragmenten des Protonrestes gebildet wird.

Die Beobachtung eines weiteren Jets im hadronischen Endzustand[3] wird durch QCD-Effekte der Ordnung $O(\alpha_s)$ ermöglicht. Diese in Abbildung 1.4 dargestellten Prozesse werden als *QCD-Compton*-Prozeß (Abstrahlung eines Gluons durch das gestreute Quark) und *Boson-Gluon-Fusion* (Verschmelzen eines Gluons mit dem ausgetauschten Eichboson zu einem Quark-Antiquark-Paar) bezeichnet.

Die Zusammenfassung der im Detektor nachgewiesenen Objekte des hadronischen Endzustandes zu Jets erfolgt nach festen Schemen mit sogenannten *Jet-Algorithmen*. Um gleichzeitig auch in theoretischen QCD-Rechnungen anwendbar zu sein, müssen diese Algorithmen infrarot-sicher definiert werden.

Die Hauptobservable, die in der vorliegenden Analyse zur Bestimmung von α_s gemessen wird, ist die *differentielle Jet-Rate*. Sie gibt an, wie sich die Jet-Rate R_2, definiert als das Verhältnis von beobachteten Ereignissen mit (2+1)-Jet-Signatur zur Gesamtzahl der Ereignisse, bei Variation des *Auflösungsparameters* im Jet-Algorithmus ändert. Einzelheiten zu den verwendeten Jet-Algorithmen finden sich in Abschnitt 4.1. Die Sensitivität der differentiellen Jet-Rate auf die starke Kopplung α_s wird in Kapitel 6 genauer untersucht.

1.4 Ereignisgeneratoren und QCD-Rechnungen

Die in der vorliegenden Analyse gemessenen Daten sollen unter anderem mit den Vorhersagen von verschiedenen, auf der QCD basierenden *Monte-Carlo*-Ereignisgeneratoren verglichen werden. In diese sind tiefunelastische Prozesse bis zur für die 2-Jet-Produktion führenden Ordnung $O(\alpha_s)$ (*leading order* LO) exakt und höhere Ordnungen in Nährungen sowie eine Mo-

[3]Dies wird als (2+1)-Jet-Signatur bezeichnet, im Gegensatz zur (1+1)-Jet-Signatur im Quark-Parton-Modell

dellierung der Hadronisationsprozesse implementiert. Der Vergleich von Parton- und Hadronniveau der Generatoren liefert dabei auch Abschätzungen für die Effekte der Hadronisierung. Die Generatoren dienen außerdem, nach Durchlaufen einer Simulation des H1-Detektors, der Korrektur der Daten auf begrenzte Auflösung und Akzeptanz des Detektors.

Die für den Vergleich der Daten mit einer QCD-Voraussage in nächstführender Ordnung (*next-to-leading order* NLO) in α_s erforderlichen Rechnungen erfolgen mit einem gesonderten Programm.

1.4.1 Monte-Carlo-Ereignisgeneratoren

In der hier vorgestellten Analyse werden im wesentlichen drei unterschiedliche Monte-Carlo-Generatoren verwendet:

LEPTO

Das Programm LEPTO [19] generiert, basierend auf einer gegebenen Partondichte, Boson-Gluon-Fusions- und QCD-Compton-Ereignisse mit dem exakten Matrixelement der Ordnung α_s. Der infrarot-divergente Bereich wird dabei durch Schnitte auf die minimal erlaubten invariante Massen und Winkel der zwei Partonen des harten QCD-Prozesses vermieden. Die von diesen Schnitten abhängige Differenz zum totalen Wirkungsquerschnitt wird durch Ereignisse aufgefüllt, die in ihrer Signatur dem Quark-Parton-Modell entsprechen. Effekte höherer Ordnung werden durch sogenannte *Partonschauer* approximiert, bei deren Berechnung die führenden logarithmischen Terme der QCD-Störungsreihe berücksichtigt werden. Diese Partonschauer können sowohl von den Partonen des Anfangs- als auch des Endzustandes des Streuprozesses erzeugt werden.

Die Fragmentation der so erzeugten Partonen in Hadronen erfolgt im Rahmen des *Lund*-Modells [20], in dem die Farbflüsse zwischen den Quarks und Gluonen als *Strings* modelliert werden, deren Aufbrechen die Bildung von Hadronen bewirkt. Die Parameter, die diese Fragmentation steuern, wurden durch Vergleich mit sehr genauen Meßergebnissen aus e^+e^--Streuung optimiert (siehe z.B [21]).

Eine Besonderheit von LEPTO ist die Modellierung von *Soft Color Interactions* [22]. Dabei handelt es sich um durch Gluonen vermittelte Wechselwirkungen jenseits der Störungstheorie, welche ein Aufbrechen der Farb-Strings zwischen den auslaufenden Partonen des harten QCD-Prozesses und dem Protonrest bewirken. So kann eine spezielle Klasse bei HERA beobachteter tiefunelastischer Streuprozesse, die sogenannten diffraktiven Ereignisse, modelliert werden. Die charakteristische Signatur ist hier eine *Rapiditätslücke*, d.h. es wird keine Energie im Bereich des Detektors in Nähe der Protonflugrichtung deponiert. Da in gewöhnlichen Ereignissen tiefunelastischer Streuung auf Grund der Farbflüsse zwischen den auslaufenden Partonen des harten QCD-Prozesses und dem Protonrest Fragmentationsprodukte in dieser Region erwartet werden, werden diffraktive Ereignisse im allgemeinen als Wechselwirkung des virtuellen Photons mit einem farbneutralen Objekt (genannt *Pomeron*) interpretiert.

ARIADNE

Der Ereignisgenerator ARIADNE [23] basiert auf dem Farb-Dipol-Modell. Analog zu einem schwingenden Dipol der klassischen Elektrodynamik sendet dabei das System von gestreutem

Quark und Protonrest Gluonen aus, die ihrerseits wieder als Quellen von Dipolfeldern wirken. Die vom Phasenraum her möglichen Abstrahlungen werden dabei abhängig von Q^2 gedämpft. Um auch Gluon-induzierte Streuprozesse generieren zu können, verwendet ARIADNE zusätzlich das Boson-Gluon-Fusions-Matrixelement aus LEPTO.

Auch ARIADNE nutzt das Lund-String-Modell zur Modellierung der Hadron-Fragmentation der Partonen.

ARIADNE generiert diffraktive Ereignisse mit Hilfe einer implementierten Pomeron-Strukturfunktion.

HERWIG

Das Programm HERWIG [24] basiert, ähnlich wie LEPTO, auf einem $O(\alpha_s)$-Matrixelement und zusätzlichen Partonschauern. Durch die Berücksichtigung von QCD-Farbkohärenzeffekten wird dabei in HERWIG das Abstrahlungsverhalten für weiche Gluonen modifiziert.

Die Ausbildung von Hadronen erfolgt in HERWIG durch sogenannte *Cluster*-Fragmentation [25]. Dabei werden Gluonen am Ende des Partonschauers in Quark-Antiquark-Paare gespalten und alle Quarks und Antiquarks zu Farb-Singlett-Clustern zusammengefaßt, welche dann phasenraumabhängig in Hadronen zerfallen. Diese Modellierung der Hadronisierung enthält wesentlich weniger freie Parameter als das Lund-String-Modell.

QED-Korrekturen

Die Effekte quantenelektrodynamischer Strahlungsorrekturen können sowohl für LEPTO als auch für ARIADNE mit dem Programm DJANGO [26] berücksichtigt werden. Dabei werden vom einlaufenden bzw. auslaufenden Elektron abgestrahlte reelle Photonen generiert sowie Vertexkorrekturen berechnet.

1.4.2 QCD-Rechnungen

Die in der vorliegenden Analyse verwendeten QCD-Rechnungen wurden mit dem Programm DISENT ausgeführt, welches auf dem sogenannten *Dipol*-Formalismus beruht [27]. Dieser nutzt Faktorisierungseigenschaften kurz- und langreichweitiger Prozesse der QCD zur Bestimmung von Matrixelementen. Das Programm liefert Berechnungen von Wirkungsquerschnitten für beliebige (2+1)-Jet-Observablen bis $O(\alpha_s^2)$ und erfüllt somit die Ansprüche, die für die Bestimmung der starken Kopplung in Abschnitt 1.2.2 gestellt wurden.

Die in den Rechnungen auftretenden infraroten Divergenzen werden durch die *Subtraktions*-Methode behandelt, die die Unendlichkeiten in reellen und virtuellen Beiträgen zum Wirkungsquerschnitt gegeneinander aufhebt. Die divergenten Bereiche im Phasenraum werden hier analytisch behandelt, der übrige Bereich durch numerische Monte-Carlo-Integrationsmethoden berechnet.

Die freien Parameter der Rechnung sind die Wahl der Renormierungs- und Faktorisierungsskala, der Wert der starken Kopplung, gegeben durch $\Lambda^{(4)}$, und die Partondichten des Protons. Zur Implementierung der letzteren wurde das Programmpaket PDFLIB [28] benutzt.

Die Resultate der mit DISENT ausgeführten Rechnungen wurden für viele Observablen in unterschiedlichen kinematischen Regionen im Rahmen des HERA-Monte-Carlo-Workshops ’98/’99 [29] mit denen anderer QCD-Kalkulationsprogramme verglichen [30]. Die Übereinstimmung mit den Vorhersagen von DISASTER++ [31] , welches auch die Subtraktions-Methode benutzt, lag bei Bruchteilen eines Prozents. Auch das Programm JETVIP [32], in dem die infraroten Divergenzen durch *Phase Space Slicing* behandelt werden, lieferte mit den beiden mit der Subtraktions-Methode arbeitenden Programmen übereinstimmende Ergebnisse. Größere Abweichungen (bis zu 8% für einige Observablen) gab es in diesen Untersuchungen bei Verwendung des Programms MEPJET [33], welches ebenfalls auf *Phase Space Slicing* beruht. Bei Beschränkung auf die führende Ordnung in α_s zeigte MEPJET keine Abweichungen von den Vorhersagen der anderen Programme. Aufbauend auf diesen Untersuchungen wurde empfohlen, für QCD-Rechnungen MEPJET nicht mehr zu benutzen.

Kapitel 2

Das Experiment H1

2.1 Der Elektron-Proton-Speicherring HERA



Abbildung 2.1: Der Speicherring HERA und das Vorbeschleunigersystem am DESY

Die Hadron-Elektron-Ring-Anlage HERA (siehe Abbildung 2.1) liefert die auf der Welt einzigartige Möglichkeit, tiefunelastische Lepton-Nukleon-Streuung in einem Speicherring und damit bei sehr hohen Schwerpunktsenergien durchzuführen. Gebaut am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in Hamburg wurde HERA 1991 in Betrieb genommen. Im darauffolgenden Jahr begannen die Experimente H1 und ZEUS mit der Aufzeichnung von *ep*-Wechselwirkungen. Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit den von H1 in den Jahren 1995-97 genommenen Daten aus Positron-Proton-Streuung [1].

Nach der Injektion durch das Vorbeschleunigersystem werden Elektron- und Protonstrahl in zwei übereinanderliegenden Ringen im HERA-Tunnel, der einen Umfang von ca. 6,3 km

[1] Diese Option lieferte, verglichen mit einem Elektronstrahl, eine erhöhte Lebensdauer des Leptonstrahls. Im folgenden werden die Begriffe Elektron und Positron synonym verwendet

	1997	
	$\mathbf{e^+}$	**p**
Strahlenergie (GeV)	27,5	820
mittlerer Strahlstrom (mA)	36,0	76,8
max. Luminosität ($cm^{-2}s^{-1}$)	$8,4 \cdot 10^{30}$	
integrierte Luminosität (pb^{-1})	$35,0$	
Schwerpunktsenergie (GeV)	300	

Tabelle 2.1: Einige HERA-Parameter der Datennahmeperiode 1997

hat, beschleunigt und gespeichert. In den Jahren 1995-97 lagen die Strahlendenergien bei 820 GeV für die Protonen und 27,5 GeV für die Elektronen. Daraus folgt eine Schwerpunktsenergie $\sqrt{s}$ von ungefähr 300 GeV. Durch die Beschleunigung der Teilchen in Hochfrequenzkammern besteht der Teilchenstrom aus einzelnen Paketen, die in einem zeitlichen Abstand von 96 ns an den beiden Wechselwirkungspunkten zur Kollision gebracht werden.

Im Gegensatz zu den Elektronen, die mit konventionellen Magneten gesteuert werden können, erfordern der Protonstrahl sowohl zur Ablenkung als auch zur Fokussierung supraleitende, mit flüssigem Helium gekühlte Magnete (Feldstärke 4,7 T).

In Tabelle 1.1 finden sich die mittleren Werte wichtiger HERA-Parameter für die Datennahmeperiode 1997.

Die beiden HERA-Experimente HERMES und HERA-B (untergebracht in den Experimentierhallen Ost und West, siehe Abbildung 2.1) verwenden nur jeweils einen der zur Verfügung gestellten Strahlen. Dabei nutzt HERMES die natürliche Polarisation des HERA-Elektronstrahls zur Bestimmung der Spin-Struktur des Protons. Das Ziel von HERA-B ist die Messung der CP-Verletzung in b-Quark-Systemen.

2.2 Der H1-Detektor

Der H1-Detektor (siehe Abbildung 2.2) ist ein aus vielen Einzelkomponenten zusammengesetztes Nachweisinstrument für die Reaktionsprodukte der Elektron-Proton-Streuung bei HERA. Er hat ein Volumen von $\sim 1800\,m^3$ und wiegt ungefähr 2800 t. Der durch den Detektor abgedeckte Raumwinkelbereich beträgt nahezu 4π. Den stark unterschiedlichen Strahlenergien der Protonen und Elektronen wird durch einen asymmetrischen Aufbau des Detektors Rechnung getragen.

Im folgenden sollen die einzelnen Detektorkomponenten beschrieben werden, ausführlichere Informationen finden sich in [34]. Sämtliche Koordinatenangaben beziehen sich auf den nominellen Wechselwirkungspunkt als Ursprung, die Richtung des Protonstrahls definiert die positive z-Achse.