Untersuchung diffraktiver J/ψ-Erzeugung bei HERA

DISSERTATION

zur Erlangung des Doktorgrades
des Fachbereichs Physik
der Universität Hamburg

Vorgelegt von
Thomas Jansen
aus Krefeld

Hamburg
1995

Gutachter der Dissertation:	Prof. Dr. F.-W. Büßer Prof. Dr. W. Bartel
Gutachter der Disputation:	Prof. Dr. E. Lohrmann Prof. Dr. W. Bartel
Datum der Disputation:	14. 9. 95
Sprecher des Fachbereichs Physik und Vorsitzender des Promotionsausschusses:	Prof. Dr. B. Kramer

Abstract

At HERA the observation of photoproduction of J/ψ–Mesons enables the study of diffractive procceses at high photon-proton–energies up to 150 GeV. An analysis of data collected by H1 in 1994 for an integrated luminosity of $\mathcal{L} = 2.1\,\mathrm{pb}^{-1}$ allowed the selection of e^+e^-–pairs by electronidentification with the calorimeter. From 341 ± 18 J/ψ–candidates the elastic cross section $\sigma(\gamma + p \rightarrow J/\psi + p') = (30 \pm 6 \pm 6)\,\mathrm{nb}$ at $W_{\gamma p} = (43 \pm 2)\,\mathrm{GeV}$ up to $(75 \pm 26 \pm 14)\,\mathrm{nb}$ at $W_{\gamma p} = (134 \pm 2)\,\mathrm{GeV}$ was determinated. The rise of the elastic cross section is associated with a pomeronintercept of $\epsilon = 0.22 \pm 0.03$. This value is much higher as expected from parameterisations given by Donnachie and Landshoff for soft hardron–hadron–interactions ($\epsilon = 0.081$).

Kurzfassung

Bei HERA ermöglicht die Beobachtung der Photoproduktion von J/ψ–Mesonen die Untersuchung von diffraktiven Prozessen bis zu einer Photon–Proton–Schwerpunkt-energie von 150 GeV. Die Ananlyse von H1–Daten, die 1994 für eine integrierte Luminosität von $\mathcal{L} = 2.1\,\mathrm{pb}^{-1}$ aufgezeichnet wurden, erlaubten die Selektion von e^+e^-–Paaren durch Elektronidentifikatrion im Kalorimeter. Von 341 ± 18 J/ψ–Kandidaten konnte der elastische Wirkungsquerschnitt $\sigma(\gamma + p \rightarrow J/\psi + p') = (30 \pm 6 \pm 6)\,\mathrm{nb}$ bei $W_{\gamma p} = (43 \pm 2)\,\mathrm{GeV}$ bis hin zu $(75 \pm 26 \pm 14)\,\mathrm{nb}$ bei $W_{\gamma p} = (134 \pm 2)\,\mathrm{GeV}$ bestimmt werden. Das Ansteigen des elastischen Wirkungsquerschnitts ist mit einem Pomeronintercept $\epsilon = 0.22 \pm 0.03$ verbunden. Dieser Wert ist sehr viel höher, als er durch die Parameterisation von Donnachie and Landshoff für weiche Hadron–Hadron–Streuung mit $\epsilon = 0.081$ vorhergesagt wird.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich im Rahmen des H1–Experiments mit der diffraktiven J/ψ–Erzeugung bei HERA.
Am deutschen Elektron–Synchrotron DESY im Hamburg wurde der erste Elektron–Proton Speicherring (HERA) entwickelt, an dem Elektronen (Positronen) bis zu einer Energie von 30 GeV und Protonen mit einer Energie von 820 GeV zur Kollision gebracht werden, wodurch eine maximale Schwerpunktenergie von $\sqrt{s} = 314\,\mathrm{GeV}$ erreicht wird.
Der Elektron–Strahl von HERA kann als eine Quelle für quasireelle Photonen angesehen werden, falls das Elektron unter kleinem Winkel am Proton gestreut wird. Dadurch ermöglicht HERA die Untersuchung der Photoproduktion des J/ψ–Mesons im Schwerpunktenergiebereich von 30 GeV bis 180 GeV.
Das J/ψ–Meson ist durch seinen Zerfall in die Leptonpaare $\mu^+\mu^-$ oder e^+e^- leicht im Experiment zu erkennen. Den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet die Messung des elastischen Prozesses: $\gamma p \rightarrow J/\psi p'$, wobei der Zerfallskanal $J/\psi \rightarrow e^+e^-$ zur Identifikation des J/ψ–Mesons benutzt wird.
Mit dieser Messung lassen sich die Vorhersagen des diffraktiven Modells bei hohen Schwerpunktenergien überprüfen. Weiterhin ermöglicht die Masse des J/ψ–Mesons QCD–Störungsrechnung im Bereich ($0.25 < \alpha_s < 0.3$). Die Vorhersagen dieser Modelle können in Zukunft mit der Messung des elastischen Wirkungsquerschnitts verglichen werden.

Gliederung der Arbeit

Nach einer Erläuterung der Erzeugungsmechanismen zur elastischen J/ψ–Produktion bei ep–Kollisionen in Kapitel 1 folgt in Kapitel 2 die Beschreibung des H1–Experiments. Es werden in einer kurzen Übersicht die in dieser Analyse verwendeten Detektorkomponenten und die Methode der Datennahme vorgestellt.
Zum genaueren Verständnis der Abläufe im Detektor werden J/ψ–Ereignisse simuliert. Dazu dienen sogenannte Monte–Carlo–Simulationen, die statistische Abläufe im Detektor nachvollziehbar machen. Das hierzu verwendete Monte–Carlo–Modell

wird in Kapitel 3 vorgestellt.
Es folgt in Kapitel 4 die Beschreibung der Selektion von elastischen J/ψ–Ereignissen. Zur Bestimmung des Wirkungsquerschnitts muß die Nachweiswahrscheinlichkeit für den elastischen Streuprozeß ermittelt werden. Hierzu werden in Kapitel 5 die Nachweiswahrscheinlichkeiten einzelner Detektorkomponenten gesondert untersucht und mit den Vorhersagen der Monte–Carlo–Simulation verglichen. Daraus läßt sich der systematische Fehler für die Messung abschätzen.
In Kapitel 6 werden schließlich der ep– und der Photon–Proton–Wirkungsquerschnitt für die elastische J/ψ–Erzeugung bestimmt. Weiterhin werden J/ψ–Kandidaten, deren gestreutes Elektron im rückwärtigen Kalorimeter nachgewiesen wurde, getrennt von den Photoproduktionsergebnissen betrachtet.
Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick ab.

Kapitel 1

Produktionsmodelle zur Erzeugung des J/ψ–Mesons in der Elektron–Proton–Streuung

Das J/ψ-Vektormeson ist ein gebundener Zustand aus einem *Charm*– und einem *Anticharm*–Quark. Es hat die Spin- und Paritätsquantenzahlen $(J^{PC}) = 1^{--}$. Die Masse beträgt $m_{J/\psi} = 3.097\,\mathrm{GeV}$ und die gesamte Zerfallsbreite $\Gamma = 88\,\mathrm{keV}$. Das J/ψ–Meson zerfällt jeweils zu 6 % in ein e^-e^+- oder $\mu^-\mu^+$-Leptonpaar [PDG94]. Die klare Zerfallssignatur des Leptonpaares ermöglicht ein einfaches Erkennen des J/ψ-Mesons im Detektor.
Der Elektron–Strahl von HERA emittiert quasireelle Photonen, deren Streuung am Proton untersucht werden kann. Wird das Elektron unter großem Winkel gestreut, ist das Photon virtuell, wodurch die Struktur des Protons aufgelöst werden kann. In diesem Fall spricht man von tiefinelastische Streuung (DIS). HERA ermöglicht die Messung des Wirkungsquerschnitts bei verschiedenen Photon–Proton–Schwerpunktenergien in einem Bereich von 30 bis 180 GeV sowohl für Photoproduktion als auch für tiefinelastische Streuung des Elektrons am Proton.
Die bisherigen Experimente zur J/ψ–Erzeugung durch Photonen lassen sich in folgende zwei Gruppen einteilen:

- Photoproduktion mit reellen Photonen [Bin82, Den84, Bar87, Fra93].
- Tiefinelastische Streuung von Myonen [Cla79, EMC83, NMC94].

In allen bisherigen Experimenten befand sich das Proton in Ruhe. Die maximale Strahlenergie beträgt 280 GeV [NMC94]. Dies entspricht einer maximalen Photon–Proton–Schwerpunktenergie von $W_{\gamma p} = 22\,\mathrm{GeV}$. Durch HERA ist eine um den Faktor 10 höhere γp–Schwerpunktenergie zu erreichen.

1.1 Kinematik

Die kinematischen Variablen bei HERA für die tiefinelastische Elektron–Proton–Streuung werden in diesem Abschnitt definiert. Die Erläuterung weitere Größen zur Beschreibung der Photoproduktion findet im nächsten Abschnitt statt.

1.1.1 Die tiefinelastische Streuung



Abbildung 1.1: *Tiefinelastische Elektron–Proton–Streuung. Das einlaufende Lepton trägt die Bezeichnung* l *mit dem Viererimpuls* (k)*. Für die weiteren Teilchen ist analog dazu der Teilchentyp und Viererimpuls definiert.*

In niedrigster Ordnung wird die tiefinelastische ep–Streuung durch die Bornsche Näherung beschrieben (vergl. Abbildung 1.1). Am Leptonvertex wird ein virtuelles Boson abgestrahlt, welches mit einem Parton aus dem Proton wechselwirkt. Dabei kann es sich um einen neutralen Strom (γ, Z^0-Austausch) oder um einen geladenen Strom ($W^{\pm}$-Austausch) handeln. Bei kleiner Virtualität ist der Austausch der schwach wechselwirkenden Bosonen aufgrund ihrer großen Masse unterdrückt. Deshalb dominiert die Streuung des Photons am Proton. In dieser Arbeit wird nur die Streuung des Photons am Proton behandelt. Zur kinematischen Beschreibung werden die folgenden lorentzinvarianten Größen benutzt:
Die Virtualität Q^2 des ausgetauschten Photons bestimmt sich aus der Impulsdifferenz zwischen dem ein- und auslaufenden Lepton.

$$Q^2 := -q^2 = -(k - k')^2$$

Die Variable y gibt im Protonruhesystem den Energieübertrag vom Lepton auf das Proton an:

$$y := \frac{P_p \cdot q}{P_p \cdot k}$$

Eine dritte Variable x_{Bj} wird zur Beschreibung der inelastischen Kinematik benutzt. Im Partonmodell wird dem einlaufenden Parton p_i der Impulsbruchteil x_{Bj} vom Protongesamtimpuls zugeordnet. Es gilt:

$$x_{Bj} := \frac{Q^2}{2P_p q}$$

Benutzt man die invariante Masse des Elektron–Proton–Systems

$$s := (P_p + k)^2$$

und vernachlässigt die Ruhemasse des Elektrons und des Protons, so erhält man folgende Abhängigkeit für die Bjorken-Variable x_{Bj}:

$$x_{Bj} \approx \frac{Q^2}{ys}$$

Das Photon–Proton–Schwerpunktsytem besitzt die Schwerpunktenergie $W_{\gamma p}$.

$$W_{\gamma p}^2 = (P_p + q)^2 = m_p^2 - Q^2 + ys \qquad (1.1)$$

1.2 Photoproduktion

Im Fall kleiner Virtualität ($Q^2 \ll 1GeV^2$) befindet sich das Photon annähernd auf der Massenschale. Vom phänomenologischen Standpunkt haben Photon–Hadron–Wechselwirkungen ähnliche Eigenschaften wie Hadron–Hadron–Wechselwirkungen [Bau78], denn das „physikalische" Photon ist als eine Überlagerung des elektromagnetischen Feldes $|\gamma_{QED}\rangle$ mit einer hadronischen Komponente zu verstehen.

$$|\gamma\rangle = |\gamma_{QED}\rangle + |h\rangle$$

Der totale Photon–Proton–Wirkungsquerschnitt

$$\sigma_{tot}^{\gamma p} = \sigma_{direkt}^{\gamma p} + \sigma_D + \sigma_{ND}$$

setzt sich aus der direkten Wechselwirkung des Photons mit dem Proton $\sigma_{direkt}^{\gamma p}$ und einem hadronischen Anteil zusammen, der sich in einen diffraktiven σ_D und einen nicht diffraktiven Beitrag σ_{ND} aufspaltet. Eine ausführliche Übersicht zur Photoproduktion geben [Bau78] und [Sch93].



Abbildung 1.2: *Das Photon fluktuiert innerhalb einer Formationzeit Δt_V in ein Vektormeson, das dann am Proton gestreut wird. Die Größenordnung für die Formationsstrecke Δx_V hängt von m_V und der Energie des Photons ab (siehe Gleichung 1.2).*

Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Photoproduktion des J/ψ–Vektormesons. Hier läßt sich der Photoproduktionsmechanismus in zwei Schritte aufteilen. Im ersten Schritt wird der Übergang vom Photon in das Vektormeson betrachtet. Die Unschärferelation erlaubt die Existenz des Vektormesons für die Formationzeit Δt_V, welche mit $\Delta E = E_\gamma - E_V$ im Zusammenhang steht. Die Strecke, auf der das Photon als Vektormeson existiert, wird Formationsstrecke Δx_V genannt (vergleiche dazu [Bau78]):

$$\Delta x_V = c \cdot \Delta t_V = \frac{\hbar c}{E_\gamma - E_V} \approx \frac{2\hbar c E_\gamma}{Q^2 + m_V^2} \tag{1.2}$$

Für eine mittlere Schwerpunktenergie $< W_{\gamma p} > = 100\,\mathrm{GeV}$ beträgt $\Delta x_V \approx 200$ fm, die den Protonradius $r_p = 0.8$ fm um ein Vielfaches übersteigt.

Im zweiten Schritt wird die Wechselwirkung zwischen J/ψ und Proton unabhängig von der Formation betrachtet. Eine wichtige Variable zur Beschreibung der Wech-



Abbildung 1.3: *Diffraktive Erzeugung eines Vektormesons. t berechnet sich aus dem Impulsübertrag zwischen Photon und Vektormeson. In der linken Abbildung bleiben das Vektormeson und das Proton nach der Streuung intakt. In der rechten Abbildung dissoziiert das Proton.*

selwirkung des Vektormesons mit dem Proton ist die Inelastizität z:

$$z = \frac{P_p \cdot p_V}{P_p \cdot q} \tag{1.3}$$

z gibt im Protonruhesystem den Energieübertrag vom Photon auf das Vektormeson an. Elastische Streuung ist durch $z \to 1$ gekennzeichnet, die den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet. Dieser Prozeß ist im wesentlichen diffraktiver Natur. Es handelt sich bei der diffraktiven Streuung um einen weichen Prozeß, an dem das Proton als Ganzes beteiligt ist (vergleiche mit Abbildung 1.3). Eine zur Beschreibung von diffraktiven Prozessen wichtige Größe ist die Impulsänderung des Protons, deren Quadrat die Größe t definiert

$$t = (P_p - P_p')^2 = (q - p_V)^2 \ . \tag{1.4}$$

Die diffraktive Wechselwirkung liefert elastische und inelastische Beiträge, bei denen einer der Reaktionspartner dissoziiert (vergleiche dazu Abbildung 1.4). Die dazu-



Abbildung 1.4: *Unterteilung der diffraktiven Streuung in diffraktiv elastischer (a), einfache dissoziierender (b) (c) und doppelte dissoziierender Streuung (d)*

gehörigen Wirkungsquerschnitte werden mit σ_{SD} und σ_{DD} bezeichnet. σ_{SD} steht für die Dissoziation einer der Reaktionspartner. Bei σ_{DD} dissoziieren beide Reaktionspartner. Die diffraktive Dissoziation des Protons kann bei HERA nicht in allen Fällen identifiziert werden, da die Teilchen aus der Protondissoziation in Protonrichtung durch das Strahlrohr aus dem Detektor entweichen. Solche Ereignisse können als elastisch misinterpretiert werden.

1.3 Das Vektormeson–Dominanz–Modell

Das Photon wird im Vektormeson–Dominanz–Modell [Sak60, Bau78] (VMD–Modell) als eine Fluktuation des elektromagnetischen Feldes γ_{QED} in Vektormesonen dargestellt:

$$|\gamma\rangle = N|\gamma_{QED}\rangle + \sum_V \frac{e}{\gamma_V}|V\rangle$$

Die VMD–Kopplungskonstante γ_V läßt sich aus der leptonischen Zerfallsbreite Γ_{ee} und der Masse des Vektormesons m_V bestimmen. Sie gibt die Übergangswahrscheinlichkeit des Photons in ein Vektormeson an, welche weitgehend von der Energie des Photons E_γ unabhängig ist [Bau78].

$$\frac{\gamma_V^2}{4\pi} = \frac{\alpha^2 m_V}{3\Gamma_{ee}^V}$$

(α ist die QED-Feinstrukturkonstante). Die Massen und leptonischen Zerfallsbreiten sind für verschiedene Vektormesonen gemessen worden. Daraus ergeben sich die VMD–Kopplungskonstanten in Tabelle 1.1. Der Wirkungsquerschnitt für die

Vektormeson	m_V [GeV]	Γ_{ee} [keV]	$\frac{\gamma_V^2}{4\pi}(Q^2 = m_V^2)$
ρ^0	0.768	6.77	2.0
ω	0.782	0.60	23.1
ϕ	1.019	1.37	13.2
J/ψ	3.097	5.28	10.4
$\psi'(2S)$	3.686	2.14	30.6
Υ	9.460	1.33	126.3

Tabelle 1.1: *Übersicht über die VMD-Kopplungskonstanten. Die Werte der Massen und der leptonischen Zerfallsbreiten sind aus [PDG94].*

Vektormesonproduktion hängt mit dem elastischen Vektormeson–Proton–Wirkungsquerschnitt zusammen [Bau78].

$$\sigma(\gamma p \to V p') = \alpha \frac{4\pi}{\gamma_V^2}\sigma(Vp \to Vp')$$

Für die Kopplungskonstante γ_V ist zu berücksichtigen, daß das am Zerfall beteiligte Vektormeson virtuell ist ($Q^2 = m_V^2$). Das wird im VMD–Modell durch den Vektormeson–Propagator $D_V(Q^2)$ der VMD–Kopplung [Sak69, Don78] berücksichtigt,

$$D_V(Q^2) = \frac{1}{Q^2 + m_V^2 - \Pi_V(Q^2)}$$

wobei der Anteil $\Pi_V(Q^2)$ den Propagator modifiziert, um die starke Kopplung des Vektormesons an Hadronen zu beschreiben. Die Bedingung $\Re e\ \Pi_V(Q^2) = 0$ gibt die Normierung der Kopplungskonstante vor, während im Imaginärteil

$$\Im m\ \Pi_V(Q^2) = m_V \Gamma_V^{had}(Q^2)$$

die hadronische Zerfallsbreite eingeht. Dies führt beim ρ–Meson zu einer nicht vernachlässigbaren Korrektur der VMD–Kopplung von 10 %, die durch Interpolation zu reellen Photonen ($Q^2 = 0$) entsteht (siehe [Bau78]).

$$\widetilde{\gamma_V^2}(Q^2 = 0) = \gamma_V^2(Q^2 = m_V^2)\left[1 - \frac{\Pi(0)}{m_\rho^2}\right] = \gamma_V^2(Q^2 = m_V^2)\left[1 + 0.48\frac{\Gamma_\rho}{m_\rho}\right]$$

Die Interpolation zum reellen Photon ergibt beim J/ψ–Meson wegen der geringen hadronischen Zerfallsbreite eine vernachlässigbare Korrektur. Deswegen kann $\Pi_V(Q^2) = 0$ gesetzt werden (*narrow–width–approximation*). Es vereinfacht sich die Q^2–Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts zu [Sak69]:

$$\frac{\sigma_T^{\gamma p}(Q^2)}{\sigma_T^{\gamma p}(0)} = \left[\frac{m_{J/\psi}^2}{m_{J/\psi}^2 + Q^2}\right]^2 \tag{1.5}$$

$\sigma_T^{\gamma p}(Q^2)$ steht für den Wirkungsquerschnitt transversal polarisierter Photonen. Wenn virtuelle Photonen beteiligt sind, kann logitudinale Polarisation auftreten. Sakurai [Sak69] sagt für das VMD–Modell folgendes Verhältnis zwischen logitudinalem und transversalem γp–Wirkungsquerschnitt voraus:

$$R(Q^2) = \frac{\sigma_L^{\gamma p}(Q^2)}{\sigma_T^{\gamma p}(Q^2)} = \frac{Q^2}{m_{J/\psi}^2} \tag{1.6}$$

1.3.1 Der Zusammenhang zwischen ep- und γp–Wirkungsquerschnitt

Der einlaufende Elektronenstrahl emittiert Photonen, die mit dem Proton wechselwirken. Für kleine Q^2–Werte gibt die Weizsäcker–Williams–Näherung [Wei34, Wil34, Bud75] die Wahrscheinlichkeit an, in der Umgebung des Elektrons ein Photon mit dem Energieanteil $\frac{E_\gamma}{E_e}$ und der Virtualtät Q^2 vorzufinden. In der WWA–Näherung läßt sich der Wirkungsquerschnitt der ep–Streuung durch einen äquvalenten Photonfluß F_γ ausdrücken:

$$\frac{d^2\sigma_{ep}}{dy\ dQ^2} = \frac{d^2\mathcal{F}_\gamma}{dy\ dQ^2} \cdot \sigma_{\gamma p} = \frac{d^2\mathcal{F}_\gamma^T}{dy\ dQ^2}\sigma_{\gamma p}^T + \frac{d^2\mathcal{F}_\gamma^L}{dy\ dQ^2}\sigma_{\gamma p}^L \tag{1.7}$$

Der Flußfaktor $d\mathcal{F}_\gamma$ hat sowohl transversale $d\mathcal{F}_\gamma^T$ als auch longitudinale $d\mathcal{F}_\gamma^L$ Anteile. Für die Bestimmung des ep–Wirkungsquerschnitts muß zusätzlich die Q^2–Abhängigkeit des transversalen und longitudinalen γp–Wirkungsquerschnitts berücksichtigt werden. Das VMD–Modell macht dazu die Vorhersagen nach den Gleichungen 1.5 und 1.6. Die longitudinalen Anteile gehen beim Streuprozeß für $Q^2 \to 0$ im Fall der Photoproduktion gegen Null.
Der ep–Wirkungsquerschnitt berechnet sich aus der Faltung der Flußfaktoren mit dem γp–Wirkungsquerschnitt,

$$\sigma_{ep} = \int_{y_{min}}^{y_{max}} dy \int_{Q^2_{min}}^{Q^2_{max}} dQ^2 \left(\frac{d^2\mathcal{F}_\gamma^T}{dy\ dQ^2} + \frac{d^2\mathcal{F}_\gamma^L}{dy\ dQ^2} \frac{Q^2}{m^2_{J/\psi}} \right) \left[\frac{m^2_{J/\psi}}{m^2_{J/\psi} + Q^2} \right]^2 \cdot \sigma_{\gamma p}(W_{\gamma p}) \tag{1.8}$$

wobei

$$Q^2_{min} = m_e^2 \cdot \frac{y^2}{1-y}$$

von y abhängig ist. Die kinematischen Grenzen für die Integration werden im Anhang A.1 hergeleitet. Die Flußfaktoren $d\mathcal{F}^T$ und $d\mathcal{F}^L$ zeigen das für das Photonspektrum typische $\frac{1}{y}$- und $\frac{1}{Q^2}$–Verhalten im Fall $y \to y_{min}$ und $Q^2 \to Q^2_{min}$.

$$d\mathcal{F}^T = \frac{dy dQ^2 \alpha}{2\pi y Q^2} \cdot \left(1 + (1-y)^2 - 2m_e^2 \frac{y^2}{Q^2} \right) \tag{1.9}$$

$$d\mathcal{F}^L = \frac{dy dQ^2 \alpha}{2\pi y Q^2} \cdot (2(1-y)) \tag{1.10}$$

1.4 Die diffraktive J/ψ–Proton–Streuung

In dieser Arbeit wird die elastische J/ψ–Erzeugung im Schwerpunktenergiebereich von 30 bis 150 GeV behandelt. Dazu wurde im vorherigen Abschnitt 1.3 der Übergang vom Photon in das Vektormeson erläutert. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der diffraktiven Streuung des Vektormesons am Proton. Zusätzlich geben die Abschnitte 1.5 und 1.6 einen Überblick zu den Ansätzen der QCD–Störungsrechnung.

1.4.1 Der diffraktive Hadron–Hadron–Streuprozeß

Die bisherigen Messungen haben gezeigt, daß die elastische Streuung diffraktiv ist. Dies wurde aus Experimenten der Photoproduktion mit reellen Photonen und durch Myonstreuexperimente bis zu einer maximalen Schwerpunktenergie von

$\sqrt{s} = 22\,\text{GeV}$ [NMC94] bestätigt. Es ist naheliegend, die Vorhersagen des diffraktiven Modells bis zu einer für HERA typischen mittleren γp–Schwerpunktenergie von 100 GeV zu interpolieren.
Der diffraktive Streuprozeß kann analog zur optischen Streuung an einer kreisförmigen Apertur mit gaußförmiger Umrandung durch folgende Streuamplitude beschrieben werden:

$$\frac{d\sigma/dt}{(d\sigma/dt)_{t=0}} = e^{bt} \cong 1 - b(p\theta)^2 \tag{1.11}$$

Ein Vergleich der Streuamplitude mit der Intensitätsverteilung der optischen Streuung liefert einen Zusammenhang zum Steigungs-Parameter b und dem Wechselwirkungsradius R [Gou83] :

$$b = \frac{R^2}{4}$$

Regge–Phänomenologie

Die Regge–Phänomenologie beschreibt die weiche Hadron–Hadron–Streuung mit dem Austausch von *Regge*–Trajektorien [Reg59]. Unter der Regge–Trajektorie α_R versteht man eine lineare Funktion von t:

$$\alpha_R(t) = \alpha_0 + \alpha'(t) \cdot t$$

$\alpha_R(t)$ kann als eine Verallgemeinerung des Drehimpulses interpretiert werden. Für den unphysikalischen Bereich $t > 0$ gibt $\alpha_R(m^2)$ den Spin von Teilchen an, die auf der Trajektorie liegen [Per82].
Für Hadron–Hadron–Streuung macht die Regge–Theorie folgende Vorhersage [Gou83]:

$$\sigma_{tot}^{AB} = \sum_R \beta_{AR}(0)\beta_{BR}(0)s_{AB}^{\alpha_R(0)-1}$$

$\sqrt{s_{AB}}$ ist die Schwerpunktenergie des Streuprozesses zwischen Hadron A mit Hadron B. Die Summation $\sum_R$ erfolgt über alle in Betracht kommenden Trajektorien. Die Kopplungen $\beta_{AR}(t)$ und $\beta_{BR}(t)$ zwischen Hadron und Trajektorie sind voneinander unabhängig und erlauben eine Faktorisierung der Beiträge von den verschiedenen Vertizes.
Aus experimentellen Beobachtungen wurde $\alpha_\rho(0) \approx 0.5$ für die ρ–Trajektorie bestimmt [Don92]. Der Beitrag dieser Trajektorie liefert ein $1/\sqrt{s}$ Abfallen des Wirkungsquerschnitts. Dieser Beitrag verschwindet bei $s \to \infty$.

Die Pomeron-Trajektorie

Um das Ansteigen der elastischen Hadron–Hadron–Wirkungsquerschnitte bei größeren Schwerpunktenergien ($\sqrt{s} > 30$ GeV) zu erklären, wird eine Trajektorie mit

$\alpha_0 \gtrsim 1$ benötigt. Als einzige Trajektorie erfüllt die *Pomeron*–Trajektorie diese Anforderung

$$\alpha_{\mathbb{P}} = 1 + \epsilon + \alpha'_{\mathbb{P}} \cdot t \quad ,$$

die definiert ist durch folgende Parameter:
Aus mehreren Hadron–Hadron–Streuexperimenten wurde

$$\epsilon = 0.0808 \;\text{ und }\; \alpha'_{\mathbb{P}} = 0.25\,\mathrm{GeV}^{-2}$$

bestimmt [Lan90], [Don92].
Der totale Hadron–Hadron–Wirkungsquerschnitt läßt sich in Reggeon– und Pomeron–Beiträge zerlegen,

$$\sigma_{AB}^{tot} = X_{AB} s_{AB}^{\epsilon} + Y_{AB} s_{AB}^{-\eta} \tag{1.12}$$

wobei $\eta = 0.4545$ und $\epsilon = 0.0808$ aus der Anpassung an Hadron–Hadron–Streuexperimente bei Schwerpunktenergien bis $\sqrt{s} = 20\,\mathrm{GeV}$ gewonnen wurden [Don92].
Donnachie und Landshoff geben für den totalen Photon–Proton–Wirkungsquerschnitt folgendes Verhalten in Abhängigkeit von der Schwerpunktenergie an [Don92]:

$$\sigma_{\gamma p}^{tot} = 0.677 s^{\epsilon} + 0.129 s^{-\eta}$$

wobei ϵ und η dieselben Werte wie in der Hadron–Hadron–Streuung sind. Die Experimente H1 und ZEUS stimmen in ihren Messungen weitgehend mit dieser Vorhersage überein.

Experiment	$W_{\gamma p}$ [GeV]	$\sigma_{\gamma p}^{tot}$ μb
H1 [Ahm93]	195	159 ± 20
ZEUS [Der94]	180	143 ± 17
Vorhersage [Don92]	190	158

Tabelle 1.2: *Vergleich von $\sigma_{\gamma p}^{tot}$ zwischen der Messung von H1 und ZEUS und der Vorhersage von [Don92].*

Die diffraktive elastische Streuung

Man kann annehmen, daß bei den bei HERA erreichbaren Schwerpunktenergien die Eigenschaften der Pomeron–Trajektorie auch den Anstieg des Wirkungsquerschnitts für die J/ψ–Proton–Streuung bestimmen:

$$\sigma(W_{\gamma p}^2) \propto s^{2\epsilon} = W_{\gamma p}^{4\epsilon}$$

In Anlehnug an das optische Modell erwartet man, daß der Wirkungsquerschnitt exponentiell mit t abfällt (siehe Gleichung 1.11):

$$\frac{d\sigma}{dt} \propto e^{bt}$$

Der Abfall wird durch den Steigungsparameter

$$b(W_{\gamma p}^2) = b(W_0^2) + 2\alpha'_{I\!P} \ln\left(\frac{W_{\gamma p}^2}{W_0^2}\right)$$

parameterisiert. Das diffraktive Modell macht zu den Parametern W_0 und b keine Vorhersagen. Diese werden aus experimentellen Daten gewonnen (vergleiche dazu



Abbildung 1.5: *Der totale γp-Wirkungsquerschnitt in Abhängigkeit von $W_{\gamma p}$ im Vergleich zur elastischen Photoproduktion von ρ, ω, ϕ und J/ψ–Vektormesonen. Die von HERA gemessenen Wirkungsquerschnitte wurden aus den Daten des Jahres 1993 gewonnen [Der94a].*

Abschnitt 3.1.3). Das Regge–Modell macht nur Vorhersagen über den Anstieg von b mit $2\alpha'_{I\!P} \ln(W^2_{\gamma p})$. Dieses Ansteigen von b wird *shrinkage* genannt.

Die diffraktive Dissoziation des Protons



Abbildung 1.6: *Die M_x^2–Verteilung aus experimentellen Daten der pd–Streuung (aus [Gou83]).*

Die diffraktive Dissoziation des Protons zählt zum σ_{SD}–Anteil (vergleiche mit Abb. 1.4 (c)), bei dem nur einer der Reaktionspartner elastisch gestreut wird:

$$J/\psi^\star + p \rightarrow J/\psi + X$$

Der differentielle Wirkungsquerschnitt $d\sigma/dM_x^2$ und der Steigungsparameter b_{SD} bekommen folgende $\frac{1}{M_x^2}$–Abhängigkeit:

$$\frac{d^2\sigma}{dt\; dM_x^2} \propto e^{b_{\mathrm{SD}} t}\, \frac{f_p(M_x^2)}{M_x^2}$$

mit

$$b_{SD}(W^2_{\gamma p}, M_x^2) = b_{SD}(W_0^2, M_0^2) + 2\alpha'_{I\!P} \left(\ln \frac{W^2_{\gamma p}}{W_0^2} - \ln \frac{M_x^2}{M_0^2} \right).$$

Die Funktion $f_p(M_x^2)$ berücksichtigt eine Region von $N^\star$–Anregungen für $M_x^2 <$ 4 GeV^2 (vergleiche mit Abbildung 1.6). Da der Steigungsparameter b_{SD} von M_x^2 abhängig ist, läßt er sich nur für ein mittleres M_0 bestimmen (siehe Abschnitt 3.1.3).

1.5 J/ψ–Erzeugung durch Photon–Gluon–Fusion



(a) **(b)**

Abbildung 1.7: *J/ψ–Erzeugung durch Photon–Gluon–Fusion im Colour–Singlet–Modell: Die Abbildung (a) zeigt den Graphen in der ep–Streuung. Das einlaufende Photon erzeugt mit dem Gluon g ein Farbe tragendes Charm-Anticharm-Paar, welches durch die Abstrahlung eines weiteren Gluons g' zum farbneutralen Bindungszustand (dem J/ψ–Meson) übergeht. Abbildung (b) zeigt die Kinematik des Prozesses im γ–Gluon–Schwerpunktsystem.*

Bisher wurde die elastische J/ψ–Erzeugung durch das diffraktive Modell behandelt. Es gibt auch Versuche, diesen Prozeß durch QCD–Modelle mit Hilfe der Photon–Gluon–Fusion zu beschreiben [Jun93, Rys93]. Dies ist möglich, da der Kopplungsparameter der starken Wechselwirkung α_s bei der J/ψ–Masse klein genug ist, um Störungsrechnung durchführen zu können ($\alpha_s(4m_c^2) \approx 0.25$).
In der Photon–Gluon–Fusion wechselwirkt das einlaufende Photon mit einem Gluon aus dem Proton, und es entstehen ein *Charm*– und *Anticharm*–Quark (siehe Abbildung 1.7). Ein farbneutrales J/ψ-Vektormesons kann erst durch die Abstrahlung eines weiteren Gluons entstehen (siehe 1.7 (a)). Im sogenannten *Colour–Singlet–Modell* wird die J/ψ–Erzeugung durch folgende Reaktion beschrieben:

$$\gamma(q) + g(x_g P) \rightarrow J/\psi(p_{J/\psi}) + g'(g_2) \qquad (1.13)$$

Für das einlaufende Gluon g gilt, daß es kollinear zum Proton den Impulsanteil x_g am Protonimpuls trägt. In der nicht–relativistischen Näherung verteilt sich der Impuls des J/ψ-Mesons zu gleichen Anteilen auf die Impulse der schweren Quarks.

$$p_c = \frac{p_{J/\psi}}{2}$$

Folgende drei Invarianten sind im Colour–Singlet–Modell definiert:

$$\begin{array}{lll} s & = s_1 - M^2 := & (p_{J/\psi} + g_2)^2 \\ t & = t_1 - M^2 := & (p_{J/\psi} - q)^2 \\ u & = u_1 - M^2 := & (p_{J/\psi} - x_g P)^2 \end{array}$$

$M = m_{J/\psi}$ ist die Masse des J/ψ–Mesons und die Größen $p_{J/\psi}$, $x_g P$ und g_2 sind durch die Reaktion 1.13 im γ–Gluon–Schwerpunktsystem definiert. Der Wirkungsquerschnitt lautet nach der Mittelung über die Farben und Spins [Ber81]:

$$\frac{d\sigma}{dt} = \frac{4}{3}\frac{\alpha_s^2 \alpha e_c^2}{s}\ A_{J/\psi}^2 M^2 (4\pi)^2 \cdot \frac{s_1^2 s^2 + t_1^2 t^2 + u_1^2 u^2}{s^2 t^2 u^2}$$

Dabei ist $e_c^2 = 4/9$ die Ladung des *Charm*–Quarks zum Quadrat und $M = m_{J/\psi}$ die Masse des J/ψ–Mesons. Die Normierungskonstante $A_{J/\psi}^2$ hängt über folgende Beziehung mit der Wellenfunktion des J/ψ-Teilchens am Ursprung zusammen:

$$A_{J/\psi} = \sqrt{\frac{2|\psi(0)|^2}{M}}$$

und läßt sich durch die leptonische Zerfallsbreite ausdrücken:

$$\Gamma_{ee}(J/\psi \to e^+ e^-) = \frac{8\pi\alpha^2 e_c^2 A_{J/\psi}^2}{M} = \frac{16\pi\alpha^2 e_c^2}{m_{J/\psi}^2} \cdot |\psi(0)|^2$$

Damit sind alle Parameter einschließlich der Normierung im Colour–Singlet–Modell festgelegt.

1.5.1 Der Übergang zum elastischen Grenzfall

Der Gültigkeitsbereich des Colour–Singlet–Modells wird vom Transversalimpuls $p_{T,J/\psi}^{\gamma g}$ im Photon–Gluon–Ruhesystem (siehe Abbildung 1.7 (b)) und z bestimmt:

$$s_{\gamma g} = s_1 - M^2 = \frac{M^2(1-z)}{z} + \frac{p_{T,J/\psi}^2}{z(1-z)}$$

Im Fall $z < 0.9$ (inelastischer Fall) kann ein hartes Gluon g_2 entgegengesetzt zum J/ψ abgestrahlt werden. Für $z \to z_{max} = 1 - \frac{|t|}{ys} \approx 1$ (elastischer Fall) erreicht das Matrixelement einen endlichen Wert, wobei ein sehr weiches Gluon g_2 emittiert wird. In [Ber81] wird eine minimale Schwerpunktenergie $W_0 = 2$ GeV im Endzustand gefordert,

$$(g_2 + (1 - x_g)P)^2 = m_x^2 \geq W_0^2$$

weil im elastischen Grenzfall Kohärenzeffekte mit dem Protonrest ($N^\star$–Anregungen) im Endzustand nicht berücksichtigt werden. Dadurch ist das Colour–Singlet–Modell

nur im Bereich $z < 0.9$ mit einem *harten* Gluon g_2 im Endzustand gültig und es muß ein minimaler Transversalimpuls des J/ψ–Mesons $p_{T,J/\psi}^{\gamma g} \geq 1\,\mathrm{GeV}$ gefordert werden. Der Vergleich des differentiellen Wirkungsquerschnitts zu den experimentellen Ergebnissen zeigt für $z < 0.9$ (inelastischer Fall) eine gute Übereinstimmung zwischen den Daten und der Vorhersage des Colour–Singlet–Modells [Den84, Bar87, Jun92]. Zur absoluten Normierung ist ein sogenannter k–Faktor nötig [Jun92], der durch QCD-Korrekturen höherer Ordnung[Zun94] und durch relativistische Korrekturen zum Colour–Singlet–Prozeß [Jun93] berechnet werden kann.
Im elastischen Grenzfall ($z \to 1$) führen die QCD–Korrekturen zum Colour–Singlet–Modell zu einer Verminderung des Wirkungsquerschnitts. In diesem Grenzfall verliert das Modell seine Gültigkeit [Zun94].
Erst im Bereich $Q^2 \gg 0$ können QCD–Rechnungen zur elastischen J/ψ–Produktion durchgeführt werden, da nun Q^2 die Skala für die starke Kopplung α_s dominiert. Dies wird in Abschnitt 1.6 behandelt.

1.6 J/ψ–Produktion im Bereich $Q^2 \gg 0$

HERA ermöglicht die Untersuchung der J/ψ–Produktion sowohl in der Photoproduktion $Q^2 \to 0$ als auch in DIS. Im VMD–Modell wird der Übergang von $Q^2 = 0$ zu $Q^2 \neq 0$ durch den Propagator D_V berücksichtigt (siehe Abschnitt 1.3). Dies führt zu einer Unterdrückung des Wirkungsquerschnitts durch den VMD–Formfaktor (Gleichung 1.14).

$$\sigma_{\gamma p}^T(Q^2) = \sigma_{\gamma p}^T(0)\ \left[1 + \frac{Q^2}{m_\Lambda^2}\right]^{-2} \tag{1.14}$$

Die Myonstreuexperimente BPF, EMC und NMC [Cla79, EMC83, NMC94] haben

Experiment	Elastizitätsbedingung	E_γ [GeV]	m_Λ [GeV]
BPF [Cla79]	$E_{had} < 4.5\,\mathrm{GeV}$	40 – 170	2.7 ± 0.5
EMC [EMC83]	$z > 0.95$	60 – 120	2.9 ± 0.3
		120 – 200	3.6 ± 0.6
	$z < 0.95$	60 – 120	2.3 ± 0.2
		120 – 200	2.7 ± 0.3
NMC [NMC94]	$z > 0.97$	60 – 240	3.2 ± 0.6

Tabelle 1.3: *Übersicht über die gemessene m_Λ-Skala des VMD–Propagatorterms in der virtuellen J/ψ–Photoproduktion.*

den Skalenfaktor m_Λ im Bereich $Q^2 < 10\,\mathrm{GeV}^2$ bestimmt (siehe Tabelle 1.3). Dieser

ist mit $m_{J/\psi}$ verträglich.
Im Bereich $Q^2 > 10\,\mathrm{GeV}^2$ wird wegen $\sigma^L_{\gamma p}(Q^2) \propto Q^2 \sigma^T_{\gamma p}(Q^2)$ der transversale Beitrag stärker als der longitudinale Beitrag des Wirkungsquerschnitts unterdrückt (siehe Gleichung 1.6). Ein vereinfachter Ansatz berücksichtigt die Kopplung von Quarks am virtuellen Photon $\gamma^\star$ (siehe Abbildung 1.8). Nach der Annahme von Donnachie



Abbildung 1.8: *Diagramm für $\gamma^\star p \to Vp$ bei großem Q^2. Die mit dem Pfeil gekennzeichnete Quarklinie ist weit von der Massenschale entfernt (Abb. aus [Don87]).*

und Landshoff verhält sich das Pomeron wie ein $C = +1$ *isoskalares* Photon, welches nahezu punktförmig an Valenzquarks koppelt [Don87]. Dieses einfache Modell sagt ein Q^{-4}–Verhalten für den Erzeugungswirkungsquerschnitt voraus.
Es gibt außerdem Versuche, den Pomeronaustausch zwischen dem $c\bar{c}$–Quarkpaar und dem Proton durch ein farbloses Gluonsystem zu ersetzten [Rys93]. Die Skala $\bar{q}^2$, bei der QCD–Störungsrechnung durchgeführt wird, ist durch die J/ψ–Masse und Q^2 dominiert

$$\bar{q}^2 := \frac{1}{4}(m^2_{J/\psi} + Q^2 - t)\ . \tag{1.15}$$

Außerdem wird die Vorhersage gemacht, daß der Wirkungsquerschnitt quadratisch von $\bar{x}G(\bar{x}, \bar{q}^2)$ abhängt [Rys93, Rys94, Bro94]

$$\frac{d\sigma_T}{dt} \propto \left[\frac{2\bar{q}^2 + t}{(2\bar{q}^2)^3}\ F_N^{2G}(t) \cdot \bar{x}G(\bar{x}, \bar{q}^2)\right]^2\ . \tag{1.16}$$

Es ist zu berücksichtigen, daß $\bar{x}$ von der Skala $\bar{q}^2$ abhängig ist

$$\bar{x} := \frac{4\bar{q}^2}{2P_p q}\ .$$

Die Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts von der Gluondichte wird zusätzlich durch einen Zwei–Gluon–Formfaktor $F_N^{2G}(t)$ bestimmt [Rys93]. Dieser wurde zur Beschreibung des Korrelationsverhaltens von zwei Gluonen im Proton eingeführt. Er ist nur für den Fall $t = 0$ bekannt ($F_N^{2G}(t = 0) = 1$).
Desweiteren zeigen diese QCD–Rechnungen folgendes Q^2–Verhalten:

$$\lim_{Q^2 \to \infty} \frac{d\sigma_T}{dt} \sim \frac{1}{Q^8} \tag{1.17}$$

Für den Wirkungsquerschnitt longitudinal polarisierter Photonen gilt [Bro94, Kru95]:

$$\lim_{Q^2 \to \infty} \frac{d\sigma_L}{dt} = \lim_{Q^2 \to \infty} \frac{Q^2}{m_{J/\psi}^2} \cdot \frac{d\sigma_T}{dt} \sim \frac{1}{Q^6} \tag{1.18}$$

1.7 Winkelverteilung der Leptonen aus dem Zerfall des J/ψ–Mesons

Beim Zerfall des J/ψ–Mesons in ein Leptonpaar (e^+e^-) oder ($\mu^+\mu^-$) folgen die Zerfälle einer bestimmten Zerfallswinkelverteilung. Zur Berechnung der Zerfallswinkelverteilung muß eine Lorentz–Transformation vom Laborsystem in das γp–Schwerpunktsystem (sog. *Helicity Frame* [Bau78]) und von dort aus in das J/ψ–Schwerpunktsystem erfolgen. Der Viererimpuls des J/ψ–Mesons im γp–Schwerpunktsystem dient als Quantisierungsachse zur Messung von $\theta^\star$ (siehe Abbildung 1.9). Unter



Abbildung 1.9: *Darstellung des Zerfallswinkel $\theta^\star$ im J/ψ–Schwerpunktsystem. Als relevantes Bezugssystem dient das γp–Schwerpunktsystem, welches die Quantisierungsachse für $\theta^\star$ definiert.*

der Annahme, daß das Vektormeson im γp–Schwerpunktsystem die Helizität des Photons übernimmt (s–Kanal–Helizitätserhaltung), ist eine dafür charakteristische Zerfallswinkelverteilung der beiden Leptonen im J/ψ–Schwerpunktsystem zu erwarten. Folgende Zerfallswinkelverteilung gilt für den leptonischen Zerfall in Spin–1/2–Teilchen im J/ψ–Schwerpunktsystem[Sch73]:

$$\frac{d\Gamma}{d\Omega} \propto (1-\rho)\sin^2\theta^\star + \rho\frac{1+\cos^2\theta^\star}{2} \tag{1.19}$$

ρ ist der transversale Anteil am gesamten γp–Wirkungsquerschnitt.

Kapitel 2

Das H1–Experiment

2.1 Der Elektron–Proton–Speicherring HERA

Mit der Elektron–Proton–Speicherringanlage HERA werden 27.55 GeV Positronen mit 820 GeV Protonen in zwei Wechselwirkungspunkten frontal zur Kollision gebracht. Der nördliche Wechselwirkungspunkt ist vom H1-Detektor und der südliche Wechselwirkungspunkt vom ZEUS-Detektor umgeben. Die Schwerpunktenergie beträgt $\sqrt{s} = 300$ GeV. Um bei Experimenten mit ruhenden Proton die HERA-Schwerpunktenergie zu erreichen, wäre ein Elektron– oder Positronstrahl von ≈ 48 TeV notwendig. Folgende technische Parameter wies HERA 1994 auf:



Abbildung 2.1: Die Speicherringanlage HERA und ihre Vorbeschleuniger

Parameter	1994		Einheiten
	HERA e^- (e^+)	HERA (p)	
Strahlenergie	27.55	820	GeV
Anzahl der Teilchenpakete	168	170	
Teilchenzahl je Paket	$\approx 5 \times 10^{10}$		
Anzahl kollidierender Pakete	153		
Zeit zwischen zwei Kollisionen	96		ns
mittlerer Strahlstrom	17	41	mA
Strahllebensdauer	6 – 10	50 – 100	h
spezifische Luminosität	5×10^{29}		$cm^{-2}/(mA^2 \cdot s^2)$
erzeugte Luminosität	0.95 (4.98)		$(\text{pbarn})^{-1}$

Tabelle 2.1: *Technische Daten von HERA 1994*

2.2 Koordinatensystem

In dieser Arbeit wird das Koordinatensystem des H1-Experimentes verwendet. Der Ursprung des rechtshändigen Koordinatensystems liegt im ep–Wechselwirkungspunkt. Die z–Achse folgt dem Protonstrahl in Vorwärtsrichtung und die horizontale x–Achse zeigt zum Kreismittelpunkt von HERA.



Abbildung 2.2: Das H1-Koordinatensystem

2.3 Der H1–Detektor

Der H1–Detektor (siehe Abbildung 2.3) ist ein komplexes Nachweisgerät für ep–Kollisionen bei HERA. Die Vielfalt der zu erwarteten Teilchen aus einer ep–Kollision erfordert zu deren Nachweis das Zusammenspiel verschiedener Detektorkomponenten. Eine umfassende Beschreibung des H1–Detektors ist in [Abt93] zu finden. Es werden nur Komponenten des Detektors beschrieben, die in dieser Arbeit wichtig sind.

Das Spurkammersystem

Die Spurkammern $\boxed{2}$ und $\boxed{3}$ umgeben das Strahlrohr $\boxed{1}$ im ep–Wechselwirkungsbereich und überdecken einen Polarwinkel von $5° < \theta < 160°$. Sie befinden sich in einem longitudinalen homogenen Magnetfeld ($\Delta B/B < 2\%$) von 1.12 T . Dies ermöglicht die Messung von Ladung und Impuls geladener Teilchen.
Die zentralen Spurkammern $25° < \theta < 160°$ erlauben die $r\phi$–Messung durch die innere und äußere Driftkammer (CJC1, CJC2). 1994 betrug die Auflösung für die CJC1– und CJC2–Kammer in der $r\phi$–Ebene $\sigma_{r\phi} = 145\mu m$. Die z–Koordinate konnte mit einer Auflösung von $\sigma_z \approx 2$ cm durch Ladungsteilung ermittelt werden. Die z–Messung wird durch die z–Kammern (innere (CIZ) und äußere z–Kammer (COZ)) bis zu einer Auflösung von 300 μm verbessert. Es wird eine Genauigkeit in der Impulsauflösung von $\sigma_P/P^2 \simeq 0.5\%/\,\mathrm{GeV}^2$ erreicht.
Weiterhin sichern schnelle Vieldrahtproportionalkammern (zentrale MWPCs) die notwendige Zeitauflösung für den Trigger.
In Vorwärtsrichtung sind drei Spurkammermodule hintereinander entlang der z–Achse angeordnet, die je aus einer radialen Driftkammer ($\sigma_\phi = 170\mu$m), einer Vieldrahtproportionalkammer (FMWPC) und einer planaren Driftkammer mit einer Auflösung von 210 μm bestehen.

Das Kalorimeter

Alle Spurkammerdetektoren werden von einem fein segmentierten Flüssig–Argon–Kalorimeter (LAC) umgeben, das sich in einem Kyrostaten $\boxed{15}$ innerhalb der Magnetspule befindet. Zur Abdeckung eines möglichst großen Raumwinkelbereichs wird das LAC ($5° < \theta < 157°$) in durch ein Vorwärts–Kalorimeter (PLUG) $\boxed{13}$ ($3.3° < \theta < 4°$) und durch ein Rückwärts–Kalorimeter (BEMC) $\boxed{12}$ ($154° < \theta < 177°$) ergänzt.
Beim Flüssig–Argon–Kalorimeter handelt es sich um ein *sampling*–Kalorimeter. Der elektromagnetische Teil $\boxed{4}$ besteht aus Bleiplatten als Absorbermaterial und hat eine totale Dicke von 20 – 30 Strahlungslängen X_0. Das aktive Medium ist flüssiges Argon. Die durch Ionisation entstandene Ladung wandert in einem Hochspannungsfeld