UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
FACULTE DES SCIENCES

Mesure de la structure en hélicité de la réaction $e + p \to e + \rho + Y$ en fonction de t à HERA

Helicity structure measurement of the reaction $e + p \to e + \rho + Y$ as a function of t at HERA

Dissertation présentée en vue
de l'obtention du titre de
Docteur en Sciences

Caroline COLLARD

Octobre 2002

Foreword

This thesis has been presented in French. In order to reach a larger audience, I have translated in English the theoretical chapter (chaper 2) into appendix E. The analysis corresponding to chapters 4 to 6 is described in paper [27].

Résumé

Cette thèse porte sur l'étude de la production diffractive de mésons vecteurs ρ au collisionneur électrons-protons HERA situé sur le site du laboratoire DESY à Hambourg, et en particulier sur l'étude de la structure en hélicité de la réaction $e + p \to e + \rho + Y$, où Y est le proton diffusé (intact ou dissocié). Elle s'intègre dans la recherche d'une meilleure compréhension des interactions diffractives en physique des hautes énergies, et ce dans le cadre de la théorie chromodynamique quantique (QCD). Les données étudiées ont été accumulées pendant l'année 1997 par le détecteur H1 et correspondent à une luminosité intégrée de 6 pb^{-1}. Le domaine cinématique est défini par des valeurs de la virtualité Q^2 du photon intermédiaire comprises entre 2.5 et 60 GeV^2, une énergie W disponible dans le centre de masse photon-proton comprise entre 40 et 120 GeV et des valeurs de t', le carré de l'impulsion transverse transférée au proton, jusqu'à 3 GeV^2.

Le travail a consisté principalement en l'analyse des distributions des angles Φ, φ et $\cos\theta^*$, qui caractérisent la production et la désintégration du méson ρ, dans le système d'hélicité. Les mesures des éléments r^{04}_{00}, r^{04}_{1-1}, $r^5_{00} + 2r^5_{11}$ et $r^1_{00} + 2r^1_{11}$ de la matrice densité de spin du méson ρ ont été extraites pour cinq intervalles en t'. Une violation significative de la conservation de l'hélicité dans le canal s ($SCHC$) a été observée, les combinaisons $r^5_{00} + 2r^5_{11}$ et $r^1_{00} + 2r^1_{11}$ étant non nulles. Cette violation s'accentue avec t' et est associée à l'amplitude d'hélicité T_{01} correspondant à la production d'un méson ρ polarisé longitudinalement par un photon transverse. La mesure de l'élément r^{04}_{1-1} indique une légère déviation par rapport à $SCHC$ attribuée à l'amplitude T_{10} associée à la production d'un méson ρ polarisé transversalement par un photon longitudinal. L'élément r^{04}_{00} qui donne la probabilité que le méson ρ soit polarisé longitudinalement est essentiellement indépendant de t', ce qui implique des dépendances en t' similaires pour les amplitudes sans changement d'hélicité T_{00} et T_{11}. Ces comportements sont prédits par différents modèles théoriques basés sur une approche perturbative de la chromodynamique quantique. Un ajustement global du modèle de Ivanov et Kirschner aux mesures de cette thèse a conduit à l'estimation des deux paramètres de ce modèle : γ (la dimension anomale des gluons) $= 0.59 \pm 0.10$ et $\langle M \rangle$ (la masse effective de la paire $q\bar{q}$) $= 0.58 \pm 0.05$ GeV.

Abstract

The subject of this thesis is the study of diffractive ρ vector meson production at the electron-proton collider HERA, and in particular the study of the helicity structure of the reaction $e+p \to e + \rho + Y$, where Y is the (elastic or dissociated) scattered proton. This thesis is part of the search for a better understanding of diffractive interactions in high energy physics, in the frame of quantum chromodynamic (QCD). The data have been collected during the year 1997 by the H1 detector, corresponding to an integrated luminosity of 6 pb^{-1}. The kinematical domain is defined by a photon virtuality Q^2 comprised between 2.5 and 60 GeV^2, a hadronic centre of mass energy in the range $40 < W < 120$ GeV and the square of the transverse momentum transfered to the proton t' up to 3 GeV^2.

The work consists mainly in an analysis of the distributions of the angles Φ, φ and $\cos\theta^*$, which characterise ρ meson production and decay, in the helicity frame. A measurement of the ρ spin density matrix elements r^{04}_{00}, r^{04}_{1-1}, $r^5_{00} + 2r^5_{11}$ and $r^1_{00} + 2r^1_{11}$ has been extracted in 5 bins in t'. A significant violation of s channel helicity conservation ($SCHC$) has been observed, the combinations $r^5_{00} + 2r^5_{11}$ and $r^1_{00} + 2r^1_{11}$ being non-zero. This violation rises with t' and is associated to the helicity amplitude T_{01} corresponding to the production of a longitudinally polarised ρ meson by a transverse photon. The measurement of the r^{04}_{1-1} element indicates a small deviation from $SCHC$ due to the helicity amplitude T_{10} of the production of a transversally polarised ρ meson by a longitudinal photon. The r^{04}_{00} element, which gives the probability to find a longitudinally polarised ρ meson, is independent of t', indicating similar t' dependences for the amplitudes T_{00} and T_{11} without helicity change. Those behaviours are predicted by differents theoretical models based on a perturbative approach of quantum chromodynamic. A global fit of the model of Ivanov and Kirschner to the results of this thesis provides a measurement of the two parameters: the gluon anomalous dimension $\gamma = 0.59 \pm 0.10$ and the effective mass of the $q\bar{q}$ pair $\langle M \rangle = 0.58 \pm 0.05$ GeV.

Sommaire

Chapitre 1

Introduction

Ce travail se situe dans le cadre de l'étude de la diffraction en physique des hautes énergies. La diffraction, déjà bien connue dans le domaine de l'optique, a été largement étudiée en physique des particules élémentaires dans les années 1970. Les résultats des expériences hadrons-hadrons sur cible fixe étaient alors bien décrits par la théorie phénoménologique de Regge [1].

Dès le commencement de la prise de données au collisionneur électrons-protons (ep) HERA à DESY, où l'énergie dans le centre de masse avoisine 300 GeV, des événements dépourvus de particules dans une partie importante de l'espace de phase ($e+p \rightarrow e+X+p$) ont été observés pour des valeurs de la virtualité du photon intermédiaire, Q^2, supérieure à quelques GeV^2 [2]. Ce type d'événements appartient à la classe diffractive : à haute énergie, le photon émis par l'électron interagit avec le proton par l'échange d'un objet neutre de couleur, le pomeron.

Comprendre le mécanisme de l'interaction diffractive dans le cadre de la théorie des interactions fortes, la chromodynamique quantique (QCD), est une question fondamentale. En effet, la diffraction gouverne le comportement à haute énergie de la section efficace élastique et, grâce au théorème optique, celui de la section efficace totale pour les interactions hadrons-hadrons. On a observé que les sections efficaces $\bar{p}p$, pp, πp, Kp et γp augmentent lentement avec l'énergie $\sqrt{s}$ du centre de masse, pour $\sqrt{s} \geq 20$ GeV, suivant la loi de puissance $\sigma_{tot} \propto s^{0.08}$ associée à l'échange du pomeron [3]. Cette augmentation est toutefois incompatible à très haute énergie avec les bornes de Froissart provenant de la condition d'unitarité de la matrice S. Il est donc vital de comprendre comment la théorie QCD permet d'atténuer la croissance de la section efficace totale à très haute énergie.

L'étude des mésons vecteurs constitue un laboratoire précieux pour comprendre la nature du pomeron en terme de quarks et de gluons, le système X se réduisant au seul méson vecteur (VM). L'étude de la section efficace de production de mésons ρ, ω, ϕ, J/Ψ, Ψ', Υ ou de photons réels (processus DVCS) a déjà fait l'objet de plusieurs analyses par les expériences H1 [4–12] et ZEUS [13–26] à HERA, que ce soit en fonction de la virtualité Q^2 du photon, de l'énergie W du centre de masse $\gamma^{(*)}p$ ou du carré t de l'impulsion transférée au pomeron.

Dans cette thèse, nous nous concentrons sur l'étude de la structure en hélicité de la production de mésons vecteurs ρ dans le domaine cinématique $2.5 < Q^2 < 60 \ \mathrm{GeV}^2$, $40 < W <$

120 GeV et $t' < 3.$ GeV^2 [27], où $t' = |t| - |t|_{min}$ [1]. Celle-ci représente un élément important pour élucider le mécanisme de la diffraction dans le cadre de la théorie QCD puisqu'elle porte sur le transfert de moment cinétique. Dans les modèles [28–33] basés sur la théorie QCD perturbative, la réaction $\gamma + p \rightarrow VM + p$ est décrite comme suit : le photon fluctue en une paire $q\bar{q}$ formant un dipôle de couleur ; le dipôle interagit ensuite avec le proton par échange de deux gluons, qui modélise ainsi l'échange du pomeron ; le dipôle se recombine finalement pour former le méson vecteur. Pour que l'hélicité du méson vecteur soit différente de celle du photon, il faut que la paire de gluons modifie par un transfert d'impulsion transverse le moment angulaire orbital de la paire $q\bar{q}$ [31–33]. La confrontation des résultats aux prédictions des modèles permet de confirmer ou d'infirmer les hypothèses de base utilisées.

La mesure des éléments de la matrice densité de spin, extraits à partir de l'étude des distributions angulaires caractérisant la production et la désintégration du méson vecteur, permet d'accéder à l'hélicité du photon et à celle du méson. Cette thèse présente les résultats d'une telle analyse en fonction du carré t' de l'impulsion transverse transférée [27].

1.1 Mésons vecteurs

Un méson vecteur est un méson (particule formée d'un quark et d'un antiquark de valence) possédant les caractéristiques d'un vecteur sous Poincarré et antisymétrique sous les transformations de charge et de parité ($J^{PC} = 1^{--}$), les mêmes que celles du photon. Une liste exhaustive des mésons vecteurs connus est donnée à la référence [34]. Nous ne citons ici que les mésons vecteurs spécialement importants dans le cadre de cette thèse, à savoir les mésons légers ρ, ω, ϕ et ρ' et les mésons lourds J/Ψ et Υ, dont la masse M_{VM} et la largeur Γ_{VM} sont reprises à la table 1.1. Les mésons légers se désintègrent par interaction forte alors que les mésons lourds se désintègrent par interaction électrofaible. Pour le mésons ρ, le canal le plus important est $\rho^0 \rightarrow \pi^+\pi^-$, le taux de branchement étant supérieur à 99 %.

Méson vecteur	Masse (M_{VM})	Largeur (Γ_{VM})
ρ	771.1 MeV ± 0.9 MeV	149.2 MeV ± 0.7 MeV
ω	782.57 MeV ± 0.12 MeV	8.44 MeV ± 0.09 MeV
ϕ	1019.46 MeV ± 0.02 MeV	4.26 MeV ± 0.05 MeV
ρ'	1465 MeV ± 25 MeV	310 MeV ± 60 MeV
ρ'	1700 MeV ± 20 MeV	240 MeV ± 60 MeV
J/Ψ	3096.87 MeV ± 0.04 MeV	87 keV ± 5 keV
Υ	9460.30 MeV ± 0.26 MeV	52.5 keV ± 1.8 keV

Table 1.1: Liste des mésons vecteurs importants pour cette thèse, les valeurs des masses et largeurs sont tirées de la référence [34].

La production diffractive de mésons vecteurs (VM)

$$e + p \rightarrow e + VM + Y \tag{1.1}$$

[1]La variable $|t|_{min}$ est définie plus loin aux équations 1.7 et 1.8.

est présentée à la figure 1.1 où le proton diffusé Y peut soit rester intact soit se dissocier en un système hadronique de petite masse M_Y ($M_Y \ll W$, où W est l'énergie disponible dans le centre de masse $\gamma^{(*)}p$). Dans le premier cas, on parle de diffusion élastique, dans le second d'interaction avec dissociation du proton.



Figure 1.1: Production exclusive de mésons vecteurs (VM) par interaction électron-proton.

L'échange d'un pomeron ($I\!P$), objet neutre de couleur et portant les nombres quantiques du vide ($J^{PC} = 0^{++}$), a lieu entre le proton et le photon émis par l'électron. Il peut être décrit à l'ordre le plus bas dans une approche perturbative de la théorie QCD (pQCD) par un échange de deux gluons [2] [28,29]. Les calculs en théorie QCD perturbative ne sont valables qu'en présence d'une échelle "dure", correspondant à un processus d'interaction caractérisé par de petites distances et une petite valeur de la constante de couplage forte $\alpha_S \ll 1$. Différentes échelles dures sont possibles : la virtualité Q^2 du photon, la masse m_q d'un des quarks constituants du méson vecteur ou le carré t de l'impulsion transférée au pomeron.

1.2 Cinématique

Les variables k, k', p, p' et $q = k - k'$ représentées sur la figure 1.1 sont respectivement les quadri-impulsions de l'électron incident, de l'électron diffusé, du proton incident, du système

[2] Ce qui est en accord avec le résultat expérimental que le pomeron est constitué majoritairement de gluons à HERA [35].

Y et du photon intermédiaire. Elles permettent de définir la cinématique de la réaction 1.1 :

$$\begin{aligned}
s &= (p+k)^2 \\
W^2 &= (p+q)^2 \\
Q^2 &= -q^2 \\
x &= \frac{-q^2}{2p \cdot q} \\
y &= \frac{p \cdot q}{p \cdot k} \\
t &= (p-p')^2 \\
x_{I\!P} &= \frac{q \cdot (p-p')}{q \cdot p} = \frac{Q^2 + M_{VM}^2 - t}{Q^2 + W^2 - m_p^2} \\
\beta &= \frac{x}{x_{I\!P}} = \frac{-q^2}{2q \cdot (p-p')} = \frac{Q^2}{Q^2 + M_{VM}^2 - t}. \qquad (1.2)
\end{aligned}$$

La variable s est le carré de l'énergie du centre de masse ep alors que W est l'énergie disponible dans le centre de masse $\gamma^{(*)}p$. La virtualité Q^2 du photon est égale à l'opposé du carré de la quadri-impulsion de celui-ci. Les variables x et y sont les invariants de Bjorken. Dans le référentiel de Breit (référentiel où le proton est en mouvement rapide, où le photon est de type purement espace et où la composante longitudinale de l'impulsion du quark touché change de signe lors de l'interaction), x est la fraction d'impulsion du proton portée par le quark intervenant dans l'interaction. Dans le référentiel du proton au repos, y représente la fraction d'énergie de l'électron incident emportée par le photon.

Pour décrire les interactions diffractives, on introduit également le carré t de la quadri-impulsion transférée au vertex du proton, et les variables cinématiques $x_{I\!P}$ et β. Dans le référentiel du proton en mouvement rapide, $x_{I\!P}$ peut être interprété comme la fraction d'impulsion du proton portée par le pomeron et β la fraction de l'impulsion échangée portée par le quark sondé par le photon. Dans le cas de la production de mésons vecteurs légers à grand Q^2, β est proche de 1.

En négligeant les masses de l'électron m_e et du proton m_p, les différentes variables cinématiques présentées sont reliées entre elles par les relations :

$$Q^2 = xys \qquad (1.3)$$

$$W^2 = Q^2(\frac{1}{x} - 1) \qquad (1.4)$$

$$W^2 \simeq ys \quad (\text{pour } x \ll 1). \qquad (1.5)$$

Pour les événements où le photon intermédiaire est réel ($Q^2 \simeq 0$ GeV^2), on parlera de photoproduction. Lorsque la virtualité Q^2 correspond au domaine de la diffusion profondément inélastique (Q^2 supérieur à quelques GeV^2), on parlera d'électroproduction.

Nous définissons également la variable cinématique t' :

$$t' = |t| - |t|_{min} \qquad (1.6)$$

où la variable $|t|_{min}$ est la valeur minimale de $|t|$ cinématiquement requise pour que le méson vecteur et le système Y acquièrent leur masse ; elle est approximée par

$$|t|_{min} \simeq \frac{(M_{VM}^2 + Q^2)^2 m_p^2}{W^4} \tag{1.7}$$

dans le cas de production élastique de méson vecteur et par

$$|t|_{min} \simeq \frac{(M_{VM}^2 + Q^2)(M_Y^2 - m_p^2)}{W^2} \tag{1.8}$$

lorsque l'interaction a lieu avec dissociation du proton diffusé [36]. La variable t', qui est bien approchée par le carré de l'impulsion transverse transférée à la cible (système Y), est la variable dynamique pertinente pour notre étude.

1.3 Angles caractérisant la production et la désintégration du méson vecteur

Afin de définir la production diffractive de mésons vecteurs se désintégrant en deux particules chargées, trois angles sont utilisés. Leur définition dépend du système de référence dans lequel on travaille, en particulier [37] le système d'hélicité, le système de Gottfried et Jackson et le système d'Adlair, qui diffèrent par le choix de l'axe de quantification du spin, défini comme l'axe z. Dans le cas du système d'hélicité, l'axe z est pris selon la direction opposée à celle du système Y, dans le référentiel au repos du méson vecteur. Dans le système de Gottfried et Jackson, il s'agit de la direction du photon incident dans le référentiel au repos du méson vecteur, tandis que dans le système d'Adlair, l'axe z est choisi le long de cette même direction dans le référentiel du centre de masse $\gamma^{(*)}p$. On préfèrera utiliser le système d'hélicité pour étudier la conservation de l'hélicité dans le canal s, le système de Gottfried et Jackson pour la conservation de l'hélicité dans le canal t et le système d'Adlair pour l'indépendance de spin dans le canal s.

Les angles caractérisant la production et la désintégration d'un méson ρ sont définis de la façon suivante (voir figure 1.2) [3] :

- l'angle Φ est l'angle entre le plan de production du méson ρ et le plan de diffusion de l'électron, dans le référentiel du centre de masse $\gamma^{(*)}p$;
- l'angle φ est l'angle entre les plans de production et de désintégration du méson ρ, dans le référentiel du centre de masse $\gamma^{(*)}p$;
- l'angle θ^* est l'angle polaire du pion chargé positivement, dans le référentiel au repos du méson ρ.

[3] Dans le cas de la désintégration d'un méson en trois particules, l'angle θ^* est défini dans le référentiel au repos du méson comme l'angle entre le vecteur perpendiculaire au plan contenant les trois particules et l'axe de quantification.



Figure 1.2: Définition des angles caractérisant la production et la désintégration d'un méson ρ dans le système d'hélicité.

1.4 Formalisme de la distribution angulaire de désintégration

Dans un cadre tout à fait général [38] où une particule a de spin s_a se désintègre en deux particules α et β (de spin s_α et s_β respectivement), la distribution angulaire de désintégration, ou probabilité que la particule α résultant de la désintégration soit émise suivant la direction (θ^*, φ), est donnée par la relation :

$$\begin{aligned} W(\cos\theta^*, \varphi) &= \frac{2s_a+1}{4\pi} \sum_{\lambda_\alpha\ \lambda_\beta\ m\ m'} |M_a(\lambda_\alpha\lambda_\beta)|^2\ e^{i(m-m')\varphi}\ d^{s_a}_{m\Lambda}(\theta^*)\ d^{s_a}_{m'\Lambda}(\theta^*)\ \rho_{mm'} \\ &= \frac{2s_a+1}{4\pi} \sum_{\lambda_\alpha\ \lambda_\beta\ m\ m'} |M_a(\lambda_\alpha\lambda_\beta)|^2\ D^{s_a *}_{m\Lambda}(\varphi,\theta^*,-\varphi)\ D^{s_a}_{m'\Lambda}(\varphi,\theta^*,-\varphi)\ \rho_{mm'} \end{aligned} \tag{1.9}$$

où λ_α et λ_β sont les hélicités respectives des particules α et β, et $\Lambda = \lambda_\alpha - \lambda_\beta$. Les facteurs $M_a(\lambda_\alpha\lambda_\beta)$ sont liés à la dynamique de la désintégration et ne sont pas connus *a priori*. Les indices m et m' caractérisent l'état d'hélicité de la particule a et $\rho_{mm'}$ est un élément de la matrice densité de spin de cette particule. Les matrices de rotation de Wigner D^j_{kl} sont liées aux matrices de rotation réelles d^j_{kl} avec la convention de signe de Rose [39]

$$D^j_{kl}(\varphi,\theta^*,-\varphi) = e^{-ik\varphi}\ d^j_{kl}(\theta^*)\ e^{il\varphi}. \tag{1.10}$$

Dans le cas particulier de la désintégration du méson ρ en deux mésons pseudo-scalaires ($\lambda_\alpha = \lambda_\beta = 0$) [40, 41], il n'y a qu'une seule constante $|M_a(00)|^2$ que nous pouvons poser égale à 1 puisque nous étudions le cas d'une distribution angulaire normalisée [4]. La distribution angulaire de désintégration se résume donc à :

$$W(\cos\theta^*, \varphi) = \frac{3}{4\pi} \sum_{m\ m'} D^{1*}_{m0}(\varphi, \theta^*, -\varphi)\ \ D^{1}_{m'0}(\varphi, \theta^*, -\varphi)\ \ \rho_{mm'}. \tag{1.11}$$

La densité de spin $\rho_{mm'}(VM)$ du méson ρ est reliée à la densité de spin du photon $\rho_{nn'}(\gamma)$ par la relation [41] :

$$\rho(VM) = \frac{1}{2}\, T\ \rho(\gamma)\ T^{+} \tag{1.12}$$

où les matrices T représentent les amplitudes (de transition) d'hélicité.

La matrice $\rho(VM)$ peut en toute généralité être décomposée en une combinaison linéaire de 9 matrices ρ^α :

$$\rho(VM) = \sum_{\alpha=0}^{8} \Pi_\alpha \rho^\alpha \tag{1.13}$$

où les matrices portant les indices $\alpha = 0-3$ décrivent la production de mésons ρ par des photons transverses, celle avec $\alpha = 4$ par des photons longitudinaux et les matrices pour lesquelles $\alpha = 5-8$ tiennent comptent de l'interférence longitudinale - transverse. Les matrices d'indices $\alpha = 3$, 7 et 8 représentent les contributions dans le cas d'électrons incidents polarisés. Dans les facteurs Π_α apparaît la dépendance en Φ. Utilisant la décomposition de $\rho(VM)$ à l'équation 1.13, on peut également écrire

$$W(\cos\theta^*, \varphi, \Phi) = \sum_{\alpha=0}^{8} \Pi_\alpha W^\alpha(\cos\theta^*, \varphi) \tag{1.14}$$

où les W^α sont obtenus à partir des ρ^α dans l'équation 1.11.

La distribution angulaire complète $W(\cos\theta^*,\ \varphi,\ \Phi)$ caractérisant la production et la désintégration du méson ρ en deux pions est donnée par la formule suivante [41] dans le cas des

[4]La désintégration du méson J/Ψ en deux leptons ($J/\Psi \to l^+l^-$) est présentée à la référence [42]. Le cas de la désintégration du méson ρ' est discuté à l'annexe A.

faisceaux non polarisés [5] :

$$\begin{aligned}
W(\cos\theta^*, \varphi, \Phi) = \frac{3}{4\pi} \ \Big\{ \ & \frac{1}{2}(1 - r^{04}_{00}) + \frac{1}{2}(3\, r^{04}_{00} - 1)\ \cos^2\theta^* \\
& -\sqrt{2}\,\mathrm{Re}\, r^{04}_{10}\ \sin 2\theta^* \cos\varphi - r^{04}_{1-1}\ \sin^2\theta^* \cos 2\varphi \\
& -\varepsilon\ \cos 2\Phi \left(r^{1}_{11}\ \sin^2\theta^* + r^{1}_{00}\ \cos^2\theta^* - \sqrt{2}\,\mathrm{Re}\, r^{1}_{10}\ \sin 2\theta^* \cos\varphi \right. \\
& \qquad \left. - \ r^{1}_{1-1}\ \sin^2\theta^* \cos 2\varphi \right) \\
& -\varepsilon\ \sin 2\Phi \left(\sqrt{2}\,\mathrm{Im}\, r^{2}_{10}\ \sin 2\theta^* \sin\varphi + \mathrm{Im}\, r^{2}_{1-1}\ \sin^2\theta^* \sin 2\varphi \right) \\
& +\sqrt{2\varepsilon\,(1+\varepsilon)}\ \cos\Phi\ \left[\, r^{5}_{11}\ \sin^2\theta^* + r^{5}_{00}\ \cos^2\theta^* \right. \\
& \qquad \left. -\sqrt{2}\,\mathrm{Re}\, r^{5}_{10}\ \sin 2\theta^* \cos\varphi - \ r^{5}_{1-1}\ \sin^2\theta^* \cos 2\varphi \right] \\
& +\sqrt{2\varepsilon\,(1+\varepsilon)}\ \sin\Phi\ \left[\ \sqrt{2}\,\mathrm{Im}\, r^{6}_{10}\ \sin 2\theta^* \sin\varphi \right. \\
& \qquad \left. +\mathrm{Im}\, r^{6}_{1-1}\ \sin^2\theta^* \sin 2\varphi \right] \ \Big\}
\end{aligned} \tag{1.16}$$

où le paramètre de polarisation ε est donné par

$$\varepsilon = (1-y)/(1-y+y^2/2). \tag{1.17}$$

Les 15 éléments de matrice r^{α}_{ik} et $r^{\alpha\beta}_{ik}$ sont définis à partir des éléments de matrice ρ^{α}_{ik} :

$$\begin{aligned}
r^{04}_{ik} &= \frac{\rho^{0}_{ik}\ + \varepsilon R\, \rho^{4}_{ik}}{1+\varepsilon R}, \\
r^{\alpha}_{ik} &= \frac{\rho^{\alpha}_{ik}}{1+\varepsilon R} \qquad \alpha = 1, 2, 3 \\
r^{\alpha}_{ik} &= \frac{\sqrt{R}\, \rho^{\alpha}_{ik}}{1+\varepsilon R} \qquad \alpha = 5, 6, 7, 8
\end{aligned} \tag{1.18}$$

où $R = \sigma_L/\sigma_T$ est le rapport des sections efficaces de production de mésons ρ par des photons longitudinaux et transverses. A HERA, le paramètre de polarisation ε est fixé. Pour les données présentées dans cette thèse, $\langle\varepsilon\rangle = 0.99$. Pour cette raison, il est impossible de faire de mesures séparément des matrices ρ^0 et ρ^4, et les éléments de matrice r^{α}_{ik} et $r^{\alpha\beta}_{ik}$ sont dès lors préférés à l'utilisation des matrices ρ^{α}.

Par la suite, la mention des éléments de la matrice densité de spin fera toujours référence aux éléments r^{α}_{ik} et $r^{\alpha\beta}_{ik}$. Ceux-ci sont reliés par des combinaisons bilinéaires aux amplitudes d'hélicité $T_{\lambda_\rho\lambda_\gamma}$ où $\lambda_\rho(\lambda_\gamma)$ est l'hélicité du méson ρ (photon). Sous l'hypothèse d'échange de parité naturelle (natural parity exchange -"NPE"),

$$T_{-\lambda_\rho-\lambda_\gamma} = (-1)^{\lambda_\rho-\lambda_\gamma} T_{\lambda_\rho\lambda_\gamma}, \tag{1.19}$$

[5] A HERA, le faisceau d'électrons est polarisé transversalement de façon intrinsèque [43]. La distribution angulaire de désintégration s'écrit alors :

$$W(\cos\theta^*, \varphi, \Phi) = W^{non-pol}(\cos\theta^*, \varphi, \Phi) + W^{trans\ pol}(\cos\theta^*, \varphi, \Phi)$$

où le terme $W^{non-pol}(\cos\theta^*, \varphi, \Phi)$ est donné par l'équation 1.16 et où le terme $W^{trans\ pol}(\cos\theta^*, \varphi, \Phi)$ est le terme supplémentaire tenant compte de la polarisation transverse du faisceau d'électrons (eq. 90 dans [41]). Ce terme est toutefois négligeable pour le domaine cinématique étudié ($Q^2 > 2.5$ GeV^2) car il apparaît avec un facteur proportionnel à m_e/Q. Par contre en photoproduction (Q^2 proche de 0 GeV^2), ce terme peut devenir important.

seules cinq de ces amplitudes d'hélicité sont indépendantes:

- T_{00}: amplitude sans changement d'hélicité $\gamma_L \to \rho_L$
- T_{11}: amplitude sans changement d'hélicité $\gamma_T \to \rho_T$
- T_{01}: amplitude avec un simple changement d'hélicité $\gamma_T \to \rho_L$
- T_{10}: amplitude avec un simple changement d'hélicité $\gamma_L \to \rho_T$
- T_{1-1}: amplitude avec un double changement d'hélicité $\gamma_T \to \rho_T$

Citons en particulier les relations suivantes entre les éléments de matrice et les amplitudes d'hélicité :

$$\begin{aligned}
r^{04}_{00} &= \frac{1}{N}\,(\varepsilon\,|T_{00}|^2 + |T_{01}|^2) \\
r^{04}_{1-1} &= \frac{1}{N}\left[\frac{1}{2}(T_{11}T^{\dagger}_{1-1} + T_{1-1}T^{\dagger}_{11}) - \varepsilon\,|T_{10}|^2\right] \\
r^{5}_{00} &= \frac{\sqrt{2}}{N}\,\mathrm{Re}\,(T_{00}\,T^{\dagger}_{01}) \\
r^{5}_{11} &= \frac{1}{\sqrt{2}\,N}\left[\mathrm{Re}\,(T_{10}T^{\dagger}_{11}) - \mathrm{Re}\,(T_{10}T^{\dagger}_{1-1})\right] \\
r^{1}_{00} &= \frac{-1}{N}\,|T_{01}|^2 \\
r^{1}_{11} &= \frac{1}{2N}\,(T_{1-1}T^{\dagger}_{11} + T_{11}T^{\dagger}_{1-1}) \\
\text{avec}\quad & N = \varepsilon\,|T_{00}|^2 \;+\; |T_{11}|^2 \;+\; |T_{01}|^2 \;+\; 2\,\varepsilon\,|T_{10}|^2 \;+\; |T_{1-1}|^2,
\end{aligned} \tag{1.20}$$

les autres relations étant données à titre d'information à l'annexe B.

Dans le cas de la conservation d'hélicité dans le canal s (s channel helicity conservation - "SCHC"), le méson ρ conserve l'hélicité du photon et seules les amplitudes sans changement d'hélicité T_{00} et T_{11} sont non nulles. Cela a pour conséquence la nullité des éléments de matrice r^5_{00}, r^5_{11}, r^1_{00} et r^1_{11} ainsi que des éléments Re r^{04}_{10}, r^{04}_{1-1}, Re r^1_{10}, Im r^2_{10}, r^5_{1-1} et Im r^6_{1-1}. La formule 1.16 se réduit alors à la forme suivante :

$$\begin{aligned}
W(\cos\theta^*, \Psi) = \frac{3}{4\pi}\; & \left\{\; \frac{1}{2}(1 - r^{04}_{00}) + \frac{1}{2}(3\,r^{04}_{00} - 1)\;\cos^2\theta^* \right. \\
& \left. +\varepsilon\,r^{1}_{1-1}\;\sin^2\theta^*\cos 2\Psi - \sqrt{2\varepsilon\,(1+\varepsilon)}\;\mathrm{Re}\,r^5_{10}\;\sin 2\theta^*\cos\Psi \right\}
\end{aligned} \tag{1.21}$$

où Ψ est défini comme $\Psi = \Phi - \varphi$.

L'élément r^{04}_{00}, qui est la probabilité de trouver un méson ρ polarisé longitudinalement dans l'état final, peut être relié sous $SCHC$ au rapport des sections efficaces longitudinale et transverse $R = \sigma_L/\sigma_T$ par la relation

$$R = \frac{1}{\varepsilon}\frac{r^{04}_{00}}{1 - r^{04}_{00}}. \tag{1.22}$$

De plus, les éléments r^1_{1-1} et Re r^5_{10} de la matrice densité de spin se réduisent sous $SCHC$ à

$$\begin{aligned} r^1_{1-1} &= \frac{1}{2}(1 - r^{04}_{00}) \\ \mathrm{Re}\, r^5_{10} &= \frac{\sqrt{R}}{1+\varepsilon R}\cos\delta, \end{aligned} \tag{1.23}$$

où δ est la phase entre les amplitudes T_{00} et T_{11}

$$T_{00}{T_{11}}^{\dagger} = |T_{00}||T_{11}|e^{-i\delta}. \tag{1.24}$$

Utilisant les relations 1.22 et 1.23, la formule 1.21 s'écrit

$$\begin{aligned} W(\cos\theta^*, \Psi) = \frac{3}{8\pi}\,\frac{1}{1+\varepsilon\; R}\;\Big\{\; \sin^2\theta^*\;(1+\varepsilon\;\cos 2\Psi) \\ +\,2\;\varepsilon\;R\;\cos^2\theta^* - \sqrt{2\varepsilon\;(1+\varepsilon)\;R}\;\cos\delta\sin 2\theta^*\cos\Psi\Big\}\,. \end{aligned} \tag{1.25}$$

Remarquons déjà qu'expérimentalement, on a observé des écarts significatifs par rapport à cette conservation, notamment par rapport à la relation $r^5_{00} = 0$ attendue sous $SCHC$, indiquant une violation de $SCHC$ (voir section 1.5).

En intégrant sur les angles $\cos\theta^*$ et φ la distribution angulaire $W(\cos\theta^*, \varphi, \Phi)$ caractérisant la production et la désintégration du méson ρ donnée à l'équation 1.16, on trouve que [6]

$$W(\Phi) \propto 1 + \sqrt{2\varepsilon(1+\varepsilon)}\;\cos\Phi\;(r^5_{00} + 2r^5_{11}) - \varepsilon\;\cos 2\Phi\;(r^1_{00} + 2r^1_{11}). \tag{1.26}$$

L'intégration de $W(\cos\theta^*, \varphi, \Phi)$ sur les angles φ et Φ, donne

$$W(\cos\theta^*) \propto 1 - r^{04}_{00}\; + (3\; r^{04}_{00} - 1)\cos^2\theta^*\;, \tag{1.27}$$

et en intégrant l'équation 1.16 sur les angles $\cos\theta^*$ et Φ, on a que

$$W(\varphi) \propto 1 - 2\; r^{04}_{1-1}\cos 2\varphi. \tag{1.28}$$

Finalement, après intégration de la formule 1.21 sur l'angle $\cos\theta^*$, on obtient la distribution en Ψ à l'approximation de $SCHC$

$$W(\Psi) \propto 1 + 2\;\varepsilon\; r^1_{1-1}\cos 2\Psi. \tag{1.29}$$

1.5 Résultats antérieurs à ce travail

Dans cette section, nous présentons les résultats expérimentaux antérieurs à ce travail, sur les questions d'hélicité. Ceux-ci sont tous obtenus sur base de l'hypothèse de parité naturelle NPE (voir eq. 1.19). Nous les regroupons en trois classes : les résultats obtenus dans un domaine cinématique en Q^2 et W similaire à notre analyse (à savoir $Q^2 >$ quelques GeV^2 et haute énergie disponible dans le centre de masse $\gamma^* p$), ceux obtenus à haute énergie en photoproduction et finalement ceux provenant des expériences à cible fixe (c'est-à-dire à basse énergie).

[6] Notons que dans le cas d'un faisceau d'électrons polarisés transversalement, et pour des valeurs de $Q^2 \simeq m_e^2$, la distribution unidimensionnelle en Φ comporte un terme supplémentaire lié à l'intégration de $W^{trans\ pol}(\cos\theta^*, \varphi, \Phi)$ sur les angles $\cos\theta^*$ et φ. Toutefois, en pratique, l'angle Φ n'est pas mesurable en photoproduction.

1.5.1 Résultats en électroproduction à haute énergie

Les collaborations H1 et ZEUS à HERA ont mesuré les valeurs des 15 éléments de la matrice densité de spin du méson ρ produit par interaction élastique ($e+p \to e+\rho+p$) dans le domaine cinématique

$$2.5 < Q^2 < 60 \text{ GeV}^2,\ 30 < W < 140 \text{ GeV},\ |t| < 0.5 \text{ GeV}^2 \tag{1.30}$$

pour la collaboration H1 [4] et dans le domaine

$$3.0 < Q^2 < 30 \text{ GeV}^2,\ 40 < W < 120 \text{ GeV},\ |t| < 0.6 \text{ GeV}^2 \tag{1.31}$$

pour la collaboration ZEUS [14]. En complément de l'étude des distributions angulaires à une dimension en $\cos\theta^*$, Φ, φ et Ψ et à deux dimensions en $\cos\theta^*$ et Ψ, la méthode des moments a été utilisée. Celle-ci consiste à projeter la distribution angulaire $W(\cos\theta^*, \varphi, \Phi)$ (voir formule 1.16) sur des fonctions trigonométriques orthogonales des angles $\cos\theta^*$, φ et Φ (données à l'annexe C de la référence [41]). Les valeurs moyennes de ces fonctions donnent les mesures des 15 éléments de matrice densité de spin. Ceux-ci ont été extraits en fonction de Q^2, W et t. Ils sont présentés en fonction de Q^2 à la figure 1.3, les cercles vides correspondant aux valeurs obtenues par la collaboration H1 dans le domaine 1.30 et les cercles pleins aux valeurs obtenues par la collaboration ZEUS dans le domaine 1.31 ainsi que dans le domaine [14]

$$0.25 < Q^2 < 0.85 \text{ GeV}^2,\ 20 < W < 90 \text{ GeV},\ |t| < 0.6 \text{ GeV}^2. \tag{1.32}$$

Les courbes superposées sur cette figure sont les prédictions des modèles de Nikolaev *et al.* [44] (traits continus) et de Royen [45] (pointillés).

Supposant $SCHC$, la collaboration ZEUS a vérifié l'hypothèse NPE en comparant les mesures de l'élément r^1_{1-1} extraites d'une part à partir d'un ajustement de la distribution en Ψ par la relation 1.29 et d'autre part à partir de l'élément r^{04}_{00} et de la relation 1.23.

Dans le domaine où $Q^2 \geq 2.5 - 3.\ \text{GeV}^2$, les valeurs obtenues sont en général en accord avec l'approximation de $SCHC$ à l'exception de la mesure non nulle de l'élément de la matrice densité de spin r^5_{00}, qui fait intervenir l'amplitude d'hélicité T_{01} où le photon est polarisé transversalement et le méson ρ longitudinalement (voir eq. 1.20). La violation de $SCHC$ a été évaluée à $8\% \pm 3\%$ par la collaboration H1 ($Q^2 > 2.5\ \text{GeV}^2$) et à $7.9\% \pm 1.6\%$ par la collaboration ZEUS ($Q^2 > 3\ \text{GeV}^2$). Cette violation est prédite par différents modèles basés sur la théorie QCD perturbative [31–33] détaillés au chapitre suivant. Dans le domaine correspondant aux valeurs de Q^2 entre photoproduction et électroproduction (eq. 1.32), on a aussi observé une violation de $SCHC$ via les éléments Re r^{04}_{10}, r^{04}_{1-1}, r^1_{11}, Im r^2_{10} et r^5_{00} de la matrice densité de spin du méson ρ [14]. La violation liée à l'amplitude T_{01} a été estimée à $6.9\% \pm 1.3\%$, la violation liée à l'amplitude T_{10} à $2.9\% \pm 1.4\%$ et celle liée à l'amplitude avec un double changement d'hélicité T_{1-1} est égale à $4.8\% \pm 1.1\%$.

A l'approximation $SCHC$, la valeur du paramètre $\cos\delta$ défini à l'équation 1.24 a été extraite à partir d'un ajustement de la relation 1.25 sur la distribution à deux dimensions en $\cos\theta^*$ et Ψ : $\cos\delta = 0.93 \pm 0.03$ [4]. Le rapport des sections efficaces $R = \sigma_L/\sigma_T$ a été obtenu à partir des mesures de l'élément r^{04}_{00} et de la relation 1.22, la violation de $SCHC$ n'induisant qu'une correction de quelques pourcents sur le résultat. Des résultats préliminaires obtenus pour des



Figure 1.3: Mesures des 15 éléments de la matrice densité de spin du méson ρ par les collaborations H1 [4] (dans le domaine cinématique 1.30) et ZEUS [14] (dans les domaines 1.31 et 1.32) en fonction de Q^2. Les points de la collaboration H1 sont indiqués par des cercles vides et ceux de la collaboration ZEUS par des cercles pleins. Les courbes superposées en traits continus correspondent aux prédictions du modèle de Nikolaev *et al.* [44], celles en pointillés aux prédictions de celui de Royen [45]. Les lignes discontinues correspondent à la conservation de l'hélicité dans le canal s.

grandes valeurs de Q^2 [46, 47] complètent les résultats des analyses [4, 14]. La figure 1.4a présente l'évolution en Q^2 du rapport R. Pour $Q^2 \geq 2\,\mathrm{GeV}^2$, la production de mésons ρ par des photons polarisés longitudinalement domine. Cette observation est l'un des premiers succès des modèles théoriques formulés dans le cadre de la théorie QCD perturbative [28–33, 48] car ils prédisent une section efficace longitudinale dominante à très grand Q^2. Cependant, l'augmentation observée n'est pas aussi rapide que la dépendance linéaire en Q^2 qui est prédite par la théorie. Cela a donné lieu à un travail de recherche intensif afin d'obtenir des prédictions de ce rapport en accord avec les données expérimentales. Le rapport R est présenté à la figure 1.4b en fonction de W : il ne dépend pas de l'énergie du centre de masse $\gamma^* p$ [47].



Figure 1.4: a) Rapport R des sections efficaces longitudinale et transverse en fonction a) de Q^2 et b) de W. La courbe superposée à la figure a) correspond aux prédictions de Martin, Ryskin et Teubner [48].

L'analyse des distributions angulaires de production et de désintégration pour le méson ρ produit avec dissociation du proton dans le domaine cinématique $7 < Q^2 < 25\ \mathrm{GeV}^2$, $60 < W < 180$ GeV, $|t| < 0.8\ \mathrm{GeV}^2$ et $M_Y^2/W^2 < 0.05$ [6] a donné des résultats similaires à la production élastique de mésons ρ pour l'élément r_{00}^{04}. A grand Q^2, l'échantillon est donc constitué principalement de mésons polarisés longitudinalement.

Les valeurs des 15 éléments de la matrice densité de spin du méson ϕ produit de manière élastique ont été mesurées en utilisant la méthode des moments, par la collaboration H1 dans le domaine cinématique [8]

$$2.5 < Q^2 < 60\,\mathrm{GeV}^2,\ 40 < W < 130\,\mathrm{GeV},\ |t| < 0.5\,\mathrm{GeV}^2. \tag{1.33}$$

Elles sont en accord avec $SCHC$ sauf pour les éléments de matrice r_{00}^5 et r_{00}^1 qui ont des contributions non nulles. L'étude de la distribution en Φ après soustraction des bruits de fond de mésons ω et ρ et correction des données notamment pour les effets radiatifs, a confirmé cette observation. La déviation par rapport à $SCHC$ est de l'ordre de 5 σ. Le rapport R évolue suivant une dépendance commune pour les mésons ρ et ϕ quand il est présenté en fonction de Q^2/M_{VM}^2. La collaboration ZEUS a uniquement étudié la distribution en $\cos\theta^*$ pour la production de mésons ϕ [49] dans le domaine $7 < Q^2 < 25~\mathrm{GeV}^2$, $42 < W < 134$ GeV, $|t| < 0.6~\mathrm{GeV}^2$, trouvant un résultat similaire au méson ρ.

Une mesure des éléments r_{00}^{04} et r_{1-1}^{04} de la matrice densité de spin du méson J/Ψ a été réalisée par la collaboration ZEUS dans le domaine $7 < Q^2 < 25~\mathrm{GeV}^2$ et $42 < W < 134$ GeV [13] et les éléments r_{00}^{04} et r_{1-1}^{1} ont été étudiés par la collaboration H1 dans le domaine $2 < Q^2 < 80~\mathrm{GeV}^2$ et $40 < W < 160$ GeV [9] : les résultats obtenus sont compatibles avec $SCHC$ et le rapport R donne des résultats significativement plus petits que ceux du méson ρ pour des valeurs de Q^2 similaires, s'accordant sur une dépendance commune en Q^2/M_{VM}^2.

1.5.2 Résultats en photoproduction à haute énergie

En photoproduction, les résultats sur les mesures d'hélicité proviennent essentiellement de la collaboration ZEUS, la limite en Q^2 dépendant de la détection ($Q^2 < 0.01~\mathrm{GeV}^2$) ou non de l'électron ($Q^2 < 4~\mathrm{GeV}^2$). Pour la production élastique de mésons ρ dans le domaine cinématique $Q^2 < 4~\mathrm{GeV}^2$, $50 < W < 100$ GeV et $|t| < 0.5~\mathrm{GeV}^2$ [15], les éléments de matrice r_{00}^{04}, r_{1-1}^{04} et Re r_{10}^{04} ont été obtenus par un ajustement à la distribution bidimensionnelle en $\cos\theta^*$ et φ de la relation 1.16 qui se réduit après intégration sur l'angle Φ à la forme :

$$W(\cos\theta^*,\varphi) = \frac{1}{2}(1 - r_{00}^{04}) + \frac{1}{2}(3\ r_{00}^{04} - 1)\ \cos^2\theta^* \\ -\sqrt{2}\mathrm{Re}\ r_{10}^{04}\sin 2\theta^*\cos\varphi - r_{1-1}^{04}\ \sin^2\theta^*\cos 2\varphi. \tag{1.34}$$

Les valeurs des éléments r_{00}^{04}, r_{1-1}^{04} et Re r_{10}^{04} pour la production de mésons ρ sont en accord avec $SCHC$.

Les distributions unidimensionnelles en $\cos\theta^*$ et en φ ont également été étudiées dans le cas de la production de mésons ω ($Q^2 < 4~\mathrm{GeV}^2$, $70 < W < 90$ GeV et $|t| < 0.6~\mathrm{GeV}^2$) [19], de mésons ϕ ($Q^2 < 4~\mathrm{GeV}^2$, $60 < W < 80$ GeV et $|t| < 0.5~\mathrm{GeV}^2$) [21] et de mésons J/Ψ ($Q^2 < 4~\mathrm{GeV}^2$, $40 < W < 140$ GeV et $|t| < 1.0~\mathrm{GeV}^2$) [22]. A haute énergie en photoproduction aux petites valeurs de $|t|$, les résultats sur les éléments de matrice densité de spin sont compatibles avec les prédictions de $SCHC$.

Au contraire, pour des valeurs de $|t|$ plus élevées, une déviation par rapport à $SCHC$ a été observée chez le méson ρ pour les éléments de matrice densité de spin Re r_{10}^{04} et r_{1-1}^{04} lorsque $Q^2 < 0.01~\mathrm{GeV}^2$, $\langle W\rangle \simeq 94$ GeV et $|t| < 3~\mathrm{GeV}^2$ [25] et $Q^2 < 0.01~\mathrm{GeV}^2$, $80 < W < 120$ GeV et $1.1 < |t| < 12.~\mathrm{GeV}^2$ [26]. L'élément Re r_{10}^{04} est différent de zéro et positif et l'élément r_{1-1}^{04} est négatif, indiquant que les amplitudes avec simple et double changements d'hélicité sont non-nulles (voir figure 1.5). L'élément r_{00}^{04} a été, lui, mesuré égal à zéro. Le modèle théorique de Enberg [50] basé sur une approche perturbative de la théorie QCD et présenté à la conférence DIS2002 prédit la dépendance en t de ces 3 éléments de la matrice densité de spin mesurés par la collaboration ZEUS. Les autres modèles théoriques valables dans le domaine de la photoproduction [51, 52] ne parviennent pas à décrire convenablement ces déviations par rapport à $SCHC$. Ces résultats sont également valables pour la production de mésons ϕ dans le domaine $Q^2 < 0.01~\mathrm{GeV}^2$, $80 < W < 120$ GeV et $1.1 < |t| < 7.~\mathrm{GeV}^2$ [26]. Par contre, pour le méson lourd J/Ψ [26], les valeurs de éléments de matrice Re r_{10}^{04} et r_{1-1}^{04} sont compatibles avec $SCHC$ dans le domaine $Q^2 < 0.01~\mathrm{GeV}^2$, $80 < W < 120$ GeV et $1.1 < |t| < 6.5~\mathrm{GeV}^2$.



Figure 1.5: Mesure des éléments de matrice densité de spin du méson ρ r^{04}_{00}, Re r^{04}_{10} et r^{04}_{1-1} en fonction de $-t$. Les cercles pleins représentent les résultats de la collaboration ZEUS dans le domaine $Q^2 < 0.01\ \mathrm{GeV}^2$, $80 < W < 120$ GeV et $1.1 < |t| < 12.\ \mathrm{GeV}^2$ [26], les cercles vides ceux dans le domaine restreint en $|t|$: $|t| < 3\ \mathrm{GeV}^2$ [25]. Les lignes discontinues correspondent à $SCHC$.

1.5.3 Résultats à basse énergie

Les résultats expérimentaux sur l'hélicité des mésons vecteurs à basse énergie proviennent des expériences sur cible fixe reprises dans la table 1.2, les résultats antérieurs à 1978 étant présentés dans la revue [37]. A part l'expérience HERMES [53] qui utilise le faisceau d'électrons de HERA, les expériences E665 [54], NMC [55], EMC [56] et CHIO [57] étudient la production de mésons vecteurs par muoproduction ($\mu + N \to \mu + VM + N$, où N est un nucléon de la cible).

Les résultats portent principalement sur l'étude de la distribution en $\cos\theta^*$ et l'extraction du rapport R à l'approximation de $SCHC$ pour le méson ρ. R croît linéairement avec Q^2. Les expériences HERMES, E665 et NMC ont également étudié les distributions angulaires unidimensionnelles en φ et Ψ. Notons que leurs faisceaux sont polarisés (le degré de polarisation P valant respectivement 0.48, 0.7, et $\pm$0.82), la formule complète $W(\cos\theta^*, \varphi, \Phi)$ caractérisant la production et la désintégration du méson ρ compte alors 23 éléments de matrice densité de spin [41]. Les résultats obtenus confirment l'hypothèse NPE [53–55, 57].

Les expériences CHIO et HERMES ont observé une déviation par rapport à $SCHC$ de l'ordre de quelques σ. Ainsi, les éléments de matrice Re r^5_{10} dans le domaine $10 < W < 13$ GeV et Im r^6_{10} pour $12.5 < W < 16$ GeV ont été mesurés respectivement à 3 et 4 σ de la valeur nulle attendue sous $SCHC$ par la collaboration CHIO [57]. Le rapport des amplitudes avec un simple changement d'hélicité à celles sans changement a été estimé dans ces deux domaines en W à $11 \pm 8\%$ et $14 \pm 8\%$, respectivement. La collaboration HERMES a observé une valeur négative de la trace de la matrice r^1, estimant l'effet à 2.5σ ; la trace de la matrice r^5 et l'élément r^{04}_{1-1} présentent également une légère déviation par rapport à $SCHC$ [53]. Une violation de $SCHC$ de l'ordre de 15-20 % avait déjà été mise en évidence antérieurement [58] à DESY au travers de la mesure de l'élément Re r^{04}_{10} de la matrice densité de spin du méson ρ dans le domaine $0.3 < Q^2 < 1.4$ GeV^2, $1.7 < W < 2.8$ GeV et $|t| < 0.5$ GeV^2.

Expérience	Domaine en Q^2 (GeV^2)	Intervalle en W ou ν (GeV)
HERMES [53] à DESY	$0.5 < Q^2 < 4$ GeV^2	$3.8 < W < 6.5$ GeV
E665 [54] à FNAL	$0.15 < Q^2 < 20$ GeV^2	$20 < \nu < 420$ GeV
NMC [55] au CERN	$2 < Q^2 < 25$ GeV^2	$40 < \nu < 180$ GeV
EMC [56] au CERN	$1 < Q^2 < 25$ GeV^2	$6 < W < 19$ GeV
CHIO [57] à FNAL	$Q^2 < 3$ GeV^2	$10 < W < 16$ GeV

Table 1.2: Domaine cinématique des différentes expériences sur cible fixe qui ont étudié les distributions angulaires de mésons vecteurs. L'énergie ν du photon intermédiaire dans le référentiel du laboratoire est reliée à W par la relation : $W^2 = m_p^2 + 2m_p\nu - Q^2$.

1.5.4 En résumé

La mesure de l'élément r^{04}_{00} indique que l'amplitude T_{00} domine l'amplitude T_{11} dès que Q^2 est supérieur à 2 GeV^2 pour le méson ρ. En comparant les différents mésons vecteurs, le rapport

R (obtenu sous l'approximation $SCHC$) semble évoluer selon une dépendance commune en Q^2/M_{VM}^2.

De plus, l'hypothèse $SCHC$ n'est pas confirmée :

- La non-nullité des éléments de matrice r_{00}^5 et r_{00}^1 en électroproduction à haute énergie implique que l'amplitude T_{01} est non nulle. La violation est de l'ordre de 8% pour le méson ρ. Cette violation a également été observée dans un domaine en Q^2 intermédiaire entre l'électroproduction et la photoproduction.
- L'étude des éléments de matrice Re r_{10}^{04} et r_{1-1}^{04} aux grandes valeurs de $|t|$ a mis en évidence la non-nullité des amplitudes avec simple et double changement d'hélicité en photoproduction à haute énergie.
- A basse énergie, différentes expériences ont également observé une déviation significative par rapport à $SCHC$ entre 10 et 20 %.

1.6 Plan de la thèse

Dans ce chapitre, nous avons introduit les observables de la production de mésons vecteurs : la cinématique et les angles caractérisant la production et la désintégration du méson vecteur. L'étude de la structure en hélicité s'opère en analysant ces distributions angulaires. Le formalisme de la désintégration angulaire permet de faire le lien entre celles-ci et les éléments de la matrice densité de spin, qui sont des combinaisons linéaires des amplitudes d'hélicité $T_{\lambda_\rho \lambda_\gamma}$. Nous avons terminé ce chapitre par une revue des résultats antérieurs à ce travail.

Différents modèles théoriques basés sur une approche perturbative de la théorie QCD existent et prédisent l'évolution des amplitudes d'hélicité avec différentes variables cinématiques. Nous présentons au chapitre 2 les modèles s'appliquant à l'électroproduction. Les premiers modèles proposent les calculs des amplitudes T_{00} et T_{11} basés sur un échange de deux gluons. Nous présentons ensuite trois modèles plus récents portant sur la violation de $SCHC$, et calculant la forme des cinq amplitudes $T_{\lambda_\rho \lambda_\gamma}$ indépendantes sous l'hypothèse NPE (T_{00}, T_{11}, T_{01}, T_{10} et T_{1-1}). La comparaison des prédictions théoriques avec les mesures expérimentales permettra de déterminer si les hypothèses utilisées sont pertinentes.

Au chapitre 3, nous décrivons brièvement le dispositif expérimental de l'expérience H1 dans le cadre de laquelle nous travaillons. Nous présentons avec quelque détail les différentes parties du détecteur utiles pour cette analyse.

Nous discutons au chapitre 4 les critères de sélection mis en place pour constituer notre échantillon de données. Nous insistons sur la classification des événements sélectionnés en deux classes distinctes (TAG et NOTAG), basées sur la présence ou l'absence d'activité dans les détecteurs situés dans la direction du système Y. Cette classification prend une importance capitale parce que les événements de bruit de fond peuplent ces deux catégories différemment des événements associés à la production de mésons ρ. Les simulations par Monte Carlo que nous utilisons pour corriger les données pour divers effets (acceptance, résolution du détecteur, système de déclenchement et effets radiatifs QED) sont également présentées dans ce chapitre.

Dans le chapitre 5, nous discutons les différents types de bruits de fond contaminant notre échantillon. Ceux-ci sont associés à la production diffractive de mésons ω, ϕ et ρ'. Leurs contributions sont particulièrement importantes pour des grandes valeurs de t' étudiées dans cette analyse. Leurs distributions sont également fort différentes de celles du signal de mésons ρ. Pour ces raisons, il est nécessaire de soustraire ces différentes contributions avant d'extraire les valeurs des éléments de la matrice densité de spin du méson ρ. La section efficace de production de mésons ρ' n'ayant pas encore été mesurée expérimentalement, nous avons introduit une méthode originale pour estimer quantitativement cette contribution. Le chapitre 5 porte essentiellement sur la présentation de cette méthode.

La polarisation du photon échangé et celle du méson ρ dans l'état final sont étudiées en détail au chapitre 6. Nous présentons les distributions angulaires en Φ, φ et $\cos\theta^*$ étudiées et les mesures des éléments de matrice extraits à partir de celles-ci. Les éléments de matrice sont interprétés dans le cadre de la théorie QCD et en particulier du modèle de Ivanov et Kirschner présenté au chapitre 2.

Le chapitre 7 rassemble les conclusions de cette analyse.

Chapitre 2

Modèles de production diffractive de mésons ρ en chromodynamique quantique

Dans ce chapitre, nous commençons par exposer les concepts de base nécessaires à la détermination de la section efficace de production de mésons vecteurs, $\gamma^{(*)}+p \to VM+p$, où VM est le méson vecteur produit. Cette section efficace est directement reliée par un facteur de flux à celle de la réaction $e + p \to e + VM + p$. Nous présentons ensuite différents modèles théoriques, suivant plus ou moins l'ordre chronologique de leur apparition. L'étude de la production de mésons vecteurs par échange de deux gluons est traitée à la section 2.2. Les modèles plus récents présentés à la section 2.3 envisagent la violation de la conservation de l'hélicité dans le canal s (SCHC), où l'hélicité d'une particule est la projection de son spin suivant sa quantité de mouvement. Dans ce cas, le méson vecteur ne conserve pas l'hélicité du photon. Ces modèles proposent des prédictions pour les amplitudes avec changement d'hélicité.

2.1 Concepts de base

Différents concepts sont abordés dans cette section afin de préparer la présentation des modèles théoriques aux prochaines sections. Nous commençons par exposer la factorisation de la section efficace de production de mésons vecteurs (section 2.1.1), le formalisme du cône de lumière et les variables de Sudakov (section 2.1.2). Nous donnons ensuite un aperçu des possibilités permettant de définir une fonction d'onde pour le photon et pour le méson vecteur (section 2.1.3). Nous ajoutons quelques commentaires sur la section efficace dipôle-proton (section 2.1.4) et terminons en définissant quelques notations (section 2.1.5).

2.1.1 La factorisation

Afin de pouvoir effectuer des calculs perturbatifs en théorie chromodynamique quantique, il est nécessaire de posséder une échelle “dure”. Aussi la production de mésons vecteurs ne peut être calculée dans une approche perturbative de QCD que dans les cas restreints suivants : il faut soit que la virtualité du photon soit grande (grandes valeurs de Q^2), soit que le méson vecteur soit composé de quarks lourds, soit de grandes valeurs de $|t|$.

Toutefois, l'interaction $\gamma^{(*)} + p \to VM + p$ fait intervenir des hadrons dans l'état final : les protons incident et diffusé ainsi que le méson vecteur. La description de tels états liés de quarks et de gluons ne peut se faire de manière perturbative, et doit donc être séparée du reste du calcul perturbatif. Ceci est possible grâce au théorème de factorisation démontré par Collins, Frankfurt et Strikman [59].

Ce théorème démontre la factorisation de la production de mésons vecteurs par des photons virtuels longitudinalement polarisés dans la région cinématique suivante [1] : $Q^2 \gg \Lambda^2_{QCD}$, $|t| \sim \Lambda^2_{QCD}$ et $M^2_{VM} \ll W^2$. L'énoncé de ce théorème dit que l'amplitude de production de mésons vecteurs, indiquée par l'élément de matrice $\mathcal{M}$, est donnée par

$$\mathcal{M} \;=\; \sum_{i,j} \int_0^1 dz \; \int dx' \; f_{i/p}(x', x'-x, t, \mu) \; H_{ij}(\frac{x'Q^2}{x}, z, \mu) \; \Phi^V_j(z, \mu) \;+ ... \qquad (2.1)$$

Les fonctions $f_{i/p}$ sont les fonctions de distribution de partons non-diagonales ou généralisées ("generalised parton density function"). Elles tiennent compte de ce que les deux partons interagissant de façon dure ne possèdent pas la même impulsion longitudinale (x' et $x' - x$), x étant la variable de Bjorken. Ces fonctions de distribution se ramènent aux densités de fonctions habituelles $f_{i/p}(x, \mu)$ pour $t = 0$ et lorsque les fractions d'impulsion portées par les deux partons deviennent égales. Le facteur H_{ij} est la fonction de diffusion dure et Φ^V_j est la fonction d'onde du méson VM dans le formalisme du cône de lumière (voir section 2.1.3). La variable z sur laquelle on intègre est la fraction d'impulsion longitudinale du méson vecteur portée par le quark j entrant dans le méson vecteur. La somme porte sur les types de partons i, j connectant H_{ij} à la fonction $f_{i/p}$ et au méson Φ^V_j. Le paramètre μ de l'équation 2.1 est l'échelle de renormalisation et factorisation, il devrait être de l'ordre de Q afin que H_{ij} soit calculable. Les "..." également présents dans cette équation indiquent que des corrections sont supprimées par des arguments de puissance. Ce théorème est valable pour tous les ordres et est illustré par la figure 2.1. Il a été démontré par Collins, Frankfurt et Strikman dans le référentiel de Breit ("Breit-Frame"), où le photon a une quadri-impulsion de type purement espace (E,p_x,p_y,p_z)=(0,0,0,$-Q$= $-2x\ p^{Breit}$), p^{Breit} étant l'impulsion du proton dans ce référentiel.

La discussion du processus peut également se faire de manière commode dans le référentiel du proton au repos. A haute énergie, la production diffractive de mésons vecteurs se factorise alors par la convolution suivante, illustrée à la figure 2.2 :

1. le photon fluctue en une paire quark-antiquark $q\bar{q}$ ($\Psi^\gamma_{q\bar{q}}$) qui forme un dipôle de couleur,
2. le dipôle $q\bar{q}$ interagit avec le champ de couleur du proton ($H_{q\bar{q}+p}$),
3. la paire $q\bar{q}$ se recombine pour former un méson vecteur ($\Psi^V_{q\bar{q}}$),

autrement dit :

$$\mathcal{M}(\gamma + p \to VM + p) \;=\; \Psi^\gamma_{q\bar{q}} \otimes H_{q\bar{q}+p} \otimes \Psi^V_{q\bar{q}}. \qquad (2.2)$$



Figure 2.1: Théorème de factorisation de Collins, Frankfurt et Strikman.



Figure 2.2: Production de mésons vecteurs.

Cette convolution sépare donc les processus se produisant à petites distances ($H_{q\bar{q}+p}$) et à grandes distances ($\Psi^{\gamma}_{q\bar{q}}$ et $\Psi^{V}_{q\bar{q}}$). Elle est justifiée par les différentes échelles de temps des processus : le temps typique pour la fluctuation $\gamma \to q\bar{q}$ ainsi que le temps nécessaire à la formation du méson vecteur sont beaucoup plus longs que la durée de l'interaction avec le proton.

2.1.2 Le formalisme du cône de lumière et les variables de Sudakov

Le formalisme du cône de lumière

Le formalisme du cône de lumière [60] se fonde sur la définition d'une composante longitudinale "grande" p^+, d'une composante "petite" p^- et d'une composante transverse $\vec{p_t}$ à deux dimensions, par rapport à l'axe z dans le référentiel choisi (de Breit ou du proton au repos) :

$$p^{\pm} = p^0 \pm p^3, \tag{2.3}$$

et

$$p^{\mu} = (p^+, p^-, \vec{p_t}) = (p^+, \frac{p_t^2 + m^2}{p^+}, \vec{p_t}) \tag{2.4}$$

$$p^2 = p^+p^- - p_t^2 = m^2 \tag{2.5}$$

où m est la masse de la particule. De façon générale, le produit de deux impulsions est donné par :

$$p \cdot k = \frac{1}{2}(p^+k^- + p^-k^+) - \vec{p}_t \cdot \vec{k}_t. \tag{2.6}$$

Dans l'approche perturbative du cône de lumière, chaque graphe ordonné dans le temps est calculable au moyen de dix règles :

1. Chaque ligne reçoit une impulsion k^{μ} telle que a) k^+ et k_t sont conservées à chaque vertex, b) $k^2 = m^2$, c'est-à-dire que la particule d'impulsion k^{μ} soit sur sa couche de masse.
2. Chaque ligne reçoit un facteur $\theta(k^+)$.
3. Pour chaque ligne correspondant à un gluon (ou à un boson vecteur), il faut inclure un facteur $d_{\mu\nu}/k^+$ où $d_{\mu\nu}$ implique la somme sur les polarisations.
4. Les vertex couplant des gluons et des fermions sont donnés par

$$\begin{array}{cc} e_0 \dfrac{\bar{u}(k)}{\sqrt{k^+}} \gamma^{\mu} \dfrac{u(l)}{\sqrt{l^+}}, & e_0 \dfrac{\bar{u}(k)}{\sqrt{k^+}} \gamma^{\mu} \dfrac{v(l)}{\sqrt{l^+}}, \\ -e_0 \dfrac{\bar{v}(k)}{\sqrt{k^+}} \gamma^{\mu} \dfrac{u(l)}{\sqrt{l^+}}, & -e_0 \dfrac{\bar{v}(k)}{\sqrt{k^+}} \gamma^{\mu} \dfrac{v(l)}{\sqrt{l^+}}. \end{array} \tag{2.7}$$

   où e_0 est la charge, u ($\bar{u}$) est utilisé pour décrire un fermion entrant (sortant) et v ($\bar{v}$) pour un antifermion.

[1] Il n'existe pas de factorisation pour un photon résolu.

5. Une règle concerne les vertex qui couplent trois gluons et quatre gluons (voir [60]).

6. Chaque état intermédiaire se voit pourvu d'un facteur

$$\frac{1}{\sum_{inc} k^- \; - \; \sum_{interm} k^- + i\epsilon}, \tag{2.8}$$

où la première somme porte sur les "énergies" du cône de lumière k^- des états incidents ("inc") et la seconde sur celles des particules intermédiaires ("$interm$").

7. Dans la jauge du cône de lumière définie par $\eta \cdot A = A^+ = 0$, aucun fantôme n'apparaît, ce qui n'est pas le cas dans la jauge de Feynman.

8. Le propagateur du fermion possède une partie instantanée ($\gamma^+/2k^+$) tout comme celui du gluon. Tenir compte de ce terme a pour effet de retrouver au numérateur le propagateur de la théorie de perturbation de Feynman ($\not k + m$).

9. Il faut intégrer sur chaque k indépendant ($\int_0^\infty dk^+ \int k_t^2/16\pi^3$) et sommer sur chaque spin et polarisation de particule interne.

10. Le facteur de couleur est calculé comme pour les diagrammes covariants.

Les variables de Sudakov

Dans la décomposition de Sudakov, on écrit l'impulsion l d'une particule comme :

$$l_i = \alpha_i q' + \beta_i p' + \vec{l}_{i,t} \tag{2.9}$$

où p' et q' sont les impulsions de type "lumière" du proton et du photon :

$$p'^2 = q'^2 = 0 \quad , \qquad W^2 = 2p' \cdot q', \tag{2.10}$$
$$p = p' + \alpha_p q' \quad , \qquad q = q' + \beta_\gamma p', \tag{2.11}$$
$$\alpha_p = m_p^2/W^2 \quad , \qquad \beta_\gamma = -Q^2/W^2. \tag{2.12}$$

2.1.3 Les fonctions d'onde

La fonction d'onde du photon

En utilisant la cinématique illustrée à la figure 2.3, où q^μ, k^μ et $(q-k)^\mu$ sont respectivement les impulsions du photon, du quark et de l'antiquark dans le référentiel du photon en mouvement, on peut écrire la fonction d'onde du photon dans le formalisme du cône de lumière comme :

$$\Psi^\gamma = e\, e_f \,\frac{\bar{u}(k)}{\sqrt{k^+}} \;\; \frac{\gamma \cdot \epsilon^\gamma}{q^- \; - \; (k^- \; + \; (q-k)^-)} \;\; \frac{v(q-k)}{\sqrt{(q-k)^+}}. \tag{2.13}$$



Figure 2.3: Fonction d'onde du photon.

e et e_f sont respectivement les charges du proton et du quark de saveur f et de masse m et ϵ^γ est le vecteur de polarisation du photon. Utilisant la définition $q = (q^+, q^-, \vec{q}_t) = (q^+, -Q^2/q^+, \vec{0})$ puisque $Q^2 = -q^2 = -q^+q^-$ et posant que $k^+/q^+ = z$, on a :

$$\begin{aligned} q^- - (k^- + (q-k)^-) &= q^- - \frac{k_t^2 + m^2}{k^+} - \frac{k_t^2 + m^2}{(q-k)^+} \\ &= -\frac{1}{q^+}\{Q^2 + \frac{k_t^2 + m^2}{z(1-z)}\}. \end{aligned} \tag{2.14}$$

La fonction d'onde du photon devient donc

$$\Psi^\gamma = -e\, e_f\, \frac{\bar{u}(k)\, \gamma \cdot \epsilon^\gamma\, v(q-k)}{\sqrt{z(1-z)}\{Q^2 + \frac{k_t^2 + m^2}{z(1-z)}\}}. \tag{2.15}$$

Le vecteur de polarisation ϵ^γ possède une partie longitudinale et une partie transverse :

$$\begin{aligned} \epsilon^\gamma(L) &= (\frac{q^+}{Q}, \frac{Q}{q^+}, \vec{0}_t), \\ \epsilon^\gamma(T) &= (0, 0, \vec{\epsilon}_t^{\,\gamma}). \end{aligned} \tag{2.16}$$

En supposant que le photon soit purement longitudinal, et puisque nous avons par normalisation [60]

$$\bar{u_\lambda}(k)\gamma^+ v_{\lambda'}(q-k) = 2\sqrt{k^+(q-k)^+}\delta_{\lambda,-\lambda'} \tag{2.17}$$

et que la conservation du courant impose [61]

$$q_\mu \bar{u_\lambda}\gamma^\mu v_{\lambda'} = 0, \tag{2.18}$$

cela nous donne finalement

$$\Psi_L^\gamma(z, k_t) = -2\, e\, e_f\, Q \frac{\delta_{\lambda,-\lambda'}}{Q^2 + \frac{k_t^2 + m^2}{z(1-z)}}. \tag{2.19}$$

Cette fonction d'onde est celle utilisée par Brodsky *et al.* [29] et par Ivanov et Kirschner [31].

Frankfurt *et al.* [30, 62] utilisent la fonction d'onde du photon longitudinal dans l'espace du paramètre d'impact :

$$\Psi_L^\gamma(z, r) = -2ee_f\, Q\, z(1-z)\, K_0(\epsilon r) \tag{2.20}$$

où

$$\epsilon^2 = Q^2 z(1-z) + m^2, \tag{2.21}$$

et r est la distance transverse entre le quark et l'antiquark, c'est-à-dire la différence entre les paramètres d'impact du quark et de l'antiquark. K_0 est une fonction de Bessel modifiée, c'est-à-dire une fonction de Hankel avec un argument imaginaire (voir annexe C).

Pour le cas d'un photon purement transverse, utilisant la normalisation [31] :

$$\sqrt{z(1-z)}\bar{u_\lambda}\epsilon_t^\gamma v_{\lambda'} = \delta_{\lambda,-\lambda'}\{(1-2z)\mp\lambda\}(\vec{\epsilon_t}^\gamma \cdot \vec{k_t}), \tag{2.22}$$

la fonction d'onde est :

$$\Psi_T^\gamma(z,r) = \mp iee_f Q\sqrt{z(1-z)}\;\delta_{\lambda,-\lambda'}\{(1-2z)\mp\lambda\}(\vec{\epsilon_t}^\gamma \cdot \frac{\vec{r}}{r})\;K_1(\epsilon r) \tag{2.23}$$

où K_1 est également une fonction de Bessel modifiée.

Ces formes de la fonction d'onde du photon (eq. 2.20 et 2.23) ont été introduites par Nikolaev et Zakharov [63] lors de l'étude de la section efficace $\sigma_{\gamma N}$. Dans [63], elles apparaissent prises au carré :

$$|\Psi_L^\gamma(z,r)|^2 = \frac{6\alpha_{em}}{(2\pi)^2}\sum_{quarks} e_f^2\;4\;Q^2\;z^2(1-z)^2[K_0(\epsilon\,r)]^2, \tag{2.24}$$

$$|\Psi_T^\gamma(z,r)|^2 = \frac{6\alpha_{em}}{(2\pi)^2}\sum_{quarks} e_f^2\;\{[z^2+(1-z)^2]\epsilon^2[K_1(\epsilon\,r)]^2 + m^2[K_0(\epsilon\,r)]^2\}, \tag{2.25}$$

Notons que certains modèles [30, 31] posent la masse de courant m du quark égale à zéro.

La fonction d'onde du méson

Dans le cas des mésons vecteurs lourds (J/Ψ, Υ), une fonction d'onde non-relativiste est utilisée [28]. Le quark et l'antiquark se partagent alors de façon égale l'impulsion du méson vecteur et la fonction d'onde s'écrit :

$$\Psi^V(z,k_t) = \delta^{(2)}(k_t)\delta(z-1/2) \tag{2.26}$$

où z est la fraction d'impulsion longitudinale du photon portée par le quark, $(1-z)$ celle portée par l'antiquark, et k_t est leur impulsion transverse. En d'autres termes, le quark et l'antiquark ne sont pas autorisés à avoir de l'impulsion de Fermi (ou impulsion interne) à l'intérieur du méson vecteur. Le couplage du VM à la paire $q\bar{q}$ est donné par

$$g(\not{k}+m)\gamma_\mu, \quad \not{k} = k_\alpha\gamma^\alpha \tag{2.27}$$

où

$$g^2 = \frac{3\;\Gamma_{ee}^{VM}\;M_{VM}}{64\;\pi\;\alpha_{em}^2} \tag{2.28}$$

et Γ_{ee}^{VM} est la largeur de la désintégration $VM \to ee$.

Cette fonction d'onde non-relativiste ne peut s'appliquer au cas de quarks légers. Beaucoup de groupes ont travaillé à introduire un mouvement de Fermi [29, 30, 62, 64, 65]. Ainsi par exemple, Frankfurt *et al.* [30] écrivent la fonction d'onde comme suit :

$$\Psi^V(z,r) = z(1-z)\ \mu\ r\ K_1(\mu r), \tag{2.29}$$

où $\mu/\sqrt{2} = \sqrt{\langle k_t^2 \rangle}$ représente l'impulsion transverse moyenne du quark et r est la distance transverse entre les deux quarks du dipôle. Ivanov et Kirschner [31] écrivent la fonction d'onde du méson à partir de celle du photon en imposant que la décroissance en masse soit plus rapide dans le cas du méson vecteur (voir eq. 2.82 et 2.83).

Le choix de la fonction d'onde du méson constitue l'une des différences majeures entre les modèles.

Remarque sur le rapport σ_L/σ_T

L'amplitude 2.2 est proportionnelle aux produits $\gamma \cdot \epsilon^\gamma$ et $\gamma \cdot \epsilon^V$. Nous avons déjà explicité le vecteur de polarisation du photon ϵ^γ à l'équation 2.16. Le vecteur de polarisation du méson vecteur ϵ^V est donné par :

$$\begin{aligned} \epsilon^V(L) &= \left(\frac{q^+ + \Delta^+}{M_{VM}}, -\frac{M_{VM}}{q^+ + \Delta^+}, \vec{0}_t\right), \\ \epsilon^V(T) &= (0, 0, \vec{\epsilon}_t^{\,V}), \end{aligned} \tag{2.30}$$

où Δ^μ est l'impulsion transférée au vertex du proton. En développant le produit $\gamma^\mu \epsilon^\gamma_\mu\ \gamma^\nu \epsilon^V_\nu$, le terme longitudinal fait apparaître

$$\gamma^\mu \epsilon^\gamma_\mu\ \gamma^\nu \epsilon^V_\nu = \frac{Q}{M_{VM}} (\gamma^+ \gamma^-) \frac{q^+ + \Delta^+}{q^+} \tag{2.31}$$

grâce à la conservation du courant valable pour la somme sur tous les diagrammes et sous l'hypothèse que le méson vecteur se comporte comme un photon pour sa structure en spin [2]. Pour obtenir ce résultat, nous avons également négligé l'impulsion transverse du méson vecteur. L'amplitude $\mathcal{M}_L$ de production de mésons vecteurs longitudinaux par des photons longitudinaux amène donc un facteur Q/M_{VM} par rapport à l'amplitude $\mathcal{M}_T$ de production de mésons vecteurs polarisés transversalement par des photons transverses. Définissant $R = \sigma_L/\sigma_T = \mathcal{M}_L^2/\mathcal{M}_T^2$, le rapport des sections efficaces de production de mésons vecteurs par des photons longitudinaux et transverses, on obtient finalement que

$$R \propto \frac{Q^2}{M_{VM}^2}. \tag{2.32}$$

[2] Ceci est par exemple le cas dans le modèle de Brodsky *et al.* [29] ou lorsqu'on travaille à l'approximation non-relativiste.

2.1.4 La section efficace $H_{q\bar{q}+p}$ de l'interaction dipôle-proton

La ligne en zigzag apparaissant à la figure 2.2 peut être décrite à l'ordre dominant de QCD par un échange de deux gluons [3]. Le couplage des deux gluons au proton peut, à l'approximation du logarithme dominant, être identifié avec la distribution usuelle (diagonale) des gluons dans le proton [28, 29] (voir sections 2.2.1 et 2.2.2).

En effet [63, 66], la section efficace dipôle-proton est égale à

$$H_{q\bar{q}+p}(r) = \frac{16}{3}\alpha_S(r)\int d^2l_t \frac{V(l_t)[1-e^{il_t\cdot r}]}{(l_t^2+\mu_G^2)^2}\alpha_S(l_t^2), \tag{2.33}$$

où r est la distance transverse séparant les deux quarks et l_t est l'impulsion transverse des gluons échangés. Le paramètre $\mu_G = 1/R_c$ est la masse effective des gluons introduite de façon que les forces de couleurs ne se propagent pas au-delà du rayon de confinement R_c. La fonction de vertex gluon-gluon-nucléon est donnée par $V(l_t) = 1 - \mathcal{F}_{ch}(3l_t^2)$ où $\mathcal{F}_{ch}$ est le facteur de forme de charge du proton. Le terme principal $G(x, Q^2)$ de la densité de gluons générés perturbativement à partir du nucléon, avec $x \ll 1$ et $0 < l_t^2 < Q^2$, est donné par

$$G(x, Q^2) = \frac{4}{\pi\, x}\int_0^{Q^2} \frac{dl_t^2 l_t^2}{(l_t^2+\mu_G^2)^2}\alpha_S(l_t^2)V(l_t). \tag{2.34}$$

La section efficace dipôle-proton devient

$$H_{q\bar{q}+p}(x, r) = \frac{4\pi}{3}\alpha_S(r)\int \frac{dl_t^2}{l_t^4}(1-e^{il_t\cdot r})\frac{d(xG(x, l_t^2))}{d\log l_t^2}. \tag{2.35}$$

Dans la référence [64], Nemchik *et al.* écrivent la section efficace dipôle-proton sous la forme :

$$H_{q\bar{q}+p}(x, r) = \frac{\pi^2 r^2}{3}\int \alpha_S(l_t^2)\,\frac{dl_t^2}{l_t^2}\,\frac{4(1-J_0(l_t r))}{(l_t r)^2}\,\frac{d(xG(x, l_t^2))}{d\log l_t^2}. \tag{2.36}$$

Parce que la fonction $f(y) = 4[1 - J_0(y)]/y^2$ peut qualitativement être approximée par une fonction du type $f(y) \simeq \theta(\sqrt{A} - y)$, avec $A \simeq 10$ [67], pour des petites distances $r \ll R_c$, on trouve que [68]

$$H_{q\bar{q}+p}(x, r) = \frac{\pi^2}{3}\, r^2\, \alpha_S(Q_{eff}^2)\, xG(x, Q_{eff}^2) \tag{2.37}$$

où $x = (Q^2 + M_{VM}^2)/W^2$ et $Q_{eff}^2 \sim A/r^2$. Notons que Frankfurt *et al.* [30] ont déterminé la valeur de A à partir d'une analyse numérique de la section efficace σ_L en demandant que $G(x, Q^2)$ soit la densité de gluons habituelle calculée à l'approximation du logarithme dominant en $\alpha_S \ln(Q^2/\Lambda_{QCD}^2)$. Ils ont trouvé une valeur de $A = 9.2$ [30], qui est du même ordre que le facteur 10 [67].

Pour les grands dipôles, $r \geq R_c$, on peut négliger $J_0(kr)$ dans l'intégrant, la section efficace de dipôle sature et vaut

$$H_{q\bar{q}+p}(\nu, r) = \frac{4\pi^2}{3}\int \alpha_S(l_t^2)\frac{dl_t^2}{l_t^4}\frac{d(xG(x, l_t^2))}{d\log l_t^2}. \tag{2.38}$$

[3] On peut étendre cette modélisation à une échelle de Lipatov de gluons.

Utilisant l'équation 2.37 et puisque $\mathcal{M}$ est donnée par la formule 2.2 et que la section efficace $\gamma^{(*)}p \to VM + p$ est normalisée comme

$$\frac{d\sigma}{dt} = \frac{1}{16\pi W^4}|\mathcal{M}|^2, \tag{2.39}$$

on obtient donc que la section efficace $\gamma^{(*)}p \to VM + p$ est proportionnelle à $|xG(x, Q^2_{eff})|^2$.

Si tous les modèles présentés dans ce chapitre proposent une section efficace proportionnelle au carré de la densité de gluons, ils diffèrent par le choix de l'échelle à laquelle cette densité est prise. Ryskin [28] utilise comme échelle $(Q^2 + M^2_{VM})/4$ pour le méson J/Ψ. Brodsky et collaborateurs [29] utilisent l'échelle Q^2 pour les mésons vecteurs légers. Par après, Frankfurt, Koepf et Strikman [30] ont modifié cette échelle pour tenir compte du rescaling du processus dur (voir section 2.2.3). Martin, Ryskin et Teubner [48] tiennent compte de la fraction longitudinale de l'impulsion des quarks du dipôle ainsi que de leur impulsion transverse : $z(1-z)Q^2 + k_t^2$ lors de l'étude de la production de mésons ρ. Ivanov et Kirschner [31] choisissent $z(1-z)Q^2$ pour les mésons légers, négligeant k_t^2. L'échelle utilisée par Kuraev, Nikolaev et Zakharov [32] est de l'ordre de $(0.10 - 0.25)(Q^2 + M^2_{VM})$ après l'intégration de la forme $z(1-z)Q^2 + m_q^2$ sur z et en utilisant pour m_q la masse constituante des quarks. Toute ces échelles ne sont pas en contradiction les unes avec les autres, leur choix dépendant des approximations utilisées. Il n'est toutefois pas possible de déterminer, à la précision actuelle des calculs, qu'elle est l'échelle véritable du processus [69].

2.1.5 Quelques notations

Fixons dès à présent quelques notations que nous utiliserons souvent dans ce chapitre. Le photon de quadri-impulsion q fluctue en une paire $q\bar{q}$ d'impulsions k et $q-k$, d'impulsion transverse k_t, et portant une fraction d'impulsion longitudinale du photon z et $1-z$. Le proton incident porte une quadri-impulsion p et le proton diffusé $p' = p - \Delta$, où Δ est la quadri-impulsion transférée ($\Delta^2 = t$). Les gluons échangés ont des quadri-impulsions notées l et l' et le méson vecteur de masse M_{VM}, de largeur Γ_{VM}, porte une quadri-impulsion $q^V = q + \Delta$. La cinématique est donnée par la virtualité du photon Q^2, le carré t de la quadri-impulsion transférée au vertex du proton et W, l'énergie du centre de masse $\gamma^* p$.

D'autres notations sont également utilisées. N_c est le nombre de couleur, valant 3. C_{VM} est un facteur de charge propre à chaque méson vecteur [4] [64], $C_{VM} = 1/\sqrt{2}, 1/(3\sqrt{2}), 1/3, 2/3$ pour les mésons ρ, ω, Φ et J/Ψ, respectivement. C_F est le facteur de Casimir $(N_c^2 - 1)/(2N_c)$. α_{em} et α_S sont les constantes de structure fine et de couplage fort.

2.2 Modèles QCD de production de mésons vecteurs

Dans cette section, nous présentons l'étude de la production de mésons vecteurs par l'échange de deux gluons dont les premiers calculs sont dus à Donnachie et Landshoff [70]. A la section 2.2.1 est présenté le modèle de Ryskin [28] pour la production de mésons J/Ψ, avec les

[4] La détermination de C_{VM} vient des règles de "quark counting".

modifications qui y ont été apportées [65]. La section 2.2.2 porte sur le modèle de Brodsky et collaborateurs [29], proposant un calcul pour la production de mésons vecteurs légers, et la section 2.2.3 son extension par Frankfurt *et al.* [30]. Nous explicitons ensuite les idées de Martin, Ryskin et Teubner [48] (section 2.2.4). Les travaux de Nemchik *et al.* [64] seront traités à la section 2.3.2.

2.2.1 Le modèle de Ryskin

Ryskin présente dans l'article [28] les résultats du calcul de la section efficace de production de mésons vecteurs J/Ψ dans le régime DIS à l'approximation LLA (logarithme dominant en Q^2), et à la limite des hautes énergies où $W^2 \gg M_{VM}^2$. Pour décrire le méson J/Ψ, Ryskin utilise une fonction d'onde non-relativiste (voir eq. 2.26, 2.27).

Les diagrammes de Feynman pour la production de mésons vecteurs J/Ψ à l'approximation de Born sont présentés à la figure 2.4. En plus de ceux-ci, il faut tenir compte des deux autres diagrammes où le quark et l'antiquark ont été échangés. Nous spécifions les différentes quadri-



Figure 2.4: Diagrammes de Feynman pour la production de mésons vecteurs J/Ψ à l'approximation de Born. En plus des deux diagrammes présentés ici, il faut tenir compte des deux autres diagrammes où le quark et l'antiquark ont été échangés. Les quadri-impulsions des particules sont indiquées sur chaque graphe. La ligne en traits discontinus sert à indiquer la structure en échelle de gluons qui peut être associée.

impulsions des quarks du dipôle, les autres quadri-impulsions utilisées à la figure 2.4 ayant été définies à la section 2.1.5. Sur le graphe 2.4a, le quark porte une impulsion égale à $\frac{1}{2}q^V + k$ et l'antiquark issu de la fluctuation du photon l'impulsion r ; k représente l'impulsion interne des quarks. Sur le graphe 2.4b, le quark et l'antiquark se couplant au photon portent respectivement les impulsions $\frac{1}{2}q^V + k - l'$ et r' ; lors du couplage au méson vecteur, le quark porte l'impulsion $\frac{1}{2}q^V + k$ et l'antiquark porte $\frac{1}{2}q^V - k$.

Les règles de Cutkovsky [71] sont utilisées. Sur le graphe 2.4a, le quark portant la fraction d'impulsion z du photon est sur sa couche de masse (marqué d'une croix). L'antiquark noté avec la fraction d'impulsion $1 - z$ est presque sur sa couche de masse car nous travaillons à l'approximation non-relativiste. Seul l'antiquark d'impulsion r n'est pas sur sa couche de masse et donne un propagateur $(r^2 - m_c^2)^{-1}$ qui intervient lors de l'intégration sur l'impulsion transverse l_t des gluons. Parallèlement sur le graphe 2.4b, le seul propagateur de quarks est donné par $(r^{'2} - m_c^2)^{-1}$. En exprimant le propagateur $(r^2 - m_c^2)^{-1}$ en termes de Sudakov et en négligeant k_t devant m_c, on trouve à l'approximation non-relativiste ($z = 1/2$) que

$$\begin{aligned} r = q - h, \text{ avec } h = \frac{1}{2}q^V + k, \\ \text{d'où } r^2 = (q-h)^2 = q^2 - 2q.h + m_c^2, \\ \text{avec } h = \alpha_h q^{'} + \beta_h p^{'}, \text{ où } \alpha_h = z, \\ 2q.h = (\beta_\gamma \alpha_h + \beta_h)W^2 = -zQ^2 + m_c^2/z, \\ \text{et donc } r^2 - m_c^2 = -2\bar{Q}^2 \end{aligned} \tag{2.40}$$

où

$$\bar{Q}^2 = (Q^2 + M_\Psi^2)/4 \tag{2.41}$$

avec $M_\Psi^2 \simeq 4m_c^2$. De même pour le graphe 2.4b, on trouve que

$$r^{'2} - m_c^2 = -2\bar{Q}^2 - 2l_t^2. \tag{2.42}$$

L'amplitude à $t = 0$ pour la production diffractive de mésons J/Ψ par des photons transverses est donnée par

$$\mathcal{M}_T = i4\pi^2 M_\Psi \alpha_S \int \frac{dl_t^2}{l_t^4}\{\frac{1}{2\bar{Q}^2} - \frac{1}{2\bar{Q}^2 + 2l_t^2}\} f(x, l_t^2) e_c g_V. \tag{2.43}$$

Le facteur de couleur donne une contribution opposée pour les deux graphes de la figure 2.4. La constante g_V spécifie le couplage de la paire de quarks au méson (voir eq 2.28) et e_c est la charge du charme ($e_c^2 = 16\pi\alpha_{em}/9$). La fonction $f(x, l_t^2)$ est la densité de gluon non-intégrée, avec

$$xG(x, Q^2) = \int^{Q^2} \frac{dl_t^2}{l_t^2} f(x, l_t^2), \tag{2.44}$$

En intégrant l'équation 2.43 sur $l < \bar{Q}^2$ et en utilisant l'équation 2.39 (sans le facteur W^4 dû à une convention de normalisation), on trouve finalement pour la section efficace de production de mésons vecteurs par des photons transverses :

$$\frac{d\sigma}{dt}(\gamma_T^* p \to \Psi p)|_{t=0} = \frac{\Gamma_{ee}^{VM}\, M_\Psi^3\, \pi^3}{48\, \alpha_{em}} \frac{\alpha_S^2(\bar{Q}^2)}{\bar{Q}^8}[xG(x, \bar{Q}^2)]^2. \tag{2.45}$$

Afin d'obtenir la section efficace totale, il suffit de multiplier le résultat par $1 + Q^2/M_\Psi^2$ (voir eq. 2.32).

Ryskin et collaborateurs ont amélioré ce résultat [65]. Leur première correction porte sur l'intégrale 2.44, en incluant les effets provenant de l'impulsion transverse l_t des gluons : ils intègrent maintenant l'impulsion transverse des gluons jusqu'à l'infini. Comme de plus la distribution de gluons n'est pas connue pour $l_t^2 \to 0$, ils séparent l'intégrale en deux parties et l'amplitude devient :

$$\mathcal{M}_T \simeq i2\,\pi^2 M_\Psi\, e_c\, g_V\, \alpha_S\, [\frac{xG(x, Q_0^2)}{\bar{Q}^4} + \int_{Q_0^2}^{\infty} \frac{dl_t^2}{\bar{Q}^2(\bar{Q}^2\; +\; l_t^2)} \frac{\partial xG(x, l_t^2)}{\partial \log l_t^2}]. \tag{2.46}$$

Ryskin *et al.* [65] ont également estimé d'autres effets : la correction liée à t_{min}, l'effet dû à l'utilisation d'une fonction d'onde relativiste pour le méson J/Ψ, les effets d'une nouvelle diffusion ou absorption de la paire $c\bar{c}$, l'étude de l'ordre supérieur (NLO) et la prise en compte de la partie réelle. Certaines de ces corrections modifient sensiblement la normalisation de la section efficace mais peu sa dépendance en l'énergie.

2.2.2 Le modèle de Brodsky *et al.*

Brodsky et collaborateurs [29] étudient de façon plus générale la production de mésons vecteurs, que le méson soit un ρ, un ω, un ϕ, un J/Ψ ou un Υ. Ils proposent le calcul de la section efficace dans la région cinématique $W^2/M_{VM}^2 \gg 1$, $W^2/Q^2 \gg 1$, $-t \equiv -\Delta^2 \ll Q^2$, $Q^2 \gg \Lambda_{QCD}^2$ et $Q^2 \gg M_{VM}^2$ (figure 2.5).



Figure 2.5: Diagramme typique d'échange de deux gluons contribuant à l'amplitude. Trois autres diagrammes doivent être pris en compte lors du calcul de l'amplitude : celui où les deux gluons couplent à l'antiquark et les deux où l'un des gluons couple au quark, l'autre se couplant à l'antiquark.

Suivant le concept de factorisation énoncé à la section 2.1.1, dans le référentiel où le proton est presque au repos ($p^+ \ll q^+$), l'amplitude peut s'écrire :

$$\mathcal{M} = \sqrt{N_c} \sum_{\lambda_1,\lambda_2} \int \frac{d^2k_t \; d^2k_t'}{(16\pi^3)^2} \int_0^1 dz \int_0^1 dz' \; \Psi^{V*}_{\lambda_1\lambda_2}(k_t', z') H_{\lambda_1\lambda_2}(k_t', z'; k_t, z) \Psi^{\gamma}_{\lambda_1\lambda_2}(k_t, z), \tag{2.47}$$

où le quark (l'antiquark) porte une impulsion transverse k_t ($-k_t$) et une fraction d'impulsion longitudinale z ($1-z$) lors de son couplage au photon, l'impulsion du quark se couplant au méson vecteur étant caractérisée par k_t' et z'. Les indices λ_1 et λ_2 indiquent les hélicités de la paire quark-antiquark, qui sont conservées pendant l'interaction de la paire sur le proton. Ψ^V et Ψ^γ sont les fonctions d'onde du méson vecteur et du photon dans le formalisme du cône de lumière (voir eq. 2.19). Afin d'évaluer $H_{\lambda_1\lambda_2}$, il faut considérer, en plus du graphe 2.5, les trois autres cas présentés à la figure 2.6. Dans les 4 cas, l'impulsion longitudinale du quark est conservée ($z' = z$). Les graphes où les gluons se couplent au même quark ou antiquark impliquent une conservation de l'impulsion transverse du quark non touché ($k'_t = k_t$). Dans les deux autres cas, à la limite où $\Delta_t \ll l_t$, l'impulsion transverse du quark sortant est égale à $k'_t = k_t \pm l_t$. Cela mène au résultat très simple

$$H_{\lambda_1\lambda_2}(k'_t, z'; k_t, z) = 16\pi^3 \int \{\, 2\delta(k'_t - k_t) \;-\; \delta(k'_t - k_t + l_t) \\ - \delta(k'_t - k_t - l_t) \,\}\, \delta(z' - z)\, \mathcal{J}(l) \frac{d^2l_t\, dl_+}{16\pi^3}. \tag{2.48}$$



Figure 2.6: Diagrammes en théorie perturbative du cône de lumière contribuant à l'amplitude de diffusion d'une paire $q\bar{q}$ sur une cible sans couleur.

Le facteur d'impact $\mathcal{J}(l)$ inclut les propagateurs des gluons et l'amplitude de diffusion gluons-nucléon (il correspond à la notation $V(l_t)/l_t^4$ de l'équation 2.33). A l'approximation DLLA du double logarithme dominant (en $\ln(Q^2)$ et en $\ln(1/x)$), $\mathcal{J}(l)$ est purement imaginaire et

$$\int^{Q^2} \frac{d^2l_t\, dl_+}{16\pi^3}\, l_t^2\, \mathcal{J} = i\frac{2\pi^2\, \alpha_S}{N_c}(W^2 + Q^2)xG(x, Q^2), \tag{2.49}$$

où $x = Q^2/W^2$ et l'échelle Q^2 à laquelle est prise la densité de gluons est fixée par la limite d'intégration choisie dans la présente approximation où $l_t^2 \ll Q^2$ (ce qui est la définition même de l'approximation $LL(Q^2)$).

L'intégration sur $d^2k_t dz'$ (eq. 2.47) des facteurs δ (introduits à l'équation 2.48) fait apparaître une combinaison $\Delta\Psi^{\gamma}_{\lambda_1\lambda_2}$ des fonctions d'onde Ψ^{γ}. Utilisant l'équation 2.19, cette combinaison vaut

$$\begin{aligned}\Delta\Psi^{\gamma}_{\lambda_1\lambda_2} &= 2\Psi^{\gamma}_{\lambda_1\lambda_2}(k'_t,z)-\Psi^{\gamma}_{\lambda_1\lambda_2}(k'_t+l_t,z)-\Psi^{\gamma}_{\lambda_1\lambda_2}(k'_t-l_t,z)\\ &= \frac{-4e\,e_f\,\delta_{\lambda_1,-\lambda_2}\,Q\,l_t^2}{\{Q^2\ +\ [(k_t'^2\ +\ m^2)/z(1-z)]\}^2 z(1-z)}.\end{aligned} \tag{2.50}$$

L'amplitude devient donc (en négligeant Q^2 devant W^2 et pour des valeurs asymptotiquement grandes de Q^2 pour lesquelles on peut négliger $(k_t'^2\ +\ m^2)/z(1-z)$ devant Q^2) :

$$\begin{aligned}\mathcal{M} &= \sqrt{N_c}\sum_{\lambda_1,\lambda_2}\int\frac{d^2k'_t}{16\pi^3}\int_0^1 dz\,\Psi^{V*}_{\lambda_1\lambda_2}(k'_t,z)\,\mathcal{J}(l)\,\frac{d^2l_t\,dl_+}{16\pi^3}\,\Delta\Psi^{\gamma}_{\lambda_1\lambda_2}\\ &= \frac{-8iW^2\,\pi^2\,e\,e_f\,\alpha_S}{Q^3\,\sqrt{N_c}}xG(x,Q^2)\int\frac{d^2k'_t}{16\pi^3}\int_0^1\frac{dz}{z(1-z)}\sum_{\lambda}\Psi^{V}_{\lambda,-\lambda}(k'_t,z).\end{aligned} \tag{2.51}$$

La fonction d'onde $\Psi^V_{\lambda,-\lambda}$ est donnée dans le formalisme du cône de lumière (cfr eq. 2.15 et eq. 2.19 dans le cas du photon) par

$$\Psi^V_{\lambda,-\lambda}(k'_t,z)=N_V\frac{\bar{v}_{-\lambda}(q-k)}{\sqrt{1-z}}\gamma\cdot\epsilon^V\frac{u_\lambda(k)}{\sqrt{z}}\Psi^V(k'_t,z)\frac{1}{M_{VM}}, \tag{2.52}$$

où $\Psi^V(k'_t,z)$ est la fonction d'onde sur le cône de lumière [60]. N_V est un facteur de normalisation et ϵ^V est le vecteur de polarisation du méson vecteur (voir eq. 2.30). La contribution dominante vient de la production de mésons vecteurs longitudinaux par des photons longitudinaux. En effet, le rapport des sections efficaces σ_L/σ_T évolue avec Q^2 comme Q^2/M^2_{VM} (eq. 2.32). Dans le cas longitudinal,

$$\Psi^V_{\lambda,-\lambda}(k'_t,z)=-N_V\Psi^V(k'_t,z). \tag{2.53}$$

Définissant

$$\Phi^V(Q,z)=\int^{Q^2}\frac{d^2k'_t}{16\pi^3}\Psi^V(k'_t,z), \tag{2.54}$$

la partie longitudinale de l'amplitude s'écrit

$$\mathcal{M}_L=\frac{16iW^2\,\pi^2\,e\,e_f\,\alpha_S}{Q^3\,\sqrt{N_c}}xG(x,Q^2)N_V\int_0^1\frac{dz}{z(1-z)}\,\Phi^V(Q,z). \tag{2.55}$$

La valeur de $\mathcal{M}_L$ est calculable en utilisant le lien entre Φ^V et la largeur de désintégration du méson vecteur en une paire e^+e^-, Γ^{VM}_{ee}, ainsi que le moment inverse effectif η_{VM} de l'amplitude de distribution du méson vecteur, qui contrôle le leading twist de l'amplitude en électroproduction.

$$\begin{aligned}\eta_{VM} &\equiv \frac{1}{2}\frac{\int[dz/z(1-z)]\,\Phi^V(z)}{\int dz\,\Phi^V(z)},\\ \int dz\,\Phi^V(z) &= \frac{f_V}{2\sqrt{2N_c}\,N_V\,e_f},\\ \Gamma^{VM}_{ee} &= \frac{8\,\pi\,\alpha^2_{em}\,f^2_V}{3\,M_{VM}},\end{aligned} \tag{2.56}$$

où f_V représente le couplage au méson vecteur.

La section efficace de production de mésons vecteurs longitudinaux est finalement donnée par

$$\frac{d\sigma}{dt}(\gamma_L^* p \to VMp)|_{t=0} = \frac{12\,\pi^3\,\Gamma_{ee}^{VM}\,M_{VM}\,\alpha_S{}^2(Q^2)\,\eta_{VM}^2\,[xG(x,Q^2)]^2}{\alpha_{em}\,Q^6\,N_c^2}. \tag{2.57}$$

Ce résultat [5] limité aux photons longitudinaux, est en accord avec celui de Ryskin [28] présenté à la section précédente.

La section efficace de production de mésons vecteurs transverses par des photons transverses n'a pas été calculée par Brodsky *et al.* [29]. En effet, selon eux, des effets non perturbatifs interviennent et empêchent le calcul (voir discussion de cette hypothèse à la section 2.2.4). Ces effets sont liés à la région dite des “end-points” ou limites d'intégration ($z, 1-z=0$). En effet, quand z approche de 0 ou 1, le dénominateur en $z(1-z)$ présent dans l'équation 2.51 présente un pôle, rendant la série de perturbation inutile. Dans le cas de la section efficace longitudinale, on s'attend à ce que la contribution des “end-points” soit négligeable puisque la fonction d'onde Φ_L^γ est proportionelle à z ou $(1-z)$ quand z ou $1-z$ s'annule. Par contre, dans le cas de la section efficace transverse, la contribution des “end-points” peut être importante à cause de la valeur non nulle de la fonction d'onde d'un photon transverse à $z \sim 0, 1$.

Il est également nécessaire de tenir compte de la partie réelle de l'amplitude. Cette dernière est non négligeable pour des valeurs de x suffisamment petites et pour de grands Q^2. Elle peut être estimée grâce aux relations de dispersion. La section efficace totale pour des photons longitudinaux est donc :

$$\begin{aligned}&\frac{d\sigma}{dt}(\gamma_L^* p \to VMp)|_{t=0} = \\ &\frac{12\,\pi^3\,\Gamma_{ee}^{VM}\,M_{VM}\,\alpha_S{}^2(Q^2)\,\eta_{VM}^2\,|\,[1\;+\;i(\pi/2)(\partial/\partial\ln x)]\;xG(x,Q^2)|^2}{\alpha_{em}\,Q^6\,N_c^2}.\end{aligned} \tag{2.58}$$

2.2.3 Les travaux de Frankfurt *et al.*

Frankfurt *et al.* [30] ont prolongé les travaux de Brodsky *et al.* [29]. Ils ont étendu le résultat présenté à l'équation 2.58 à l'approximation du logarithme dominant en Q^2 ($\alpha_S \log(Q^2/\Lambda_{QCD}^2)$), moins restrictive que celle du double logarithme dominant DLLA. Pour ce faire, ils passent dans l'espace du paramètre d'impact. Ils introduisent un facteur $T(Q^2)$ dans la formule 2.58 afin de tenir compte des effets préasymptotiques ($T(Q^2 \to \infty) = 1$). En effet, la formule 2.58 n'est valable que pour de très grandes valeurs de Q^2, c'est-à-dire dans le cas où l'impulsion transverse des quarks de la paire peut être négligée. Pour étudier la région sub-asymptotique, ils considèrent les effets de l'impulsion de Fermi transverse des quarks à l'intérieur du méson vecteur, ce qui mène à une diminution significative de la section efficace pour des valeurs de Q^2 moyennement grandes.

[5] Dans l'article original de Brodsky *et al.* [29], un facteur 4 a été oublié dans le numérateur de la formule correspondante [65], il a été restauré ici.

Dans leur approche, l'échelle à laquelle sont estimées α_S et la densité de gluons n'est plus Q^2 comme précédemment, mais bien $Q^2_{eff} \simeq Q^2 |r_{\sigma_L(Q^2)}/r_{\sigma_{VM}(Q^2)}|^2$, obtenue à cause du "rescaling" du processus dur. En effet, la production de mésons vecteurs σ_{VM} et la fonction de structure longitudinale F_L ou σ_L sont caractérisées par des distances transverses différentes entre le quark et l'antiquark ($r_{\sigma_{VM}} \neq r_{\sigma_L}$), car celles-ci dépendent du processus considéré [62]. Comme l'échelle utilisée pour F_L est Q^2 ($Q^2 = \lambda/r^2_{\sigma_L}$), l'échelle associée à une distance transverse $r_{\sigma_{VM}}$ est alors Q^2_{eff} ($Q^2_{eff} = \lambda/r^2_{\sigma_{VM}}$). La différence entre Q^2 et Q^2_{eff} est introduite parce que les corrections d'ordres supérieurs doivent également être prises en compte. Dans le cas des mésons vecteurs J/Ψ et Υ, Q^2_{eff} est significativement plus grande que l'échelle $\bar{Q^2} = (Q^2 + M^2_{VM})/4$ utilisée dans le modèle de Ryskin [28, 65]. Cette nouvelle formule vaut à nouveau uniquement dans le cas de photons polarisés longitudinalement, la distance transverse séparant le quark et l'antiquark de la paire $q\bar{q}$ étant alors suffisamment petite. Dans le cas des photons polarisés transversalement, cette distance est intermédiaire entre la distance typique en photoproduction et la petite distance du cas longitudinal car des effets non perturbatifs interviennent.

Frankfurt, Koepf et Strikman ont également estimé la contribution de la boucle dure ($\gamma^* \rightarrow \rho$) à la dépendance en t de la section efficace de production de mésons vecteurs. Cette contribution est faible, ils trouvent que

$$\int d^2r\ dz\ \Psi_{\gamma_L}(z,r)\ \sigma(r^2)\ \Psi_V(z,r)\ e^{-iz\ p_t \cdot r} \propto\ e^{B_V t/2}|_{t=-p_t^2} \tag{2.59}$$

avec $B_V \leq 0.7$ GeV^{-2}, ce qui est bien inférieur aux pentes mesurées expérimentalement (voir par exemple [4]). La dépendance en t de la section efficace de production de mésons vecteurs provient donc presque entièrement du facteur de forme des deux gluons dans la cible $G_{2g}(t)$ et est donc universelle pour toutes les productions de mésons vecteurs.

Frankfurt et collaborateurs ont ensuite étudié la production de mésons vecteurs lourds polarisés transversalement [62] à l'approximation du logarithme dominant en Q^2, que ce soit en photoproduction ou en électroproduction. L'application du théorème de factorisation QCD pour la production diffractive de mésons vecteurs polarisés transversalement n'est valable que si la masse du quark est suffisamment élevée, car la taille transverse de la paire $q\bar{q}$ décroît avec la masse des quarks.

La section efficace totale de production de mésons vecteurs lourds s'écrit finalement :

$$\begin{aligned}\frac{d\sigma}{dt}(\gamma^* p \rightarrow VMp)|_{t=0} &= \frac{4\,\pi^3\,\Gamma_{VM}\,M^3_{VM}}{3\,\alpha_{em}\,(Q^2\ +\ 4\,m^2)^4}\,\eta^2_{VM}\,T(Q^2) \\ |\,\alpha_S{}^2(Q^2_{eff})\,[1\ +\ i(\pi/2)(\partial/\partial\ln x)]\ xG(x,Q^2_{eff})|^2 R(Q^2)(1+\varepsilon R).\end{aligned} \tag{2.60}$$

où ε défini à l'équation 1.17 est le paramètre relié à la polarisation du photon virtuel, la valeur $\varepsilon = 0$ correspond à une polarisation purement transverse et $\varepsilon = 1$ à un mélange égal de polarisations longitudinale et transverse. $R(Q^2)$ a été introduit afin de décrire le rapport σ_L/σ_T tel que

$$R = \frac{\sigma_L}{\sigma_T} = \frac{1}{R(Q^2)}\frac{Q^2}{M^2_{VM}}. \tag{2.61}$$

Dans cette formule, la masse de courant m des quarks est prise différente de zéro.

Notons également que, lorsque l'on étudie la production de mésons vecteurs lourds, les fractions d'impulsion portées par les deux gluons, β_i et β_j, sont différentes :

$$\begin{aligned} \beta_i &= \frac{M_X^2 \ + \ \langle l_t^2 \rangle \ + \ Q^2}{Q^2 + M_{VM}^2} x, \\ \beta_j &= \frac{M_X^2 \ + \ \langle l_t^2 \rangle \ - \ M_{VM}^2}{Q^2 + M_{VM}^2} x, \\ \text{où} \ \ M_X^2 &= \frac{k_t^2 \ + \ m^2}{z(1-z)} \end{aligned} \tag{2.62}$$

est le carré de la masse invariante de la paire $q\bar{q}$ produite. Il faut dès lors utiliser les densités de gluons non-diagonales dans l'équation 2.60. Dans l'approximation du logarithme dominant en Q^2, les distributions de gluons non-diagonales ne sont toutefois pas trop éloignées des distributions usuelles [72].

2.2.4 Le modèle de Martin, Ryskin et Teubner

Martin, Ryskin et Teubner étudient la production diffractive de mésons ρ en théorie perturbative QCD à grandes valeurs de Q^2 ($Q^2 > 5$ GeV^2) [48]. Ils affirment que l'application de l'approche perturbative est valable aussi bien pour la section efficace transverse que pour la section efficace longitudinale. En cela, ils diffèrent grandement de ce qui est fréquemment écrit dans les articles plus anciens [29]. Leur argument repose sur des observations faites à HERA. En effet, si la section efficace transverse σ_T était dominée par des effets non-perturbatifs, σ_T aurait des comportements similaires à ceux observés en photoproduction : une dépendance "soft" de σ_T en l'énergie $\propto W^{0.2}$ et une pente importante, caractérisant la dépendance exponentielle en t de la section efficace, $b \propto 9 - 10$ GeV^{-2}. On devrait donc voir une dépendance du rapport R en W qui varie pour des valeurs de Q^2 différentes, ainsi qu'une dépendance de R avec t. De plus, on s'attendrait à avoir une dépendance en Q^2 au moins comme $1/Q^8$, lorsqu'on limite l'intégration sur z de la partie transverse de l'amplitude aux zones $z \leq \mu^2/Q^2$ et $1 - z \leq \mu^2/Q^2$, où μ^2 représente une petite virtualité. Ils soulignent que ces effets n'ont pas été observés expérimentalement.

Dans une approche perturbative pQCD, utilisant les composantes leading-twist des fonctions d'onde du méson ρ dans le formalisme du cône de lumière, ils trouvent que le rapport des sections efficaces $R = \sigma_L/\sigma_T$ est proportionnel à Q^2/m^2 où m est la masse de courant des quarks. Cette augmentation extrêmement rapide de R avec Q^2 n'est pas observée expérimentalement. Tenant compte des effets de higher twist dans la fonction d'onde du méson ρ, ils suggèrent de remplacer m par un facteur de l'ordre de M_ρ. Le rapport R devient alors $R = cQ^2/M_\rho^2$, où la constante c est de l'ordre de 0.5. Le désaccord entre la prédiction et les mesures expérimentales de l'évolution en Q^2 du rapport R est atténué, mais subsiste. Il est lié, selon eux, à la prise en compte de la fonction d'onde du méson ρ. Ils résolvent ce problème en utilisant l'hypothèse de dualité entre hadrons et partons [48], selon laquelle la production totale de hadrons $e^+e^- \to hadrons$, dans une fenêtre de masse ΔM, est donnée par la production partonique :

$$\langle \sum_h \sigma(e^+e^- \to \gamma^* \to h) \rangle_{\Delta M^2} \simeq \langle \sum_q \sigma(e^+e^- \to \gamma^* \to q\bar{q}) \rangle_{\Delta M^2}. \tag{2.63}$$

Appliquant la dualité partons-hadrons au cas de la production de mésons ρ, on obtient :

$$\sigma(\gamma^* p \to \rho p) \simeq 0.9 \sum_{q=u,d} \int_{M_a^2}^{M_b^2} \frac{d\sigma[\gamma^* p \to (q\bar{q})p]}{dM^2} dM^2. \tag{2.64}$$

En effet, pour de petites masses M, le seul canal ouvert est celui de la production de deux pions: $\gamma \to (q\bar{q}) \to 2\pi$ (le facteur 0.9 tient compte de la production de mésons vecteurs ω), avec $\Delta M^2 = M_b^2 - M_a^2 \simeq 1\mathrm{GeV}^2$. Ils étudient donc la production d'une paire de quark $q\bar{q}$ ouverte (voir figure 2.7). Longtemps après l'interaction avec le proton, le confinement agit sur la paire et la force à former un méson ρ, car il n'existe pratiquement pas d'autre choix.



Figure 2.7: Production d'une paire $q\bar{q}$ ouverte.

Les formules utilisées par Martin, Ryskin et Teubner pour la production diffractive de paires $u\bar{u}$ et $d\bar{d}$ ouvertes sont inspirées du travail de Levin *et al.* sur les paires $c\bar{c}$ ouvertes [61]. Dans le cas de quarks légers, on pose la masse de courant du quark m égale à zéro. L'échelle à laquelle la distribution de gluons est étudiée est prise égale à

$$K^2 = z(1-z)Q^2 + k_t^2 = k_t^2 \frac{Q^2 + M^2}{M^2}, \tag{2.65}$$

où M est la masse invariante de la paire $q\bar{q}$ (voir eq. 2.62). L'échelle K^2 détermine les distances transverse typiques du processus $b_T \sim 1/K$.

La section efficace s'écrit :

$$\frac{d^2\sigma}{dM^2\, dt}|_{t=0} = \sum_{\lambda,\lambda'} \int \frac{d^2k_t\, dz}{16\pi^3}\, \delta(M^2 - \frac{k_t^2}{z(1-z)})\, \frac{|\mathcal{M}_{\lambda,\lambda'}|^2}{16\pi^2} \tag{2.66}$$

La fonction δ apparaît parce que la paire $q\bar{q}$ est un système de masse M. La factorisation de l'amplitude $\mathcal{M}$ suit celle présentée dans le modèle de Brodsky *et al.* [29]. Cependant, ici, aucune fonction d'onde du méson n'est nécessaire :

$$\mathcal{M}_{\lambda,\lambda'}(z, k_t) = \sqrt{N_c} \int d^2k_t' \int_0^1 dz' \Psi_{\lambda,\lambda'}(k_t', z') H_{\lambda,\lambda'}(k_t', z'; k_t, z). \tag{2.67}$$

Suivant de près le modèle de Brodsky *et al.* [29] (voir eq. 2.48 et 2.50), tout en envisageant également le cas de la production transverse, et en transformant l'intégrale sur k_t^2 en une intégrale sur K^2, on trouve finalement :

$$\frac{d^2\sigma_L}{dM^2\,dt} = \frac{4\pi^2 e_q^2 \alpha_{em}}{3} \frac{Q^2}{(Q^2+M^2)^4} \int_{K_0^2}^{(1/4)(Q^2+M^2)} \frac{dK^2 K^2}{\sqrt{1-4K^2/(Q^2+M^2)}} [I_L(K^2)]^2, \qquad (2.68)$$

$$\frac{d^2\sigma_T}{dM^2\,dt} = \frac{4\pi^2 e_q^2 \alpha_{em}}{3} \frac{M^2}{(Q^2+M^2)^3} \int_{K_0^2}^{(1/4)(Q^2+M^2)} \frac{dK^2(1-2K^2/(Q^2+M^2))}{\sqrt{1-4K^2/(Q^2+M^2)}} [I_T(K^2)]^2, \qquad (2.69)$$

où K_0 est une valeur limite ("cut off") et où $I_{L,T}$ sont les intégrations sur l'impulsion transverse l_t des gluons échangés. Dans l'approximation du logarithme dominant en K^2, ces intégrations s'écrivent :

$$I_L^{LLA} = I_T^{LLA} = \frac{\alpha_S(K^2)}{K^2} \int^{K^2} \frac{dl_t^2}{l_t^2} f(x, l_t^2) = \frac{\alpha_S(K^2)}{K^2} xG(x, K^2). \qquad (2.70)$$

Dans ce cas, $I_{L,T}$ sont proportionnels à

$$I_{L,T} \propto x^{-\lambda} \frac{(K^2)^\gamma}{K^2} \qquad (2.71)$$

car la densité de gluons peut être paramétrisée comme

$$xG(x, K^2) \propto x^{-\lambda}\, (K^2)^\gamma. \qquad (2.72)$$

La dépendance en x de la densité de gluons est décrite par le paramètre λ et celle en K^2 par le paramètre γ, appelé dimension anomale du gluon. Ce dernier dépend de K^2 et de x ; les résultats expérimentaux indiquent que γ augmente lorsque x et K^2 décroîssent. Ce comportement est illustré à la figure 2.8 qui présente γ en fonction de x pour différentes valeurs de K^2.

En utilisant l'angle polaire θ du quark relativement à la direction du proton, dans le référentiel de repos du système $q\bar{q}$, on peut définir $k_t = (1/2)M\sin\theta$. Les équations 2.68 et 2.69 peuvent se réécrire à l'aide des matrices de rotation $d^J_{\lambda,\mu}$:

$$\begin{aligned}
\frac{d^2\sigma_L}{dM^2\,dt} &= \frac{4\pi^2 e_q^2 \alpha_{em}}{3} \frac{Q^2}{(Q^2+M^2)^2} \frac{1}{8} \int_{-1}^{1} d\cos\theta\, |d^1_{10}(\theta)|^2\, |I_L|^2, \\
\frac{d^2\sigma_T}{dM^2\,dt} &= \frac{4\pi^2 e_q^2 \alpha_{em}}{3} \frac{M^2}{(Q^2+M^2)^2} \frac{1}{4} \int_{-1}^{1} d\cos\theta\, [\, |d^1_{11}(\theta)|^2 + |d^1_{1-11}(\theta)|^2\,]\, |I_T|^2. \qquad (2.73)
\end{aligned}$$

Puisque $I_{L,T}^{LLA}$ sont proportionnels à $(\sin\theta)^{\gamma-1}$, en supposant γ constant sur la région d'intégration en $\cos\theta$, on trouve le résultat suivant :

$$R = \frac{\sigma_L}{\sigma_T} = \frac{Q^2}{M^2} (\frac{\gamma}{1+\gamma})^2. \qquad (2.74)$$



Figure 2.8: Distribution de γ en fonction de x pour différentes valeurs de K^2 (2.5, 5., 10. et 20 GeV^2 de haut en bas). Cette distribution a été produite en utilisant la librairie PDFLIB [73] pour la paramétrisation MRS(R2) [74] des densités de partons.

La dépendance en γ permet d'atténuer la croissance en Q^2 de R. Les sections efficaces longitudinales σ_L et transverse σ_T reçoivent leur contribution dominante lors de l'intégration sur K^2 dans la région $K^2 \leq Q^2/4$. Dès lors, afin d'estimer la valeur de R moyennée sur un domaine en Q^2, il est nécessaire d'évaluer γ à une échelle $K^2 \leq Q^2/4$. Une certaine ambiguïté entoure le choix de la fenêtre de masse ΔM^2, affectant la normalisation de sections efficaces, mais le rapport R est peu sensible à cette incertitude.

Dans une étude postérieure [75], Martin, Ryskin et Teubner ont utilisé les densités de gluons non-diagonales plutôt que les densités de gluons usuelles. L'effet en est une augmentation de la section efficace de production diffractive de mésons vecteurs ρ à grandes valeurs de Q^2. Ils ont également étudié d'autres effets sur la dépendance en Q^2, tels que la correction à l'ordre suivant (NLO) et l'évolution en Q^2 du paramètre b, caractérisant la pente en t, lors de l'intégration $d\sigma/dt \propto e^{-b|t|}$. Ces effets sont moins importants que celui dû aux densités de gluons non-diagonales.

2.3 Extension à l'étude de la violation de $SCHC$

Dans cette section, nous présentons trois calculs de la production diffractive de mésons vecteurs basés sur l'échange de deux gluons en chromodynamique quantique (QCD) perturbative, portant sur la violation de $SCHC$ ($NSCHC$) : le modèle de Ivanov et Kirschner [31] (section 2.3.1), le modèle de Kuraev, Nikolaev et Zakharov [32] (section 2.3.2) et celui de Royen et Cudell [33] (section 2.3.3).

Pour des quarks sans masse, l'hélicité de la paire $q\bar{q}$ - entendue comme la somme des hélicités du quark et de l'antiquark - est égale à zéro. Par conservation du moment angulaire total, l'hélicité du photon γ est entièrement cédée à la projection du moment orbital de la paire suivant l'axe du photon. L'hélicité du méson vecteur est donnée, quant à elle, par la projection du moment angulaire orbital de la paire $q\bar{q}$ suivant la direction de l'impulsion du méson. Un changement d'hélicité ("helicity flip") entre le photon et le méson vecteur provient donc d'un changement de la projection du moment angulaire de la paire durant l'interaction avec les gluons, alors que l'hélicité totale de la paire $q\bar{q}$ reste inchangée, de même que son paramètre d'impact. La modification du moment angulaire est due à l'apport à la paire d'impulsion transverse provenant des gluons, de l'ordre de $\sqrt{|t|}$. On peut donc s'attendre à ce que les amplitudes avec simple changement d'hélicité soient proportionnelles à $\sqrt{|t|}$.

On verra également que les calculs indiquent qu'un changement d'hélicité est possible uniquement dans le cas où le quark et l'antiquark se partagent l'impulsion longitudinale du photon de façon asymétrique (i.e. z, la fraction d'impulsion longitudinale du photon portée par le quark, est différente de 1/2). Une description non-relativiste des mésons vecteurs lourds, négligeant le mouvement de Fermi longitudinal, ne prédit donc pas de changement d'hélicité entre le méson et le photon.

A partir d'ici, nous changeons de notation, et notons les différentes amplitudes d'hélicité $\mathcal{M}_{\lambda,\lambda'}$ sous la forme $T_{\lambda_\rho\lambda_\gamma}$.

Les trois modèles présentés prédisent les dépendances en Q^2 et t des amplitudes $T_{\lambda_\rho\lambda_\gamma}$, le plus souvent au travers de leurs rapports. Ils prédisent également la hiérarchie suivante :

$$T_{00} > T_{11} > T_{01} > T_{10} > T_{1-1} \tag{2.75}$$

à condition que Q^2 soit plus grand que quelques GeV^2 et $|t| < Q^2$.

2.3.1 Le modèle de Ivanov et Kirschner

Le modèle pQCD de Ivanov et Kirschner [31] calcule les amplitudes de transition pour des mésons vecteurs légers, utilisant des quarks légers et négligeant leur masse ($m_q = 0$). Les amplitudes de transition, excepté celle avec double changement d'hélicité, sont proportionnelles à la densité de gluons $xG(x, \tilde{Q}^2)$ où $\tilde{Q}^2 = z(1-z)Q^2 < Q^2/4$. Suivant le modèle de Martin, Ryskin et Teubner [48], le caractère spécifique du modèle de Ivanov et Kirschner provient, à l'approximation $LL(Q^2)$, de la dépendance d'échelle de la densité de gluon

$$G(x, \tilde{Q}^2) = G(x, {Q_0}^2)[(\tilde{Q}^2)/{Q_0}^2]^\gamma, \tag{2.76}$$

L'introduction de la dimension anomale γ permet de supprimer les singularités aux limites ("end-points") pour $z \to 0, 1$ et donc de restaurer la factorisation pour les amplitudes transverses [76].

Suivant les principes de factorisation de la section 2.1.1 et les notations précisées à la section 2.1.5,

$$\mathcal{M} = iW^2 \int \frac{d^2 l_t}{l_t^2 \, (l-\Delta)_t^2} I_{\gamma\to\rho} J_p, \tag{2.77}$$

où J_p est le facteur d'impact du proton (noté $\mathcal{J}(l)$ dans l'eq. 2.48) et $I_{\gamma\to\rho}$ celui du photon, que l'on peut écrire comme la convolution

$$I_{\gamma\to\rho}(l,\Delta) = \int \frac{d^2\vec{k}_1 dz_1}{16\pi^3}\frac{d^2\vec{k}_2 dz_2}{16\pi^3}\Psi_{\gamma^*}(\vec{k}_1,z_1)H^{dipole}(\vec{k}_1,\vec{k}_2,z_1,z_2,\vec{l}_t,\vec{\Delta}_t)\Psi^*_\rho(\vec{k}_2,z_2). \quad (2.78)$$

Les fonctions d'onde utilisées pour le photon Ψ_γ sont données par les équations 2.19-2.20 pour le photon longitudinal et 2.23 pour le cas transverse. Réécrivons la fonction d'onde du photon longitudinal comme :

$$\Psi^L_\gamma(\vec{k},z) \sim z(1-z)\frac{\Phi(M)}{z(1-z)}, \quad (2.79)$$

$$\Phi(M) = \frac{1}{Q^2+M^2}, \quad (2.80)$$

$$\text{avec } M^2 = \frac{k^2}{z(1-z)}, \quad (2.81)$$

M étant la masse invariante de la paire $q\bar{q}$ (cfr eq. 2.62). Supposant que $\Phi(M)$ décroît plus rapidement à grande masse M pour le méson ρ que pour le photon, on choisit la fonction d'onde du méson vecteur ρ longitudinal, Ψ^L_ρ, par analogie avec celle du photon comme [6] :

$$\Psi^L_\rho(\vec{k},z) = -\frac{3}{2}\delta_{\lambda,-\lambda'}f_\rho z(1-z)\frac{\Phi(M^2)}{z(1-z)}, \quad (2.82)$$

où f_ρ est relié à la largeur de la désintégration du ρ en e^+e^-. De manière similaire,

$$\Psi^T_\rho(\vec{k},z) = \pm\frac{3}{4}\delta_{\lambda,-\lambda'}f_\rho\sqrt{z(1-z)}\{(1-2z)\mp\lambda\}(\epsilon^V_t\frac{\vec{k}}{k})\frac{\Phi(M^2)}{z(1-z)}. \quad (2.83)$$

La fonction de dipôle H^{dipole} est une somme de fonctions δ tenant compte des différentes possibilités de couplage des gluons à la paire $q\bar{q}$ (similaires aux fonctions δ de l'eq. 2.48) :

$$H^{dipole}(\vec{k}_1,\vec{k}_2,z_1,z_2,\vec{l}_t,\vec{\Delta}_t) = 16\pi^3\,\frac{\alpha_S\sqrt{N_C^2-1}}{N}\,\delta(z_1-z_2)\,[\,\delta(\vec{k}_1-\vec{k}_2-\vec{\Delta}_t z_1)\;+$$
$$\delta(\vec{k}_1-\vec{k}_2+\vec{\Delta}_t(1-z_1))\;-\;\delta(\vec{k}_1-\vec{k}_2+\vec{l}_t-\vec{\Delta}_t z_1)\;-\;\delta(\vec{k}_1-\vec{k}_2-\vec{l}_t+\vec{\Delta}_t(1-z_1))]. \quad (2.84)$$

[6]Le fait de choisir une fonction d'onde qui décroît rapidement avec M a des conséquences sur le domaine en z accessible. En effet, l'équation 2.62 relie M et $1/(z(1-z))$ et donc si des grandes valeurs de M sont difficilement accessibles, il en va de même pour les valeurs de z et de $1-z$ proches de 0. On comprend donc que la fonction d'onde choisie par Ivanov et Kirschner permet d'éviter les problèmes d'intégration aux limites.

En passant dans l'espace du paramètre d'impact par une transformée de Fourier [7]

$$\begin{aligned} & H^{dipole}(\vec{r}_1,\vec{r},z_1,z_2,\vec{l}_t,\vec{\Delta}_t) \\ &= \int \frac{d^2k_1}{2\pi}\frac{d^2k_2}{2\pi} H^{dipole}(\vec{k}_1,\vec{k}_2,z_1,z_2,\vec{l}_t,\vec{\Delta}_t)\cdot e^{-i\vec{k}_1\vec{r}_1}e^{i\vec{k}_2\vec{r}} \\ &= 16\pi^3\frac{\alpha_S\sqrt{N_C^2-1}}{N_C}\delta(\vec{r}-\vec{r}_1)\delta(z_1-z_2)f(\vec{l}_t,\vec{\Delta}_t,\vec{r},z_1), \end{aligned} \tag{2.87}$$

où $\vec{r}$ est la différence entre les paramètres d'impact du quark et de l'antiquark. Le facteur d'impact du dipôle est proportionnel à $\delta(\vec{r}-\vec{r}_1)$ qui reflète la propriété que, à l'ordre où le calcul est effectué, l'interaction ne modifie pas la différence entre les paramètres d'impact de la paire, c'est-à-dire la dimension du dipôle. Le terme $f(\vec{l},\vec{\Delta},\vec{r},z_1)$

$$f(\vec{l}_t,\vec{\Delta}_t,\vec{r},z_1) = e^{i\vec{\Delta}\vec{r}z}(1-e^{-i\vec{l}_t\vec{r}})(1-e^{-i(\vec{\Delta}_t-\vec{l}_t)\vec{r}}) \tag{2.88}$$

tend vers zéro si l'un des gluons possède une impulsion nulle (dans ce cas, il ne peut résoudre la paire $q\bar{q}$) ou si $\vec{r}$ tend vers zéro (transparence de couleur). On a finalement

$$I_{\gamma\to\rho}(\vec{l},\vec{\Delta}) = \frac{\alpha_S\sqrt{N_c^2-1}}{N_c}\int\frac{d^2\vec{r}dz}{16\pi^3}\Psi_{\gamma^*}(\vec{r},z)f(\vec{l},\vec{\Delta},\vec{r},z)\Psi_\rho^*(\vec{r},z). \tag{2.89}$$

Les fonctions d'onde ainsi que le terme $f(\vec{l},\vec{\Delta},\vec{r},z)$ sont exprimées sous la forme d'un développement de Taylor aux petites valeurs de r. Cela permet d'étudier les différentes hélicités. En effet, comme on l'a vu, le proton étant un état “blanc” de couleur, son facteur d'impact s'annule si l'impulsion transverse de l'un des gluons du canal t tends vers zéro. Les grandes valeurs de l_t, c'est-à-dire les petites distances, dominent donc.

On trouve pour les termes SCHC, que

$$\langle f\rangle \simeq r^2l_t^2/2 \tag{2.90}$$

et pour les termes avec simple changement d'hélicité, que

$$\langle\frac{\vec{r}}{r}f\rangle \simeq -i\vec{\Delta}r^3l_t^2(2z-1)/2^3. \tag{2.91}$$

En portant ces valeurs dans l'équation 2.77, ces amplitudes sont donc proportionnelles à la densité de gluons

$$xG(x,\tilde{Q}^2) = \frac{\sqrt{N_c^2-1}}{2\pi}\int^{\tilde{Q}^2} J_p\frac{dl_t^2}{l_t^2}. \tag{2.92}$$

[7] Rappelons que

$$\int\frac{d^2k}{2\pi}\delta(\vec{k}-\vec{l})e^{-i\vec{k}\vec{r}} = e^{-i\vec{l}\vec{r}} \tag{2.85}$$

et que la repésentation de la fonction de distribution δ s'écrit

$$\int\frac{d^2k}{2\pi}e^{i\vec{k}(\vec{r}-\vec{r}_1)} = \delta(\vec{r}-\vec{r}_1). \tag{2.86}$$

En utilisant les propriétés des intégrales sur r des fonctions K_0 ou K_1 pour les petites valeurs de r (voir annexe C), on trouve pour l'amplitude de production d'un méson longitudinal sans changement d'hélicité

$$T_{00} = is_{\gamma p}\int dz \frac{8\cdot 3\pi^2 e\alpha_S f_\rho}{\sqrt{2}N_c Q^3} xG(x, Q^2 z(1-z)), \tag{2.93}$$

où l'intégrale sur z est convergente.

Pour la production d'un méson transverse sans changement d'hélicité, la situation se complique :

$$T_{11} = is_{\gamma p}\int dz \frac{4\cdot 3\pi^2 e\alpha_S f_\rho \langle M\rangle}{\sqrt{2}N_c Q^4 z(1-z)}(z^2+(1-z)^2) xG(x, Q^2 z(1-z)), \tag{2.94}$$

où $\langle M\rangle$ est la masse invariante moyenne de la paire $q\bar{q}$

$$\langle M\rangle = \int \frac{d^2k}{16\pi^3 z(1-z)} \frac{k}{\sqrt{z(1-z)}}\Phi(\frac{k^2}{z(1-z)}). \tag{2.95}$$

Comme $G(x, Q^2z(1-z)) = G(x, {Q_0}^2)[(Q^2 z(1-z))/{Q_0}^2]^\gamma$, l'intégrale sur z converge, et on retrouve le résultat de Martin, Ryskin et Teubner (voir eq. 2.74).

Pour les amplitudes avec un changement d'hélicité, on obtient

$$T_{01} = is_{\gamma p}\int dz \frac{2\cdot 3\pi^2 e\alpha_S f_\rho \sqrt{|t|}}{N_c Q^4 z(1-z)}(2z-1)^2 xG(x, Q^2 z(1-z)), \tag{2.96}$$

$$T_{10} = -is_{\gamma p}\int dz \frac{4\cdot 3\pi^2 e\alpha_S f_\rho \sqrt{|t|}\langle M\rangle}{N_c Q^5 z(1-z)}(2z-1)^2 xG(x, Q^2 z(1-z)). \tag{2.97}$$

Le double changement d'hélicité s'écrit en deux parties :

$$T_{1-1} = T^0_{1-1} + T^1_{1-1}. \tag{2.98}$$

Les intégrales sur l_t et z sont différentes pour ces deux contributions. Bien que supprimée par un facteur M/Q^2 comparé à T^0_{1-1}, la partie perturbative T^1_{1-1} peut être dominante à haute énergie, en raison d'une plus forte dépendance en l'énergie de xG que pour la partie "soft" T^0_{1-1}.

Le modèle de Ivanov et Kirschner prédit les dépendances suivantes en Q^2 et t pour les rapports d'amplitudes de transition :

$$\begin{aligned}
\frac{T_{11}}{T_{00}} &= \frac{\langle M\rangle}{Q}\frac{1+\gamma}{\gamma} \\
\frac{T_{01}}{T_{00}} &= \frac{\sqrt{|t|}}{Q}\frac{1}{\sqrt{2}\gamma} \\
\frac{T_{10}}{T_{00}} &= -\frac{\langle M\rangle\sqrt{|t|}}{Q^2}\frac{\sqrt{2}}{\gamma} \\
\frac{T_{1-1}}{T_{00}} &= \frac{T^1_{1-1}}{T_{00}} + \frac{T^0_{1-1}}{T_{00}} \\
&= \frac{|t|\langle M\rangle}{Q^3}\frac{2(\gamma+2)}{\gamma} - \frac{\bar{\alpha}_S^2|t|\langle M\rangle}{\pi\alpha_S Q {M_\rho}^2}\frac{1}{[4^\gamma \frac{\Gamma^2(\gamma+1)}{\Gamma(2\gamma+2)} xG(x, Q^2/4)]}
\end{aligned} \tag{2.99}$$

où $\bar{\alpha}_S$ est la force du couplage non-perturbatif et Γ la fonction d'Euler.

Remarquons que les dépendances en $\sqrt{|t|}$ et $|t|$ proviennent du développement des paramètres d'impact de transition $\gamma \to \rho$ (voir eq. 2.90 et 2.91 [8]). Si on se place dans un cas non-relativiste, $\delta(z-1/2)$, on n'aboutit pas à un changement d'hélicité. Ivanov et Kirschner soulignent que c'est une conséquence de pQCD que la fluctuation des mésons vecteurs légers en une paire de quarks de courant soit décrite par une fonction d'onde étendue en z, alors que les modèles non-perturbatifs considèrent le méson comme un état lié où les deux quarks constituants ont une masse égale à la moitié de la masse du méson, entraînant une fonction d'onde en $\delta(z-1/2)$.

Il convient de noter que l'équation reliant le facteur d'impact du proton J_p avec la densité de gluons ainsi que les équations 2.93, 2.94, 2.96 et 2.97 sont seulement valables à très petit transfert d'impulsion t. Le modèle ne peut décrire l'évolution en t à partir de principes de base. Il semble toutefois naturel de supposer une dépendance universelle en t pour toutes les amplitudes de transition provenant du couplage des gluons du canal t avec le proton. Cette dépendance disparaît dans les rapports et les résultats sont valables jusqu'à $|t| < Q^2\gamma$. Cette hypothèse est basée sur l'observation que dans tous les cas, la taille transverse de la paire $q\bar{q}$ est plus petite que celle du proton.

2.3.2 Le modèle de Kuraev, Nikolaev et Zakharov

Nikolaev et divers collaborateurs [64] ont étudié la production de mésons vecteurs dans une approche basée sur les dipôles de couleur et l'échange de deux gluons, selon des lignes générales proches de celles étudiées à la section 2.2. Ils ont appliqué cette approche à l'étude de la structure en hélicité.

Travaillant à haute énergie, à l'approximation des logarithmes dominants en $1/x$ ($LL(1/x)$), Kuraev, Nikolaev et Zakharov ont calculé les parties imaginaires des amplitudes de transition T_{ij} pour la production de mésons vecteurs légers ou lourds [32]. La partie réelle, qui constitue une petite correction, peut être reconstruite par analyticité en utilisant les relations de dispersion. Les amplitudes de transition T_{ij} ont toutes été calculées dans le cadre de la QCD perturbative à l'exception de l'amplitude avec double changement d'hélicité T_{1-1} qui possède une contribution non-perturbative.

Les quatre diagrammes pQCD à l'ordre dominants en $\ln(1/x)$ sont similaires à ceux présentés précédemment (voir figures 2.5 et 2.6), les impulsions étant définies comme indiqué à la section 2.1.5. La boucle supérieure $g_\mu \gamma^*_\sigma \to q\bar{q} \to g'_\nu V_\rho$ est notée $I(\gamma^* \to VM)$. La fonction d'onde utilisée pour l'état de Fock $q\bar{q}$ dans le méson vecteur est [64]

$$\Psi_V(z, \vec{k}_t) = \frac{\Gamma_{VM}(z, \vec{k}_t)}{\vec{k}_t^{\,2} + m_q^2 - z(1-z)M_{VM}^2}, \tag{2.100}$$

[8] L'équation correspondant au développement pour le terme avec double changement d'hélicité n'est pas donnée dans cette thèse.

où m_q est la masse constituante des quarks. Pour le photon, il suffit de remplacer dans la formule 2.100 M_{VM}^2 par $-Q^2$ et de poser la fonction de vertex Γ_{VM} =1. La boucle inférieure est reliée à la densité de gluon non-intégrée $\mathcal{F}(x, \vec{l_t}, \vec{\Delta}_t)$

$$\mathcal{F}(x, \vec{l_t}, \vec{\Delta}_t) = \frac{\partial G(x, l_t^2)}{\partial \ln l_t^2} e^{\frac{-1}{2} B_{3I\!P} \vec{\Delta}^2} \tag{2.101}$$

où $B_{3I\!P} \sim 6$ GeV^{-2} [64] est la pente du cône diffractif et $\vec{\Delta}^2 = |t|$.

De manière similaire à l'équation 2.77 chez Ivanov et Kirschner, la partie imaginaire de l'amplitude est

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(x, Q^2, \vec{\Delta}_t) = iW^2 \frac{C_F N_c C_{VM} \sqrt{4\pi\alpha_{em}}}{2\pi^2} \int_0^1 dz \int d^2\vec{k}_t \int \frac{d^2\vec{l_t}}{l_t^4} \\ \alpha_S(\max\{l_t^2, \vec{k}_t^2 + M_{VM}^2\}) \, \mathcal{F}(x, \vec{l_t}, \vec{\Delta}_t) \, I(\gamma^* \to VM). \end{aligned} \tag{2.102}$$

Les facteurs de transition $I(\gamma^* \to VM)$ se résument à

$$\begin{aligned} I(\gamma_L^* \to VM_L) &= -\frac{Q}{M_{VM}} \cdot \frac{4z(1-z)[m_q^2 + \vec{k}_t^2 + z(1-z)M_{VM}^2]}{\bar{Q}^4} \\ &\quad \cdot \Psi_V(z, \vec{k}_t) \vec{l}_t^2, && (2.103) \\ I(\gamma_T^* \to VM_T, NF) &= 2(\vec{\epsilon}^V * \vec{\epsilon}^\gamma) \cdot \frac{m_q^2 + 2[z^2 + (1-z)^2]\vec{k}_t^2}{\bar{Q}^4} \cdot \Psi_V(z, \vec{k}_t) \vec{l}_t^2, && (2.104) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(\gamma_L^* \to VM_T) &= -8 \frac{(\vec{\epsilon}^V * \vec{\Delta}_t) Q}{\bar{Q}^2} \cdot \frac{z(1-z)(1-2z)^2}{\bar{Q}^4} \cdot \vec{k}_t^2 \Psi_V(z, \vec{k}_t) \vec{l}_t^2, && (2.105) \\ I(\gamma_T^* \to VM_L) &= -2 \frac{(\vec{\epsilon}^\gamma * \vec{\Delta}_t)}{M_{VM}} \cdot \frac{[m_q^2 + \vec{k}_t^2 + z(1-z)M_{VM}^2](1-2z)^2}{\bar{Q}^4} \\ &\quad \cdot \Psi_V(z, \vec{k}_t) \vec{l}_t^2, && (2.106) \\ I(\gamma_T^* \to VM_T, DF) &= 2(\vec{\epsilon}^V * \vec{\Delta}_t)(\vec{\epsilon}^\gamma * \vec{\Delta}_t) \frac{z(1-z)}{\bar{Q}^4} \cdot [6(1-2z)^2 \frac{\vec{l}_t^2}{\bar{Q}^2} + 1] \\ &\quad \cdot \vec{k}_t^2 \Psi_V(z, \vec{k}_t). && (2.107) \end{aligned}$$

NF indique qu'il n'y a pas de changement d'hélicité tandis que DF indique le double changement d'hélicité. $\vec{\epsilon}^\gamma$ et $\vec{\epsilon}^V$ sont respectivement les vecteurs de polarisation du photon virtuel et du méson vecteur et

$$\bar{Q}^2 = m_q^2 + z(1-z)Q^2. \tag{2.108}$$

En observant les équations décrivant l'intégrant $I(\gamma^* \to VM)$, il est évident que la présence de l'impulsion longitudinale de Fermi est nécessaire pour avoir une contribution avec un simple changement d'hélicité, car $z = 1/2$ annule les contributions $I(\gamma_L^* \to VM_T)$ et $I(\gamma_T^* \to VM_L)$. L'amplitude avec double changement d'hélicité requiert une impulsion de Fermi transverse ($\vec{k}_t$) des quarks.

On voit également apparaître immédiatement un terme proportionnel à Δ_t $(=\sqrt{|t|})$ pour le simple changement d'hélicité et un terme en Δ_t^2 $(=|t|)$ pour le double changement.

Dans tous les cas où $I(\gamma \to VM) \propto l_t^2$, l'intégrale sur l_t dans l'équation 2.102 fait apparaître la densité de gluons $G(x,\bar{Q}^2)$ à l'approximation du logarithme dominant en Q^2 :

$$\int^{\bar{Q}^2} \frac{dl_t^2}{l_t^2}\frac{\partial G(x,l^2)}{\partial \ln(l^2)} = G(x,\bar{Q}^2) \tag{2.109}$$

avec $\bar{Q}^2$ donné par l'équation 2.108. Après intégration sur la fraction d'impulsion z du photon portée par un quark, on trouve que toutes les amplitudes T_{ij} sont directement proportionnelles à la densité de gluons dans le proton $xG(x,Q_V^2)$, excepté T_{1-1}. L'échelle dure typique du processus est $Q_V^2 \simeq (0.10-0.25)(Q^2+M_{VM}^2)$; cette forme peut se comprendre si on suppose $M_{VM}^2 \gg k_t^2$ et Δ^2 : alors la masse constituante m_q est décrite par

$$m_q^2 \simeq z(1-z)M_{VM}^2, \tag{2.110}$$

et $\bar{Q}^2 \simeq z(1-z)(Q^2+M_{VM}^2)$. Le facteur numérique dans Q_V^2 dépend de l'hélicité considérée, car différentes hélicités ont des contributions différentes pour les limites $(z \to 0,1)$ lors de l'intégration en z.

De façon plus détaillée, les dépendances en Q^2 et t sont données par les relations [9] :

$$\begin{aligned}
T_{00} &\propto \frac{Q}{M_{VM}}.\frac{\alpha_S(Q_V^2)}{(Q^2+M_{VM}^2)^2}.G(x,Q_V^2),\\
T_{11} &\propto \frac{\alpha_S(Q_V^2)}{(Q^2+M_{VM}^2)^2}.G(x,Q_V^2),\\
T_{01} &\propto \frac{\sqrt{|t|}}{M_{VM}}.\frac{\alpha_S(Q_V^2)}{(Q^2+M_{VM}^2)^2}.G(x,Q_V^2),\\
T_{10} &\propto \frac{Q}{M_{VM}}.\frac{M_{VM}\sqrt{|t|}}{Q^2+M_{VM}^2}.\frac{\alpha_S(Q_V^2)}{(Q^2+M_{VM}^2)^2}.G(x,Q_V^2),\\
T_{1-1} &\propto |t|\frac{\alpha_S(Q_V^2)}{(Q^2+M_{VM}^2)^2}.[\frac{6G(x,Q_V^2)}{Q^2+M_{VM}^2}.\frac{\langle {k_z}^2\rangle}{4M_{VM}^2}+\frac{G(x,{\mu_G}^2)}{{\mu_G}^2}]
\end{aligned} \tag{2.111}$$

où μ_G est l'échelle "soft" $\sim$ 0.7-1 GeV et k_z est l'impulsion longitudinale de Fermi du quark ($k_z \propto 1/2\ M_{VM}\ (2z-1)$).

Le modèle présenté ici prédit la violation de SCHC mais selon les auteurs [32], la non-nullité des amplitudes avec simple et double changement d'hélicité ne résulte pas explicitement de l'applicabilité de la QCD perturbative et peut très bien être étudiée en photoproduction pour les mésons vecteurs légers ou à très petites valeurs de $Q^2 < M_{VM}^2$.

Cette approche implique en principe que $R = \sigma_L/\sigma_T \propto Q^2/M_{VM}^2$. En accord avec les travaux de Brodsky et al [29], Kuraev, Nikolaev et Zakharov [32] pensent que l'évolution de R avec Q^2 est tempérée en raison de contributions non perturbatives de σ_T.

[9]Une inversion entre T_{01} et T_{10} est faite dans la publication [32]. L'erreur est corrigée ici.

D'autres travaux de Nikolaev *et al.* [77] proposent que la dépendance linéaire en Q^2 de R soit en fait modifiée par le mélange d'ondes S et D pour le méson vecteur, permettant ainsi un meilleur accord entre la mesure et la théorie. Auparavant, les modèles théoriques utilisaient le facteur $\Gamma_\mu = \gamma_\mu$ dans la fonction de vertex $VM - q\bar{q}$. Ce choix correspond à un certain mélange d'états d'onde S et D. Nikolaev et collaborateurs ont refait les calculs en séparant les états S et D, la différence portant uniquement sur les termes $\Psi_{S,D}(z,k)$ et $I^{S,D}_{\lambda_V \lambda_\gamma}(\gamma^* \to VM)$. Les résultats obtenus pour l'onde S ne diffèrent pas beaucoup des résultats précédemment obtenus. Par contre, on observe une très importante brisure de $SCHC$ pour la production d'onde D. Le rapport R_D est également trouvé $\ll R_S$. La différence de dépendance en Q^2 de $R_{S,D}$ pour des ondes S et D affecte donc les prédictions sur le rapport R résultant d'un mélange des deux types d'ondes.

2.3.3 Le modèle de Royen et Cudell

Le modèle de Royen et Cudell [33] tente de décrire toutes les caractéristiques de la production diffractive de mésons ρ (dépendances des sections efficaces en Q^2, en t, ...) à haute énergie et pour Q^2 supérieur à quelques GeV^2 pour l'échange de deux gluons. Les sections efficaces sont calculées à un facteur de normalisation près, supposé ne dépendre que de W et t. Afin de prédire la violation de SCHC et le comportement en $R = \sigma_L/\sigma_T$ observé dans les données, Royen et Cudell ont introduit dans leur modèle le mouvement de Fermi des quarks ainsi que la possibilité pour le quark d'être hors de sa couche de masse.

La figure 2.9 présente deux des 4 diagrammes intervenant dans leur calcul. Le photon fluctue en une paire de quarks qui portent une impulsion interne (ou impulsion de Fermi) notée f en plus de la moitié de l'impulsion du méson vecteur : $f = \frac{\alpha}{2W}p + \frac{\beta}{2}q + \frac{f_t}{2}$, où f_t est la partie transverse, et α et β sont les coefficients de Sudakov. La transition $q\bar{q} \to VM$ est décrite par une fonction de vertex du méson vecteur Φ_V :

$$\Phi_V(k) = N e^{\frac{-K^2}{2p_F^2}} \tag{2.112}$$

où N est un facteur de normalisation fixé en imposant le taux de désintégration $VM \to e^+e^-$, K est la tri-impulsion portée par le quark dans le référentiel du méson vecteur au repos et p_F est l'échelle d'impulsion de Fermi des quarks constituant le méson vecteur. Cette échelle dépend de la masse du méson vecteur choisi : $p_F = 0.3$ GeV pour les mésons ρ et ϕ, et $p_F = 0.6$ GeV pour le méson J/ψ, avec $m_{u,d} = 0.3$ GeV, $m_s = 0.45$ GeV et $m_c = 1.5$ GeV. Cette liberté de choix engendre une incertitude sur les résultats du modèle.

L'amplitude associée à la production de mésons vecteurs est calculée en utilisant les règles de Cutkovsky [71] : les quarks coupés par la ligne en pointillés de la figure 2.9 sont placés sur leur couche de masse. L'un des quarks connectés au photon est hors de sa couche, il est noté par l'impulsion r sur la figure 2.9a et par l'impulsion r' sur la figure 2.9b. En général, pour avoir conservation du courant, on place également le second quark connecté au méson vecteur (celui portant l'impulsion $f + q^V/2$) sur sa couche de masse. Dans le modèle de Royen et Cudell, ce quark (d'impulsion $f + q^V/2$) peut être hors de sa couche de masse. Il reste ainsi une dépendance de jauge des propagateurs, mais celle-ci s'annule à la limite des hautes énergies.



Figure 2.9: Diagrammes intervenant dans le calcul de Royen et Cudell.

Comme dans les autres calculs, des intégrations sur deux boucles (voir figure 2.9) sont effectuées : la première est une intégration sur l'impulsion d'un des gluons (l_t) ; la seconde intégration porte sur l'impulsion de Fermi des quarks f. Cette dernière se réduit à une intégration sur f_t et β lorsqu'on tient compte des conditions de couche de masse. Le fait que f_t^2 soit positif contraint les valeurs possibles de β entre les bornes :

$$\beta_{\pm} = \frac{\pm 2\sqrt{\lambda^2 + \mu_q M_{VM}}\lambda - 2\lambda^2 - \mu_q M_{VM} + M_{VM}^2}{M_{VM}^2} \tag{2.113}$$

où $\mu_q = 2m_q$ et λ provient de l'égalité $f^2 = (M_{VM} - \mu_q)^2/4 - \lambda$. La borne inférieure est toujours plus petite de 1 pour des valeurs non nulles de μ_q et pour des valeurs finies de λ.

A la limite des hautes énergies, ce modèle décrit différentes propriétés des amplitudes T_{ij} [10] :

1. Les amplitudes T_{00} et T_{10} décroissent jusqu'à zéro pour Q^2 tendant vers zéro car elles sont proportionnelles à Q.

2. A grand Q^2, l'intégration sur f^2 et β introduit des termes supplémentaires en Q^2 pour T_{11}, T_{01} et T_{10} dus aux quarks hors de leur couche de masse (ceux d'impulsion $f + q^V/2$). Un comportement en plateau est prédit pour σ_L/σ_T à grand Q^2, dû au mélange de contributions avec quarks sur et hors de leur couche de masse, qui ont des comportements asymptotiques différents.

3. A la limite où l'impulsion de Fermi f tend vers zéro, c'est-à-dire où $\beta \to 0$ [11], les amplitudes avec changement d'hélicité T_{01} et T_{10} deviennent nulles car elles sont proportionnelles à β. La condition $\beta = 0$ ou celle demandant un mouvement de Fermi f nul implique donc la conservation SCHC.

4. A $|t| = |t|_{min} = 0$, les amplitudes avec changement d'hélicité T_{01} et T_{10} s'annulent, elles présentent un maximum à $|t| < 0.1$ GeV^2 avant de décroître à plus grandes valeurs de $|t|$.

[10] L'amplitude T_{1-1} a été négligée dans ce travail car elle est considérée comme très petite.

[11] La limite où l'impulsion de Fermi f tend vers zéro est associée à $z \to 1/2$, où z est la fraction d'impulsion longitudinale du photon portée par un des quarks.

A la limite des grands Q^2 et pour $|t|$ proche de 0, on a

$$T_{01}/T_{00} = \frac{\beta\,\sqrt{|t|}}{\sqrt{2}\,(1+\beta)\,Q}. \tag{2.114}$$

2.4 En résumé

Différents modèles ont été présentés dans ce chapitre.

La première chose à remarquer, c'est que les modèles développés à la section 2.2 prédisent la section efficace de production de mésons vecteurs en $|t| = 0$. Pour avoir changement d'hélicité, il est nécessaire d'avoir un transfert de moment angulaire ($\propto \sqrt{|t|}$). Les modèles présentés à la section 2.2 ne sont donc pas en contradiction avec ceux étudiant $NSCHC$ (section 2.3).

Deuxièmement, les modèles prédisant $NSCHC$ ont des conclusions fort semblables que nous résumons rapidement. Les prédictions d'une approche perturbative QCD basée sur un échange de deux gluons et concernant la violation de l'hélicité sont (voir eq. 2.99, 2.111 et 2.114) :

- une absence de dépendance en $|t|$ pour le rapport des amplitudes sans changement d'hélicité T_{11}/T_{00} ;
- une dépendance proportionnelle à $\sqrt{|t|}$ à pour le rapport des amplitudes avec changement d'hélicité à celles sans changement T_{01}/T_{00} et T_{10}/T_{00} ;
- une dépendance linéaire en $|t|$ pour le rapport de l'amplitude avec double changement d'hélicité à celles sans changement T_{1-1}/T_{00} ;
- la hiérarchie des amplitudes présentée à l'équation 2.75 pour des valeurs de Q^2, W et $|t|$ typiques de HERA.

Toutefois, certaines questions restent posées :

1. Quelle est la véritable échelle du processus, à laquelle il faut considérer la densité de gluons et la constante de couplage α_S? Cette question n'a pas de réponse "exacte", mais dépend de l'ordre auquel sont faits les calculs. Le choix de l'échelle détermine l'importance des termes non calculés que l'on néglige. Levin *et al.* [61] ont choisi comme échelle $Q^2 z(1-z) + m_q^2 + k_t^2$. Les autres modèles réduisent cette forme générale en fonction des approximations utilisées. Ainsi, Ryskin [28] utilise l'échelle $(Q^2 + M_{VM}^2)/4$ où $z = 1/2$, $m_q = M_{VM}/4$. Brodsky *et al.* [29] utilisent Q^2 ; ce choix est modifié dans le modèle de Frankfurt *et al.* [30] tenant compte du rescaling du processus dur. Pour des mésons vecteurs légers, Martin, Ryskin et Teubner [48] posent $m_q = 0$ et obtiennent $Q^2 z(1-z) + k_t^2$, de même que Ivanov et Kirschner [31] qui négligent en plus k_t. Kuraev, Nikolaev et Zakharov [32] proposent de prendre l'échelle $(0.1 - 0.25)(Q^2 + M_{VM}^2)$.

2. Du point de vue expérimental, le régime perturbatif a-t-il réellement été atteint dans les analyses publiées, ou y a-t-il encore des contributions non-perturbatives à prendre en compte ? Quel est le rôle réel des contributions aux limites (end-points) ?
3. Quelle est l'évolution du rapport R en fonction de Q^2 ? Est-elle linéaire en Q^2/M_{VM}^2? Faut-il inclure des effets perturbatifs pour tempérer cette évolution ? Faut-il introduire le paramètre γ ?
4. Quelle fonction d'onde faut-il choisir pour le méson vecteur ? En particulier, faut-il faire la distinction pour les mésons vecteurs entre ondes de type S et de type D comme cela a été proposé par Nikolaev *et al.* [77] ? Le choix de la fonction d'onde constitue en pratique une différence importante entre les modèles.
5. Pour les mésons vecteurs lourds et à grand Q^2, il convient d'utiliser les fonctions de distributions de gluons non-diagonales.
6. Des calculs incluant les ordres supérieurs devraient permettre de résoudre nombres de ces incertitudes.

Chapitre 3

Dispositif expérimental

Dans ce chapitre, nous introduisons le collisionneur de particules HERA ainsi que le détecteur H1. En ce qui concerne ce dernier, nous nous concentrons uniquement sur les différentes parties utiles pour notre analyse. Pour des renseignements supplémentaires, nous renvoyons le lecteur à la page web de l'expérience H1 [78] ainsi qu'à la description [79].

3.1 Le collisionneur HERA

HERA ("Hadron Elektron Ring Anlage") est un collisionneur de protons et d'électrons [1], situé au laboratoire DESY ("Deutsches Elektronen SYnchrotron") à Hambourg en Allemagne. L'énergie des faisceaux était en 1997 de 27.5 GeV pour les électrons et de 820 GeV pour les protons [2], correspondant à une énergie dans le centre de masse de 300.3 GeV.

Afin d'obtenir ces énergies, les faisceaux de particules passent par une série de pré-accélérateurs (voir figure 3.1). Le premier est un pré-accélérateur linéaire LINAC. Ensuite, les faisceaux passent dans la chaîne de pré-accélérateurs circulaires DESY II (pour les électrons) ou DESY III (pour les protons) et PETRA. A la sortie de PETRA, les électrons ont une énergie de 12 GeV et les protons de 40 GeV. Ils sont alors injectés dans HERA où ils sont accélérés jusqu'à leur énergie finale.

L'énergie des électrons est limitée par la puissance des cavités accélératrices qui compensent la perte d'énergie qu'ils subissent par rayonnement synchrotron. Dans le cas des protons, le rayonnement synchrotron est négligeable, et leur énergie est limitée par le champ magnétique des aimants de guidage.

Les deux faisceaux de particules circulent en sens inverses dans un tunnel de 6.3 km de circonférence et les paquets se croisent toutes les 96 ns en deux points d'interaction qui sont

[1]Entre 1994 et 1997, HERA a accéléré des positrons. En 1998 et pendant une brève partie de 1999, le faisceau utilisé était un faisceau d'électrons. Ensuite, des positrons ont à nouveau été produits. Par la suite, nous utiliserons le terme d'électron pour caractériser indifféremment électrons ou positrons.

[2]Les données analysées dans cette thèse ont été prises pendant l'année 1997. A partir de 1999, l'énergie des protons a été augmentée à 920 GeV.



Figure 3.1: A gauche : le complexe d'accélération à DESY, à droite : un agrandissement de la zone encadrée.

occupés par les expériences H1 et ZEUS. Deux autres expériences sont installées autour de ce collisionneur : HERMES et HERA-b. L'expérience HERMES étudie la distribution des spins des partons dans le nucléon, à l'aide du faisceau d'électrons polarisés grâce à des rotateurs de spins situés de chaque côté du détecteur, et d'une cible fixe éventuellement polarisée. L'expérience HERA-b utilise le faisceau de protons pour créer des mésons B à la suite d'une interaction avec des fils tendus dans le tube à vide et étudie la violation CP dans la désintégration de ces mésons.

Notons que les faisceaux sont structurés en paquets de $10^{10} - 10^{11}$ particules. Sur les 220 paquets de chaque faisceau, seuls 175 sont appariés tandis que les autres sont constitués uniquement soit d'électrons soit de protons (paquets "pilotes" permettant d'étudier l'interaction d'un des faisceaux avec le gaz résiduel du tube à vide) et on parlera de paquets "vides" quand les deux paquets sont vides de particules.

3.2 Le détecteur H1

Le détecteur H1 est un détecteur multifonction typique de la physique des hautes énergies [78, 79]. Il est composé de plusieurs sous-détecteurs permettant de reconstruire en détail tous les paramètres des interactions.

Afin de préciser le système de coordonnées utilisées, l'axe z est choisi comme l'axe des faisceaux, la direction du faisceau de protons correspondant aux z positifs et caractérisant la région dite "avant". Par opposition, la zone "arrière" qualifie la région des z négatifs. L'axe x est horizontal et dirigé vers le centre de l'accélérateur et l'axe y est vertical et dirigé vers le haut. Deux angles sont également définis : l'angle polaire θ par rapport à l'axe z et l'angle azimutal ϕ mesuré par rapport à l'axe x dans le plan dit "transverse" (plan x, y).

Le détecteur H1 est présenté à la figure 3.2. Les électrons arrivent par la droite dans le tube à vide (indiqué par le numéro $\boxed{1}$) et les protons par la gauche. Autour du point d'interaction