Elektroproduktion von Myon-Paaren im Massenbereich der Υ-Resonanz

von

Carsten Schmitz

Diplomarbeit in Physik

vorgelegt der

Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen

im Juli 2002

angefertigt im
I. Physikalischen Institut
Prof. Dr. Ch. Berger

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Das heutige Bild des Mikrokosmos zeigt die Konstituenten der Materie als zwei Sorten punktförmiger Teilchen: Quarks und Leptonen.

$$\text{Quarks}\left\{\begin{pmatrix}u\\d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c\\s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}t\\b\end{pmatrix}\right. \qquad \text{Leptonen}\left\{\begin{pmatrix}\nu_e\\e\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\nu_\mu\\\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\nu_\tau\\\tau\end{pmatrix}\right.$$

Die Wechselwirkungen dieser elementaren Bestandteile werden im Standardmodell der Elementarteilchenphysik auf den Austausch von Bosonen zurückgeführt. Zum einen sind es das masselose Photon (γ) sowie drei weitere Eichbosonen (Z^0, $W^\pm$), welche die elektroschwache Wechselwirkung vermitteln, zum anderen acht Gluonen, durch deren Austausch die starke Wechselwirkung beschrieben wird.
An der starken Wechselwirkung nehmen ausschließlich Quarks teil, wodurch Quarks und Leptonen objektiv zu unterscheiden sind.
Wenn ein Quark und ein Antiquark über die starke Wechselwirkung einen gebundenen Zustand mit den Quantenzahlen des Photons bilden, wird dieser Zustand ein Vektormeson genannt. Das Υ-Meson ist ein solches Vektormeson und wird als gebundener Zustand eines $b\bar{b}$-Paares interpretiert. Da die kurze Lebensdauer des Topquarks einen gebundenen Zustand aus Top- und Antitopquark verbietet, ist das Υ-Meson, abgesehen von angeregten Zuständen, das schwerste experimentell zugängliche Vektormeson.
Vektormesonen werden in der ep-Streuung vornehmlich in sogenannten diffraktiven Prozessen erzeugt, die nicht durch Störungsrechnung im Rahmen der Quantenchromodynamik beschrieben werden können. Zur Beschreibung bedient man sich der Regge-Theorie, deren Wurzeln in der nichtrelativistischen Potentialstreuung liegen.
Wegen des phänomenologischen Charakters dieser Beschreibung ist es von besonderem Interesse, ein tieferes physikalisches Verständnis der diffraktiven Streuprozesse zu gewinnen. Hierzu liefert das Υ-Meson durch die hohe Masse eine vergleichsweise *harte Skala*, die bessere Vorhersagen störungstheoretischer Näherungen erlaubt.
Abbildung 1 zeigt elastische Photoproduktionswirkungsquerschnitte in Abhängigkeit der Photon-Proton-Schwerpunktsenergie für verschiedene Vektormesonen. Im Falle des bereits vergleichsweise schweren J/ψ-Mesons lässt sich ein schon steilerer Anstieg des Wirkungsquerschnitts beobachten und theoretische Modelle sagen für das Υ-Meson einen noch stärkeren Anstieg voraus, wie diese Abbildung zeigt.

Wegen der statistischen Unsicherheit bisheriger Messungen zum Υ-Meson konnte dies bislang nicht experimentell bestätigt werden.
Neben der diffraktiven Produktion können Vektormesonen in der ep-Streuung auch nicht-diffraktiv, vornehmlich durch Photon-Gluon-Fusion, erzeugt werden. Bisweilen wurden in der ep-Streuung jedoch keine derartigen durch Photon-Gluon-Fusion erzeugten Υ-Mesonen nachgewiesen. Das bietet weiteren Anlass zur intensiven Studie der Υ-Produktion in der ep-Streuung.
Diese Arbeit umfasst die inklusive, nicht-prozessspezifische, Υ-Produktion am H1-Experiment. Darüber hinaus werden Ergebnisse für separierte Produktionsprozesse vorgestellt, unter anderem eine Abschätzung des elastischen Photoproduktionswirkungsquerschnitts sowie erste Kandidaten für Υ-Ereignisse der Photon-Gluon-Fusion. Zu diesem Zweck werden reprozessierte Daten des H1-Experimentes der Jahre 1998, 1999 und 2000 kombiniert, wodurch im Vergleich zur vorhergehenden Analyse von Υ-Mesonen etwa die doppelte Datenmenge zur Verfügung steht. Die Verwendung reprozessierter Daten ermöglicht eine deutlich verbesserte Rekonstruktion der Kinematik.
Nachgewiesen werden die Υ-Mesonen in dieser Arbeit über ihren Zerfall in zwei Myonen, da diese eine eindeutige Signatur im Detektor erzeugen.



Abb. 1: Zusammenstellung verschiedener Messungen von $\sigma_{\gamma p}^{\mathrm{tot}}$ und $\sigma_{\gamma p}$ für verschiedene Vektormesonen. Durchgezogene Linien kennzeichnen Anpassungen der Daten. Gestrichelte Linie zeigen Vorhersagen der Form $\sigma \sim W_{\gamma p}^{\delta}$. Die Vorhersage lässt für das Υ-Meson einen steilen Anstieg der Energieabhängigkeit erwarten. Eine experimentelle Verifikation ist wegen der großen Fehler der Messungen aber bislang nicht gegeben.

1
HERA und das H1-Experiment

Dieses Kapitel liefert einen Überblick über den Speicherring HERA[1] und das H1-Experiment, mit dem die in dieser Arbeit verwendeten Daten der Jahre 1998-2000 gewonnen wurden. Ausführliche Beschreibungen finden sich in [1] und [2].

1.1 HERA

Der Speicherring HERA (Abbildung 1.1) des DESY[2] in Hamburg bietet weltweit die einzige Möglichkeit zur Untersuchung hochenergetischer Kollisionen zwischen Elektronen und Protonen. Es handelt sich um einen Doppel-Speicherring mit einem Umfang von 6,3 km, in dem Elektronen bei einer Energie von $E_e = 27{,}6$ GeV und Protonen bei einer Energie von $E_p = 920$ GeV gespeichert und zur Kollision gebracht werden. Daraus ergibt sich eine Schwerpunktsenergie von $\sqrt{s} \approx 318$ GeV. Neben Elektronen können auch Positronen als Strahlteilchen verwendet und am Protonenstrahl gestreut werden. Ein Vorteil bei der Verwendung von Positronen liegt in einer längeren Lebensdauer des Leptonenstrahls.
In dem in dieser Arbeit betrachteten Datennahmezeitraum wurden in der ersten Hälfte des Jahres 1999 Elektronen, danach bis Ende des Jahres 2000 Positronen verwendet. Für die betrachtete Υ-Erzeugung ist es aber im untersuchten kinematischen Bereich nicht von Bedeutung, ob es sich bei den Streupartnern um Elektronen oder Positronen handelt[3].

1.2 Der H1-Detektor

Der H1-Detektor (Abbildung 1.2) umschließt nahezu den gesamten Raumwinkelbereich, um eine möglichst vollständige Rekonstruktion der Ereignistopologie zu ermögli-

[1] **H**adron-**E**lektron-**R**ing-**A**nlage
[2] **D**eutsches-**E**lektronen-**Sy**nchrotron
[3] Der Begriff „Elektronen“ wird deshalb im Folgenden als Sammelbegriff für Elektronen und Positronen verwendet.



Abb. 1.1: Der Elektron-Proton-Speicherring HERA mit Vorbeschleunigern.

chen. Aufgrund der Schwerpunktsbewegung des Elektron-Proton-Systems in Protonrichtung, ist der H1-Detektor asymmetrisch aufgebaut.
Das rechtshändige Koordinatensystem ist so gewählt, dass die z-Achse mit der Strahlachse zusammenfällt und die Protonen sich in positive z-Richtung bewegen. Die x-Achse zeigt zum Speicherringmittelpunkt und die y-Achse nach oben. Der Polarwinkel θ wird relativ zur Protonenstrahlrichtung gemessen und der Azimuthalwinkel ϕ liegt in der (x, y)-Ebene. Der Nullpunkt des Koordinatensystems befindet sich im nominellen Wechselwirkungspunkt (Vertex).
Im Folgenden werden die für diese Arbeit wichtigen Detektorkomponenten kurz beschrieben:

Das Flüssig-Argon Kalorimeter

Das Flüssig-Argon Kalorimeter (LAr[4]) deckt einen Polarwinkelbereich von $\theta = 4°$ bis $\theta = 153°$ ab (Abbildung 1.3). Es gliedert sich in einen inneren elektromagnetischen und einen darum gelegenen hadronischen Teil. Beide Teile setzen sich aus einer wechselnden Anordnung von Absorberplatten und Schichten flüssigen Argons zusammen. Die Absorberplatten bestehen im elektromagnetischen Kalorimeter aus Blei, im hadronischen Kalorimeter aus Stahl. Das flüssige Argon in den Zwischenräumen dient als Nachweismaterial. Die Energieauflösung σ_E/E im elektromagnetischen Teil ist um einen Faktor vier besser als im hadronischen Teil.
Das LAr-Kalorimeter wird in dieser Arbeit neben dem Myonsystem dazu genutzt, Myonen nachzuweisen. Man identifiziert sie im Kalorimeter über ihre Signatur als

[4]engl.: liquid Argon Calorimeter