Raport Nr 1943/PH

Poszukiwanie instantonów QCD w oddziaływaniach głęboko nieelastycznych na akceleratorze HERA

Stanisław Mikocki

rozprawa habilitacyjna

Spis treści

Wstęp

Model Standardowy fizyki cząstek elementarnych zawiera pewne procesy, które łamią zachowanie liczby barionowej i leptonowej $(B + L)$ w oddziaływaniach elektrosłabych i chiralności w oddziaływaniach silnych [1]. Tych anomalnych procesów nie można opisać standardową teorią perturbacyjną. Są one związane z instantonami, topologicznie nietrywialnymi fluktuacjami pól cechowania odkrytymi ponad 25 lat temu w teoriach Yanga-Millsa [2], [1]. Z technicznego punktu widzenia instantony są rozwiązaniami klasycznych równań ruchu w czterowymiarowej przestrzeni euklidesowej, odpowiadającymi specyficznym konfiguracjom pól cechowania spełniających odpowiednie warunki brzegowe. Są one zlokalizowane zarówno w przestrzeni jak i w czasie (stąd ich nazwa). Działanie dla instantonowej konfiguracji pól jest skończone. Wkład instantonów do procesów fizycznych jest proporcjonalny do czynnika eksponencjalnego $exp(-C/g^2)$, gdzie C jest dodatnią liczbą, a g jest stałą sprzężenia w danej teorii. Wkłady od instantonów są nieperturbacyjne i nie napotyka się ich w żadnym rzędzie rachunku zaburzeń. Rozwiązania instantonowe interpretuje się jako trajektorie opisujące tunelowe przejście między stanami próżni o różnej, nietrywialnej topologii.

Zainteresowanie instantonami elekrosłabymi jest oczywiście związane z ich własnością łamania zachowania liczby barionowej i leptonowej w oddziaływaniach elekrosłabych. Przekrój czynny na takie procesy jest zbyt mały przy energiach obecnie dostępnych na akceleratorach, aby je zaobserwować [3, 4]. Natomiast rozważa się możliwość, że we wczesnym, gorącym Wszechświecie procesy z udziałem instantonów odgrywały znaczącą rolę i eventualnie mogą być jednym z czynników pozwalających wyjaśnić obserwowaną asymetrię między materią i antymaterią [5] .

W oddziaływaniach silnych opisywanych przez chromodynamikę kwantową (QCD), teoria i fenomenologia instantonów obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień jak: modelowanie próżni QCD, łamanie symetrii chiralnej, asymptotyka szeregu perturbacyjnego, spekroskopia hadronów, nieperturbacyjna produkcja cząstek [6–8]. Już wkrótce po znalezieniu rozwiązań instantonowych 't Hooft pokazał, że instantony mogą być odpowiedzialne za łamanie aksjalnej symetrii U(1) i dają możliwość wyjaśnienia problemu masy mezonów η (tzw. problem U(1)) [9]. Inny przykład to odkryte w 2003 roku wąskie stany mezonów powabnych [10], które można interpretować jako przejaw nowego zjawiska tzw. ,,podwojenia chiralnego''(*chiral doubling*) [11]. U podstaw efektywnego modelu teoretycznego tłumaczącego to zjawisko jest instantonowa próżnia QCD.

Chociaż z punktu widzenia teorii istnienie instantonów i ich znaczenie jest ugruntowane to ciągle brakuje bezpośredniej, eksperymentalnej ich ewidencji. A. Ringwald i F.Schrempp w serii swoich prac zaproponowali możliwość bezpośredniej obserwacji efektów pochodzących od instantonów QCD w rozpraszaniu głęboko nieelastycznym elektron-proton na akceleratorze HERA w Hamburgu. Można tu się odwołać do analogii związanej z historią kwarków. W latach 60 ubiegłego wieku zaproponowano model kwarkowy. Pomimo jego sukcesów, w zasadzie traktowano kwarki jako obiekty czysto matematyczne. Dopiero od eksperymentów w Stanford rozpoczęła się burzliwa droga prowadząca do uznania kwarków za rzeczywiste składniki materii. Ta analogia ma nawet głębszy sens fizyczny. W rozpraszaniu głęboko nieelastycznym np. w zderzeniu elektron-proton, padający elektron sonduje strukturę protonu rozpraszając się na jego składnikach. Podobnie jest w przypadku procesów z udziałem instantonów. Instantony nierozerwalnie są związane z kwarkami, które pojawiają się jako zewnętrzne źródła (technicznie są to mody zerowe operatora Diraca). Padający elektron rozprasza się na instantonie wybijając kwarki z ich modów zerowych [12]. Tak więc, w pewnym sensie eksperymentalne potwierdzenie przewidywań Ringwalda-Schremppa byłoby tym dla instantonów co pionierskie eksperymenty w Stanford dla kwarków.

Doświadczalna obserwacja procesów z udziałem instantonów będzie odkryciem fundamentalnego i nowego nieperturbacyjnego efektu QCD przy wysokich energiach. Rozpraszanie głęboko nieelastyczne (DIS) daje wyjątkową możliwość [13, 14] odkrycia pewnej klasy twardych procesów związanych z instantonami QCD. Teoria i fenomenologia procesów instantonowych w zderzeniach pozyton(elektron)-proton została opracowana przez Ringwalda i Schremppa w ramach ich *instantonowej teorii perturbacyjnej* [13,15–19]. Teoria jest *perturbacyjna* w sensie obliczeń QCD tj. dla małej wartości stałej sprzężenia $\alpha_S \ll 1$. Pojawienie się instantonów jako fluktuacji pola gluonowego jest nieperturbacyjne i dlatego pojawia się czynnik eksponencjanlny. Jednakże kwarki i gluony w polu instantonowym są potraktowane perturbacyjnie. Wielkość przewidywanego przekroju czynnego jest stosunkowo duża z punktu widzenia poszukiwań eksperymentalnych [15–17], jednakże spodziewany sygnał jest mały w porównaniu do standardowych procesów DIS i zasadniczym problemem doświadczalnym jest stłumienie tła. Stan końcowy przypadków instantonowych ma charakterystyczne cechy [13, 18–21] odróżniające je od standardowych procesów DIS [22, 23]. W układzie spoczynkowym instantonu, hadronowy stan końcowy ma cechy topologii “fire-ball'a”: izotropowa emisja znacznej liczby hadronów z dużą energią poprzeczną [13, 18, 19]. W wyniku długotrwałych studiów na poziomie symulacji Monte Carlo znaleziono charakterystyczne obserwable pozwalające zidentyfikować obszar przestrzenii fazowej, gdzie różnica między danymi doświadczalnymi a symulacjami standardowych przypadków DIS wskazywałaby na wkład od procesów instantonowych.

Już wcześniej, zostały otrzymane górne ograniczenia przekroju czynnego na procesy instantonowe [24–26] w oparciu o standardowe obserwable hadronowego stanu końcowego zmierzone w eksperymencie H1 . W tej rozprawie przedstawione są otrzymane po raz pierwszy przez współpracę H1 wyniki pionierskich poszukiwań, które były ukierunkowane wyłącznie na procesy instantonowe w zderzeniach wysoko energetycznych cząstek.

Pod koniec lat 90-tych (ubiegłego stulecia) w ramach eksperymentu H1 połączono dotychczasowe indywidualne wysiłki poszukiwań instantonów tworząc trzyosobową grupę (Tancredi Carli[1], Birger Koblitz[2] oraz autor niniejszej rozprawy) w celu przyśpie-

[1]obecnie w Genewie, CERN

[2]doktorant z Instytutu Maxa Plancka w Monachium, obecnie w Ecole Polytechnique,LLR,IN2P3-CNRS,Palaiseau

szenia skomplikowanej analizy.

W zasadzie już w pierwszej publikacji Ringwalda-Schremppa [13] zostały zarysowane główne kierunki poszukiwań przypadków instantonowych i wydawało się, że analiza będzie prosta i szybka. Jednakże długotrwałe badania pokazały, że problem jest bardziej skomplikowany. Korzystając z symulacji Monte Carlo na poziomie detektora testowałem różne obserwable oraz metody poszukiwań, które pozwalałyby znacznie zredukować tło od zwykłych procesów DIS oraz dawały potencjalną możliwość odkrycia procesów instantonowych. W zasadzie jest bardzo łatwo znaleźć obserwable, które pokazują różnice między przypadkami instantonowymi i standardowymi DIS. Jednakże wiele z nich jest ze sobą skorelowanych i cięcie na jednej takiej obserwabli powoduje, że druga traci moc dyskryminacyjną. Następna trudność to wybór takich obserwabli dla których eksperymentalne rozkłady są względnie dobrze opisywane przez modele Monte Carlo. Wyniki tych prac były referowane na zebraniach grupy roboczej *Hadronic Final States and QCD* współpracy H1.

Wstępne wyniki analizy przedstawiłem na konferencji DIS2000 w Liverpoolu [27] oraz na konferencji w Krakowie [28]. Ostateczne, końcowe wyniki zostały opublikowane w 2002 roku [29]. Niniejsza rozprawa jest rozszerzoną wersją tej publikacji, której byłem jednym z głównych autorów. Mój bezpośredni wkład do analizy to wyniki otrzymane kombinatoryczną metodą cięć (rozdział 6), które pozwoliły wyliczyć ograniczenia na przekrój czynny i porównać je z przewidywaniami Ringwalda-Schremppa oraz z wynikami obliczeń na siatkach (rozdział 7).

Plan rozprawy jest następujący. Rozdział 1 zawiera krótki opis akceleratora HERA oraz detektora H1. W rozdziale 2 staram się wyjasnić co to są instantony. Teoria i fenomenologia procesów instantonowych jest przedstawiona w rozdziale 3. Symulacje Monte Carlo użyte w analizie zostały krótko opisane w rozdziale 4. W rozdziale 5 przedstawiono selekcję danych, definicję użytych obserwabli oraz porównanie danych z przewidywaniami modeli QCD dla DIS. Rozdział 6 zawiera wyniki poszukiwań przypadków instantonowych. W rozdziale 7 przedstawiono otrzymane ograniczenia na przekrój czynny dla procesów instantonowych. Wyniki poszukiwań przypadków instantonowych otrzymane drugą niezależną metodą przedstawiono w rozdziale 8. Perspektywy dalszych poszukiwań efektów pochodzących od instantonów jak również ostatnio opublikowane wyniki eksperymentu ZEUS, działającego również na akceleratorze HERA, są przedstawione w rozdziale 9. Rozprawę kończy krótkie podsumowanie.

Rozdział 1

Aparatura doświadczalna

Eksperyment H1 działa na akceleratorze HERA w niemieckim laboratorium naukowo-badawczym DESY w Hamburgu. HERA jest pierwszym i jak dotychczas jedynym w świecie akceleratorem, w którym zderzają się przeciwbieżne wiązki elektronów (pozytonów) i protonów.

1.1 Akcelerator HERA

Budowa zderzacza HERA trwała 7 lat, od maja 1984 roku do listopada 1990 roku. Pierwsze zderzenia elektron-proton zaobserwowano w 1991 roku, a w następnym roku eksperymenty rozpoczęły regularne zbieranie danych .

Tunel akceleratora o obwodzie 6.3 km jest zbudowany pod ziemią na głębokości od 10 m do 25 m. W dwóch oddzielnych pierścieniach umieszczonych jeden nad drugim, przyśpiesza się elektrony (pozytony) i protony. Magnesy pierścienia elektronowego są wysokotemperaturowe tj. działające w temperaturze pokojowej. Natomiast magnesy pierścienia protonowego są nadprzewodzące i wytwarzają pole magnetyczne 4.7 T potrzebne do utrzymania na orbicie wysokoenergetycznych protonów. Te wysokiej jakości nadprzewodzące magnesy mogą wytworzyć pole magnetyczne aż do wartości 5.8 T, co pozwala uzyskać wiązkę protonów o maksymalnej energii 1 TeV.

Początkowo energia wiązki elektronowej była 26.7 GeV, a wiązki protonowej 820 GeV. Od roku 1994 elektrony są przyspieszane do energii 27.5 GeV. Natomiast od roku 1998 protony przyspieszane są do energii 920 GeV.

HERA ma cztery prostoliniowe odcinki z punktami oddziaływań. W dwóch miejscach, gdzie dochodzi do zderzeń przeciwbieżnych wiązek elektronów i protonów znajdują się uniwersalne detektory H1 i ZEUS. Dwa pozostałe miejsca wykorzystują eksperymenty na stałej tarczy, HERMES i HERA-B. HERMES bada strukurę spinową protonu wykorzystując zderzenia podłużnie spolaryzowanej wiązki elekronowej ze spolaryzowaną tarczą gazową. Natomiast nie działający już eksperyment HERA-B badał zderzenia wiązki protonów z jądrami tarczy w postaci drutów w celu pomiaru łamania parzystości CP w rozpadach mezonów B.

W tabeli 1.1 zebrane są wartości podstawowych parametrów akceleratora. Dzięki stałemu postępowi w jakości działania akceleratora, osiągnięto wartości parametrów zbliżone do założonych w projekcie. W niektórych przypadkach uzyskane wartości były nawet lepsze niż zaprojektowano i tak np. maksymalna osiągnięta świetlność wyniosła

$1.8\text{x}10^{31}$ cm^{-2}sek^{-1}. Ten postęp w działaniu akceleratora odzwierciedla tabela 1.2, gdzie pokazano całkowitą świetlność dostarczoną przez akcelerator dla eksperymentów oraz świetlność zarejestrowaną przez eksperyment H1 w latach 1992-2000. Dalszy wzrost świetlności wymagał modyfikacji akceleratora. W latach 2000/2001 przebudowano akcelerator w celu uzyskania świetlności $5\text{x}10^{31}$ cm^{-2}sek^{-1} i jak dotychczas osiągnięto maksymalną wartość $3.5\text{x}10^{31}$ cm^{-2}sek^{-1}.

Parametr	
Natężenie wiązki elekronowej (mA)	58
Natężenie wiązki protonowj (mA)	160
Liczba pęczków w wiązkach	210
Czas między zderzeniami (nsek)	96
Świetlność (cm^{-2}sek^{-1})	$1.5\text{x}10^{31}$

Tablica 1.1: Parametry akceleratora HERA przed jego modyfikacją.

Rok	HERA L [pb^{-1}]	H1 $L\,[pb^{-1}]$
1992	0.049	0.030
1993	0.890	0.558
1994	5.268	3.840
1995	9.941	6.089
1996	14.460	9.887
1997	33.360	28.220
1998	8.008	6.175
1999	45.048	40.507
2000	67.889	60.087

Tablica 1.2: Całkowita świetlność dostarczona przez akcelerator HERA (HERA L) i zebrana przez eksperyment H1 (H1 L) w poszczególnych latach.

1.2 Detektor H1

Apratura H1 [30] to uniwersalny, pokrywający niemal cały kąt bryłowy detektor, który został zbudowany w celu badania szerokiej gamy procesów w oddziaływaniach *ep*.

Schemat aparatury H1 przedstawiono na rysunku 1.1. Oprócz głównych elementów detektora pokazano kierunki padających wiązek oraz przyjęty układ współrzędnych, którego początek umieszczono w nominalnym punkcie oddziaływań. Detektor jest asymetryczny, ponieważ energia protonów jest znacznie większa niż elektronów i większość cząstek jest produkowana w kierunku ,,do przodu'' tj. w kierunku $+z$ wyznaczonym przez padającą wiązkę protonów.

Najbardziej wewnętrzna część aparatury H1 to detektory śladów składające się z części centralnej $\boxed{2}$ i przedniej $\boxed{3}$. Detektory śladów są otoczone przez kalorymetry.

Przedni i centralny obszar zajmuje kalorymetr z ciekłego argonu (LArC), który jest podzielony na część elektromagnetyczną $\boxed{4}$ i hadronową $\boxed{5}$. Tylny obszar jest zamknięty przez kalorymentr typu *spaghetti* (SpaCal) $\boxed{12}$. Bardzo małe kąty w obszarze przednim pokrywa mały kalorymetr miedziano-krzemowy $\boxed{13}$. Kalorymetr z ciekłego argonu oraz detektory śladów są umieszczone wewnątrz cewki nadprzewodzącej $\boxed{6}$, która wytwarza jednorodne pole magnetyczne (1.2 T) równoległe do osi zderzających się wiązek. Żelazne jarzmo $\boxed{10}$ zawiera warstwy detektorów strimerowych (*limited streamer tubes*), które służą do pomiaru energii ogona kaskady hadronowej oraz do identyfikacji mionów. Miony w kierunku do przodu są rejestrowane w spektrometrze mionowym $\boxed{11}$ składającym się z magnesu toroidalnego wytwarzającego pole magnetyczne 1.6 T oraz komór dryfowych. Ponadto w odległości 63 i 90 m od punktu odziaływań jest zainstalowany przedni spektrometr protonów. Natomiast przedni kalorymetr neutronów jest umieszczony w odległości 107 m. Układ do pomiaru świetlności składający się z dwóch detektorów jest umieszczony w odległości $z = -33.4$ m (detektor elektronów) i $z = -102.9$ m (detektor fotonów).

1.2.1 Detektory śladów

Schemat systemu detektorów śladów przedstawiono na rysunku 1.2. Centralny detektor śladów składa się z dwóch centralnych komór dżetowych (CJC1, CJC2), z centralnych komór dryfowych mierzących współrzędną z (CIZ, COZ) oraz komór proporcjonalnych (CIP,COP) dostarczających szybki sygnał dla układu wyzwalania (trygera). Przedni detektor śladów to układ trzech jednakowych modułów, gdzie każdy moduł składa się z radialnej komory dryfowej, planarnej komory dryfowej, komory proporcjonalnej oraz radiatora promieniowania przejścia. W tylnej częsci tuż przed tylnym kalorymetrem znajduje się tylna komora dryfowa (BDC). Najbliżej rury akceleratora znajduje się centralny oraz tylny detektor krzemowy (nie zaznaczone na rysunku).

Komory CJC1 i CJC2 [31] pokrywające obszar kąta biegunowego θ między 15^o i 165^o to dwie duże koncentryczne komory dryfowe o długości 2.2 m. Wewnętrzna komora CJC1 ma 24 warstwy drutów sygnałowych, równoległych do osi z i zgrupowanych w 30 celach w kącie azymutalnym ϕ. Natomiast zewnętrzna komora CJC2 ma 32 warstwy drutów sygnałowych w 60 celach. Przestrzenna zdolność rozdzielcza jest 170 μm w płaszczyźnie $r - \phi$. Precyzja pomiaru współrzędnej z jest gorsza i wynosi 22 mm. Zdolność rozdzielcza pomiaru pędu poprzecznego p_t wynosi $\sigma_{p_t}/p_t < 0.01 p_t$ [GeV]. Lepszą dokładność pomiaru współrzędnej z tj. około 300 μm uzyskuje się dzięki dwóm cienkim, cylindrycznym komorom dryfowym CIZ i COZ, których druty sygnałowe są prostopadłe do osi z.

Przedni detektor śladów pokrywa obszar kąta biegunowy θ między 5^o i 25^o. Każdy moduł planarnych komór dryfowych składa się z trzech komór dryfowych obróconych względem siebie o 60^o. Pojedyncza komora to 32 dryfowe cele z drutami wzajemnie równoległymi (w płaszczyźnie $x - y$), przy czym w kierunku z są cztery druty sygnałowe. Dryfowe komory radialne mają druty naciągnięte promieniście od osi z. Komora pokrywa 360^o w kącie ϕ. Każda z 48 cel dryfowych ma 12 równoległych drutów sygnałowych. Typowa przestrzenna zdolność rozdzielcza przednich komór dryfowych jest 150-200 μm.

Tylna komora dryfowa (BDC) umieszczona tuż przed tylnym kalorymetrem pozwala